

اصول طرح درمان برای مولرهاي اول داييمى به شدت تخريب شده در دوره دنداني مختلط

مقاله مروري

دکتر بهزاد تباکوچی[†]- دکتر سپیده عرب

عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران؛ استادیار گروه آموزشی ارتودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران

Principles of treatment planning for compromised first permanent molars in mixed dentition period: A review article

Behrad Tanbakuchi[†], Sepideh Arab

Member of Dental Research Center, School of Dentistry, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran;
Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran (behrad.tanbakuchi@yahoo.com)

Background and Aims: The first permanent molar is susceptible to caries, endodontic complications and developmental anomalies. Compromised teeth with poor prognosis could cause the clinician to face dilemmas. The aim of this review article was to assess recent guidelines on the treatment planning of compromised first permanent molars in mixed dentition period.

Materials and Methods: The design of the study was based on review of literature by searching the MEDLINE, Web of science and Google scholar. Key words (permanent first molar, extraction, treatment plan) were used. This search was limited to the English articles published after the year 2000.

Conclusion: A number of factors influenced decision-making process regarding compromised first permanent molars including the restorative status of the tooth, dental age of the patient, degree of crowding and occlusal relationships were assessed. The ideal time for removal of these teeth was 8-9 years of age. However, the current evidence for managing compromised first permanent molars demands clinical trials.

Key Words: Molar, Management, Extraction

Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2016;29(3):215-222

+ مؤلف مسؤول: نشانی: تهران- انتهای کارگر شمالی- دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی ارتودنتیکس
تلفن: ۰۱۵۹۵۰۸۸۰ نشانی الکترونیک: behrad.tanbakuchi@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: دندان‌های مولر اول دائمی مستعد پوسیدگی، مشکلات اندودنتیک و آنومالی‌های تکاملی هستند. دندان‌های مولر اول به شدت تخریب شده با پیش‌آگهی ضعیف، درمان‌گر را با مشکل رویرو می‌کنند. هدف از این مقاله مروری، بررسی راهکارهای جدید در زمینه طرح درمان برای مولرهای اول دائمی به شدت تخریب شده، در دوره دندانی مختلط است.

روش بررسی: روش انجام این مطالعه بر مبنای مرور منابع علمی با جستجو در Google scholar و Web of science، MEDLINE و Orthodontic treatment plan Extraction Permanent first molar استفاده شد. جستجوها محدود به مقالات انگلیسی منتشر شده پس از سال ۲۰۰۰ بود.

نتیجه‌گیری: فاکتورهای متعددی فرایند تصمیم‌گیری در مورد مولرهای اول دائمی به شدت تخریب شده را تحت تأثیر قرار می‌داد که شامل وضعیت ترمیمی دندان، سن دندانی بیمار، میزان کرویدینگ و روابط اکلوزالی بود. سن ایده‌آل برای کشیدن این دندان‌ها ۸ تا ۱۰ سالگی بود. با این حال شواهد موجود در مورد مولرهای اول دائمی به شدت تخریب شده نیازمند مطالعات کلینیکی است.

کلیدواژه‌ها: مولر، مدیریت، کشیدن

وصول: ۹۵/۰۷/۲۰: تأیید چاپ: ۹۵/۰۷/۲۰: اصلاح نهایی: ۹۴/۱۲/۰۲

مقدمه**اول دائمی در ارتودنسی ذکر شده‌اند (۹,۱۰).**

امروزه با توجه به کاهش میزان پوسیدگی، بهبود روش‌های ترمیمی و توقع بالای والدین، دندانپزشکان ممکن است ترمیم مولرهای اول دائمی با پوسیدگی‌های وسیع و علایم پالبی را در دوره دندانی مختلط در نظر بگیرند (۱۱). با این حال دندان‌هایی با ترمیم‌های وسیع ممکن است در مراحل بعدی زندگی نیاز به کشیده شدن پیدا کنند. کشیدن دیر هنگام در صورتی که فضاهای بدون ترمیم باقی بمانند می‌تواند منجر به تغییرات اکلوزالی نامطلوب گردد (۲). در چنین مواردی کشیدن دندان در دوره دندانی مختلط دارای اهمیت می‌گردد. هدف این مقاله مرور راهکارهای ارایه شده در مورد مولرهای اول دائمی با پیش‌آگهی ضعیف در دوره دندانی مختلط است.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت مرور شواهد موجود در پایگاه‌های داده‌ای الکترونیک صورت گرفته است. با استفاده از واژگان کلیدی Extraction, Permanent first molar) Orthodontic treatment plan, MEDLINE (plan, مروری بر مقالات انگلیسی موجود در پایگاه‌های Google Scholar و Web of Science و Google Scholar انجام شد. محدوده جستجوی مقالات از سال ۲۰۰۰ به بعد بود. پس از جستجو و بررسی عنوان و چکیده مقالات، ۱۲ مقاله مرتبط یافت شد که از این بین ۱۱ مقاله با متن کامل در دسترس بود. در جدول ۱ به اختصار به این مقالات پرداخته شده است.

(۱) بر اهمیت مولرهای اول در یک اکلوژن نرمال و معادل تأکید کرده است. کشیدن زود هنگام این دندان‌ها، هر دو قوس و در نتیجه کل اکلوژن را به طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. متأسفانه مولرهای اول دائمی شایع‌ترین دندان کشیده شده به دلیل پوسیدگی هستند (۲). بیش از ۵۰ درصد کودکان بالای ۱۱ سال دارای پوسیدگی در این دندان می‌باشند (۳). افزون بر این، مولرهای اول دائمی به طور معنی‌داری در معرض تغییرات هایپوپلاستیک قرار دارند (۴). کشیدن زود هنگام مولرهای اول دائمی، ممکن است سبب مشکلاتی نظیر تیپینگ دندان‌های مجاور به سمت فضای دندان کشیده شده، اکستروژن نیز گاهی اوقات کشیدن مولرهای اول بنا بر دلایل سمت فضای دندان کشیده شده به خصوص در فک پایین، عادات جویدن نامتقارن یا یک‌طرفه، مشکلات پریودنتال به دلیل آتروفی استخوان آلوئول در محل دندان کشیده شده و آسیمتری اسکلتان قابل توجه به خصوص در یک سوم تحتانی صورت شود (۲,۵). در طرح درمان ارتودنسی نیز گاهی اوقات کشیدن مولرهای اول بنا بر دلایل مانند هایپوپلازی، پوسیدگی‌های عمیق، مشکلات اندودنتیک و ترمیمی و یا درمان ارتفاع عمودی صورت ممکن است بر کشیدن دندان‌های دیگر ترجیح داده شود (۶,۷). به طور معمول مولرهای اول فقط در موارد پوسیدگی‌های وسیع غیر قابل ترمیم کشیده می‌شوند (۸). زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی ضعیف و کاهش توجه به مراقبت‌های دندانی به عنوان دلایل مبنای برای انتخاب طرح درمان کشیدن مولر

جدول ۱ - مقالات بررسی شده

درباره مقاله	سال	نام نویسنده
این مقاله مروی نظاممند به بررسی زمان کشیدن مولرهای اول دائمی غیرقابل ترمیم می‌پردازد.	۲۰۱۵	Echinberger و همکاران
این مقاله موارد تجویز، عدم تجویز، مزايا و معایب کشیدن مولرهای اول، دوم و سوم را مورد بحث قرار می‌دهد.	۲۰۱۵	Emilia Chua و همکاران
این مقاله بر اساس شواهد به روزترین راهکارهای درمانی را در بیمارانی با مولرهای دائمی به شدت تخریب شده و در انواع مال اکلوژن‌ها بررسی می‌کند.	۲۰۱۴	Cobourne و همکاران
براساس نتایج این مقاله کشیدن مولر اول دائمی سبب تسریع معنی‌دار تکامل مولر سوم همان سمت می‌شود.	۲۰۱۴	Halicioglu و همکاران
براساس نتایج این مقاله کشیدن مولر اول دائمی بالا در سن ۱۰/۵ سالگی در بیماران CI I منجر به بسته شدن کامل فضای مولر دوم می‌شود.	۲۰۱۴	Rahhal A
براساس نتایج این مقاله طبقه‌بندی انگل بیمار یا مرحله تکاملی مولر دوم در بسته شدن خوب‌بهخودی فضای حاصل از کشیدن مولر اول دائمی بحرانی نیست.	۲۰۱۳	Teo و همکاران
براساس یافته‌های این مقاله کشیدن مولرهای اول سبب بهبود قابل ملاحظه در موقعیت مولرهای دوم و سوم می‌شود.	۲۰۱۱	Livas و همکاران
این مقاله به موارد تجویز کشیدن مولرهای اول دائمی، کشیدن جبرانی و تعادلی در مال اکلوژن‌های مختلف پرداخته است.	۲۰۱۰	Ong و همکاران
این مقاله به شرح ملاحظات درمانی در موارد کشیدن مولرهای اول دائمی با مشکلات تکاملی می‌پردازد.	۲۰۰۳	Dixit و همکاران
این مقاله سن مناسب برای کشیدن مولرهای اول دائمی، موارد تجویز و نتایج کشیدن مولرهای اول دائمی را شرح می‌دهد.	۲۰۰۱	Gill و همکاران
این مقاله شامل بررسی ملاحظات کلینیکی در مورد کشیدن مولرهای اول و گزارش مواردی با طرح درمان کشیدن مولرهای اول است.	۲۰۰۰	Sandler و همکاران

شرح مقاله

- ۳- مولر اول دائمی با ترمیم وسیع، وقتی که پرمولرهایی که برای درمان ارتودنسی باید کشیده شوند، کاملاً سالم هستند.
- ۴- مولر اول دائمی با بیماری‌های پری‌آپیکال یا درمان اندودنتیک ناموفق
- ۵- مولر اول دائمی با درگیری شدید پریودنتال
- ۶- کرودینگ در قسمت دیستالی قوس‌های دندانی و وجود مولرهای سوم با شکل و موقعیت مطلوب
- ۷- مال اکلوژن با الگوی صورتی دولیکوفاسیال
- ۸- مال اکلوژن با اپن بایت قدامی در مواجهه با مولر اول دائمی با پیش‌آگهی ضعیف توجه به چندین نکته ضروری است (۱۱، ۳):

مولر اول دائمی به ندرت دندان انتخابی برای کشیدن قبل از درمان ارتودنسی است (۳). سطح ریشه‌ای وسیع مولرهای اول دائمی سبب شده که این دندان‌ها انتخاب مناسبی برای تأمین انکوریج باشند و از طرفی دور بودن فضای ایجاد شده با کشیدن مولرهای اول دائمی از دندان‌های قدامی نیز سبب شده که این دندان‌ها به ندرت دندان مطلوبی برای کشیدن در طرح درمان ارتودنسی باشند (۱۲). با این حال چندین وضعیت کلینیکی وجود دارد که کشیدن مولر اول باید در آن‌ها مد نظر قرار گیرد (۱۵-۱۳، ۶، ۷، ۹، ۱۰):

- ۱- مولر اول دائمی با پوسیدگی‌های وسیع
- ۲- مولر اول دائمی هیپوپلاستیک

مزیال در یک تماس مطلوب با پرمولر دوم رویش یابد (۳,۹,۱۰). به ویژه اگر در زمان کشیدن، مولر دوم دائمی آپیکالی تر از محل اتصال مینا و سمان (CEJ) مولر اول دائمی بالا باشد، فضای بین مولرهای اول دائمی می‌شود (۳,۹,۱۰).

کشیدن مولر اول دائمی بالا در سن ۸ سالگی سبب بسته شدن مطلوب فضای می‌گردد (۱۱). گرچه براساس برخی از مطالعات کشیدن مولر اول دائمی بالا تا سن ۱۰/۵ سالگی هم همراه با حداکثر دریفت مزیالی مولر دوم و بسته شدن کامل فضای خواهد بود (۱۸,۱۹). اگر مولر اول دائمی بالا پس از رویش مولر دوم دائمی کشیده شود، مولر دوم دچار تیپینگ و چرخش مزیوبالاتالی حول ریشه پالاتال خواهد شد. در این صورت درمان ارتودنسی ثابت برای تصحیح تمایل محوری مولر دوم و تکمیل بستن فضای نیاز خواهد بود (۱۱,۱۳).

زمان کشیدن مولر اول دائمی پایین بحرانی تر از مولر اول دائمی بالاست (۱۱,۱۰). بسته شدن مطلوب فضای در فک بالا نسبت به فک پایین متحمل تر است (۲۰) که ممکن است به دلیل تفاوت در مسیر رویشی مولرهای دوم در دو فک باشد (۹,۱۹). این تفاوت مربوط به مسیر رویشی عمودی تر مولر دوم دائمی پایین نسبت به بالاست (۹). زمان ایدهآل برای کشیدن مولر اول دائمی پایین تقریباً ۸ تا ۹ سالگی است (۳,۹). بر مبنای یک مطالعه مروری نظاممند اخیر کشیدن مولرهای اول دائمی پایین در سینی ۸ تا ۱۱/۵ سالگی می‌تواند نتیجه کلینیکی مطلوبی را در پی داشته باشد (۱۹). در این زمان تاج مولر دوم دائمی پایین کامل است و محل انشعاب ریشه‌های آن نیز در رادیوگرافی قابل مشاهده می‌باشد (۳).

ارزیابی تکامل مولر دوم نشان می‌دهد که مشاهده کلسیفیکاسیون محل انشعاب ریشه‌ها در نمای رادیوگرافیک بهترین نشانه برای زمان مناسب کشیدن مولر اول دائمی است (۱۰,۱۵,۲۱). گرچه کشیدن مولر اول دائمی بر اساس تکامل مولر دوم دائمی ممکن است خیلی قابل اعتماد نباشد (۲۲). اگر مولر اول دائمی در زمان مناسب کشیده شود، حداکثر حرکت مزیالی خود به خودی مولر دوم دائمی رویش نیافته موردن انتظار است (۲۳). با این حال پاسخ مولر دوم دائمی متغیر است و رویش مطلوب آن با وجود کشیده شدن مولر اول دائمی در زمانی زودتر با دیرتر از زمان مطلوب نیز امکان پذیر می‌باشد (۲۱,۲۲).

اگر درنهایت فضای کمی بین مولر دوم دائمی پایین و پرمولر دوم

۱- قابلیت نگهداری مولر اول دائمی به مخاطره افتاده با وجود درمان‌های اندودنیک و ترمیمی وسیع

۲- سن دندانی بیمار

۳- میزان کروডینگ در سگمنت‌های باکال و لیال

۴- شرایط بقیه دندان‌های بیمار

۵- ضرورت کشیدن مولرهای اول دائمی دیگر بیمار (کشیدن جبرانی و تعادلی)

۶- روابط اکلوزالی بیمار

علاوه بر موارد بالا طرح درمان نهایی نیازمند معاینه جامع سیستم دندانی و درنظر گرفتن شرایط خاص هر بیمار می‌باشد. اگر بیمار نیازمند یا مایل به انجام درمان ارتودنسی است، زمان بندی و الگوی کشیدن باید به منظور دست‌یابی به اهداف درمانی مطلوب تغییر یابد.

قابلیت نگهداری مولر اول دائمی به مخاطره افتاده

در صورت اصرار بر حفظ دندان‌های به شدت تخریب شده ممکن است این دندان‌ها وارد یک چرخه مغایب شوند که درنهایت منجر به کشیدن دندان شود (۱۴). درمان چنین دندان‌هایی هم برای بیمار و هم برای دندانپزشک چالش برانگیز خواهد بود (۷) و از طرفی به دلیل میزان بالای نیاز به درمان مجدد در چنین دندان‌هایی (۱۶) کشیدن مولر های اول دائمی به شدت تخریب شده در دوره دندانی مختلط در موارد ترمیم‌های وسیع اکلوزالی یا پروگزیمالی، پالپیت برگشت‌ناپذیر، عفونت پری آپیکال و هیپوپلازی شدید مفید به نظر می‌رسد (۹-۱۱,۱۳,۱۵,۱۷).

سن دندانی بیمار

کشیدن مولرهای اول دائمی سبب افزایش طول مدت درمان ارتودنسی و نیاز به استفاده از مکانیک‌های پیچیده برای بستن فضای می‌شود (۱۸). با این حال کشیدن این دندان‌ها در زمان مناسب می‌تواند سبب تسهیل قابل توجه درمان ارتودنسی ثابت در آینده شود (۱۵,۱۸). بسته شدن فضای مولر اول به بهترین نحو در کودکان و بالغین جوان رخ می‌دهد (۹). زمان ایدهآل برای کشیدن مولر اول دائمی فک بالا با فک پایین متفاوت است (۳). اگر مولر دوم دائمی بالا در زمان کشیدن مولر اول دائمی رویش نیافته باشد می‌تواند با حرکت بادیلی به سمت

شرطیت بقیه دندان‌های بیمار

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی بیمار برای بررسی شرایط وجود بقیه دندان‌ها ضروری است. گاهی اوقات یک مولر اول دائمی از دست رفته با کشیدن یک پرمولر با پیش‌آگهی ضعیف در سمت مقابل قوس دندانی متعادل می‌شود. در این موارد دندان پرمولر با پیش‌آگهی ضعیف به جای مولر اول دائمی سالم به منظور کشیدن تعادلی خارج می‌گردد (۹،۱۱). اگرچه وجود مولرهای سوم در حال تکامل می‌تواند با یک رادیوگرافی پانورامیک تشخیص داده شود (۹) غیبت مولرهای سوم کنتراندیکاسیون مطلق برای کشیدن مولرهای اول به مخاطره افتاده نخواهد بود (۹،۱۰) زیرا کلسیفیکاسیون جوانه مولرهای سوم ممکن است در سن ۸ تا ۱۰ سالگی آغاز شده باشد (۱۰). بنابراین تصمیم‌گیری برای کشیدن مولرهای اول باید اغلب بدون آگاهی قطعی از تکامل مولرهای سوم صورت گیرد (۱۰).

کشیدن جبرانی و تعادلی

کشیدن جبرانی به خارج کردن مولر اول دائمی قوس دندانی مقابل اطلاق می‌شود (۳،۱۰،۱۱،۲۱). به عنوان یک قانون کلی پس از کشیدن مولر اول دائمی پایین، کشیدن جبرانی مولر اول دائمی بالا ضروری است (۳،۱۰،۲۱). در صورت عدم کشیدن جبرانی مولر اول دائمی بالا و در صورت رویش بیش از حد این دندان از دریفت مزیالی مولر دوم دائمی پایین جلوگیری می‌شود (۳،۲۱). از آن‌جا که احتمال رویش بیش از حد مولر اول دائمی بالا به دنبال از دست رفتن مولر اول دائمی پایین نسبتاً کم به نظر می‌رسد (۷) در مواردی که بیمار در آینده نزدیک تحت درمان ارتودنسی جامع قرار می‌گیرد ممکن است کشیدن جبرانی مولر اول دائمی بالا نیاز نباشد (۳). کشیدن جبرانی مولر اول دائمی پایین به دنبال کشیدن مولر اول دائمی بالا به طور معمول توصیه نمی‌شود (۳،۲۱). زیرا از طرفی احتمال رویش بیش از حد مولر اول دائمی پایین کمتر است و از سوی دیگر مولر دوم دائمی بالا تمايل به رویش و دریفت مزیالی سریع‌تری دارد (۳). مقصود از کشیدن تعادلی خارج کردن یک دندان در سمت مقابل همان قوس دندانی است (۳،۱۰). هدف از کشیدن تعادلی جلوگیری از انحراف میدلاین به دنبال کشیدن پک‌طرفه مولر اول دائمی است (۳). برای کشیدن تعادلی حتماً نیاز به کشیدن مولر اول دائمی سمت مقابل نیست، گاهی کشیدن یک پرمولر

باقي بماند با درمان ارتودنسی ثابت بسته خواهد شد. اگر مولر اول دائمی پایین قبل از سن ۸ سالگی کشیده شود، پرمولر دوم رویش نیافته می‌تواند دچار دریفت دیستالی، تیپینگ و چرخش شود (۹،۲۱). در موارد شدید احتمال نهفتگی پرمولر دوم در برابر مولر دوم نیز وجود دارد به همین دلیل گاهی اوقات کشیدن همزمان مولر دوم شیری با مولر اول دائمی سبب مسیر رویش عمودی‌تر پرمولر دوم می‌شود (۱۱). افزون بر این در نتیجه کشیدن زود هنگام مولر اول دائمی سگمنت لبیالی رتروکلاین می‌شود و اوربایت نیز افزایش می‌یابد (۲۴). اگر مولر اول دائمی در طی مراحل پایانی رویش مولر دوم کشیده شود، احتمال تیپینگ مزیالی و چرخش لینگوالی مولر اول دائمی تماش‌های اکلوزالی نامناسب می‌گردد (۹،۲۱،۲۵).

علاوه بر این پرمولر دوم رویش یافته هم ممکن است دچار حرکت دیستالی گردد (۹،۲۵). کشیدن مولرهای اول دائمی در هر دو فک تکامل و رویش مولرهای سوم را به طور معنی‌داری تسریع می‌کند (۶،۲۶،۲۷) و همچنین به خصوص در فک بالا سبب بهبود معنی‌دار تمايل محوری مولرهای دوم و سوم همان سمت نیز می‌شود (۲۸). به طور کلی بهترین نتایج درمانی در فک بالا و زمانی که مولر دوم با مسیر رویش مزیالی به تماش مناسبی با پرمولر دوم می‌رسد رخ می‌دهد (۹،۲۰).

میزان گروهینگ در سگمنت‌های لبیال و باکال

در بیمارانی با مولرهای اول دائمی به مخاطره افتاده و گروهینگ قابل توجه یا پروتروژن شدید دندان‌های قدامی، کشیدن یک یا تعداد بیشتری از مولرهای اول به جای دندان پرمولر سالم توجیه‌پذیر است (۳،۲۹). از سوی دیگر در موارد با گروهینگ زیاد در داخل قوس دندانی، بستن ارتودنتیک فضای حاصل از کشیدن مولر اول دائمی به مراتب آسان‌تر است (۱۱). در بیماران با گروهینگ کم در داخل قوس دندانی، زمان کشیدن مولر اول دائمی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا کشیدن مولر اول دائمی در زمان مناسب سبب حداکثر دریفت مزیالی مولر دوم و اجتناب از ایجاد فضاهای باقی‌مانده وسیع می‌شود (۳). بستن فضاهای وسیع در عدم وجود مکانیک‌های صحیح درمانی می‌تواند سبب رترکشن شدید دندان‌های قدامی و تأثیرات نامطلوب بر نیم‌رخ بافت نرم بیمار شود (۳۰،۳۱).

Class II Division 1 -

در بیماران کلاس دو کشیدن مولر اول دائمی پایین باید در زمان ایدهآل انجام شود تا سبب رویش مطلوب مولر دوم دائمی و کتترل پرمولر دوم گردد (۲۱). پس از کشیدن مولر اول دائمی پایین، مولر اول دائمی بالا با مولر دوم شبیری پایین یا پرمولر دوم پایین در تماس خواهد بود (۳). این تماس معمولاً از رویش بیش از حد مولر اول دائمی بالا جلوگیری می‌کند. بنابراین در چنین مواردی نیازی به کشیدن جبرانی مولر اول دائمی بالا وجود ندارد (۳). در مواردی که احتمال رویش بیش از حد مولر اول دائمی بالا وجود دارد، اپلاینس متحرک و با ترسن پالاتال آرج می‌تواند استفاده شود (۳,۲۱). در صورت رویش بیش از حد مولر اول دائمی بالا و وجود مولر سوم در نمای رادیوگرافیک، کشیدن این دندان قبل از شروع درمان ارتدونسی ثابت می‌تواند به تصحیح رابطه Class II سگمنت باکال و کاهش اورجت کمک نماید (۳,۲۱). در صورت وجود کرودینگ در قوس پایین، مولر اول دائمی پایین می‌تواند پس از رویش مولر دوم دائمی کشیده شود و فضای حاصل برای رفع کرودینگ با استفاده از اپلاینس‌های ثابت صرف گردد (۲۱). در موارد وجود مولر اول دائمی بالا با پیش‌آگهی ضعیف، حفظ مولر اول به مخاطره افتاده تا زمان رویش کامل مولر دوم دائمی بالا ایدهآل خواهد بود (۳). در چنین مواردی درمان اندوتنیک و ترمیم موقع دندان ممکن است نیاز باشد. پس از رویش مولر دوم دائمی بالا، کشیدن دو طرفه مولرهای اول دائمی بالا برای منظم کردن دندان‌ها (alignment)، تصحیح رابطه Class II و کاهش اورجت می‌تواند انجام می‌گیرد (۳,۲۱). کشیدن مولر اول دائمی بالا در درمان مال اکلوژن Class II Division 1 تنها تأثیر اندکی در پروفایل بافت نرم دارد و می‌تواند منجر به نتایج درمانی خوبی گردد (۳۴). در صورت وجود کرودینگ زیاد در قوس بالا، کشیدن پرمولر نیز برای ایجاد فضای کافی و تصحیح اورجت ممکن است نیاز باشد (۲۱). چنانچه امکان حفظ موقع دندان مولر اول دائمی بالا وجود ندارد، کشیدن این دندان در زمان ایدهآل و اجازه رویش مطلوب به مولر دوم دائمی پیشنهاد می‌شود (۲۱). در این صورت تصحیح رابطه Class II بر اساس ارزیابی‌های ارتدونتیک و سفالومتریک و نیاز خاص بیمار با استفاده از اپلاینس فانکشنال، هدگیر و یا کشیدن پرمولرهای بالا انجام خواهد شد (۲۱).

با پیش‌آگهی ضعیف به جای مولر اول دائمی سالم منطقی‌تر به نظر می‌رسد (۳,۱۱). زمان انجام کشیدن تعادلی، بحرانی نیست و کشیدن تعادلی می‌تواند کمی قبل از شروع درمان ارتدونسی ثابت انجام گیرد (۳). امروزه با توجه به امکان استفاده از انکوریج اسکلتال برای بستن ناقرینه فضاها و تصحیح میدلابین دندانی، کشیدن تعادلی یک مولر اول دائمی سالم توجیه‌پذیر نمی‌باشد (۲۱,۳۲).

روابط اکلوزالی بیمار

Class I با کرودینگ کم

به طور کلی مطلوب‌ترین وضعیت برای کشیدن مولرهای اول تخریب شده رابطه اکلوزالی Class I با کرودینگ خفیف سگمنت باکال است (۱۰). در این موارد کشیدن تعادلی مولر اول دائمی در فک بالا یا پایین در صورت سالم بودن لازم نیست (۲۱). در صورت از دست رفتن مولر اول دائمی پایین، کشیدن جبرانی مولر اول دائمی بالا در صورتی که پیش‌بینی شود این دندان برای مدت زمان قابل توجهی بدون تماس مقابله باقی می‌ماند، توصیه می‌گردد (۳,۲۱).

Class I با کرودینگ زیاد

در صورت وجود کرودینگ در سگمنت باکال کشیدن مولر اول دائمی در زمان مطلوب می‌تواند سبب برطرف شدن خود به خودی کرودینگ شود (۱۱,۲۱). اگر کرودینگ سگمنت باکال دو طرفه است کشیدن تعادلی مولر اول دائمی سمت مقابله نیز برای کاهش کرودینگ می‌تواند در نظر گرفته شود (۲۱). کشیدن جبرانی مولر اول دائمی بالا هم برای کاهش کرودینگ ناحیه پرمولر فک بالا می‌تواند صورت گیرد (۲۱). کشیدن مولر اول دائمی سبب کاهش کمی در کرودینگ سگمنت لبیال می‌شود (۲۱). در صورت وجود کرودینگ در ناحیه قدامی قوس بالا بهتر است کشیدن مولر اول دائمی تا زمان رویش مولر دوم دائمی به تعویق بیفت و سپس فضای حاصل از کشیدن مولر اول دائمی برای کاهش کرودینگ سگمنت لبیال با استفاده از درمان ارتدونسی ثابت مورد استفاده قرار گیرد (۹,۱۱,۱۵,۲۱,۲۹). گاهی اوقات برای تصحیح پروتروژن دنتوآلوئولار فکین پس از رویش مولرهای دوم، طرح کشیدن مولرهای اول و استفاده از انکوریج اسکلتال نیز در نظر گرفته می‌شود (۳۳).

با پیش‌آگهی ضعیف، به خصوص در حضور یک مال‌اکلوزن می‌تواند یک مشکل عمدۀ درنظر گرفته شود. تصمیم‌گیری صحیح مستلزم بررسی دقیق فاکتورهای کلینیکی و رادیوگرافی متعدد است. زمان بندی کشیدن دندان و نیاز به کشیدن‌های جبرانی و تعادلی بر اساس تکامل دندانی بیمار، میزان کرویدینگ داخل قوس، روابط اکلوزالی و میزان اوربایت و اورجت متفاوت خواهد بود.

زمان ایده‌آل برای کشیدن مولر اول دائمی با پیش‌آگهی ضعیف، ۸ تا ۱۰ سالگی یعنی در زمان تشکیل مستقل ریشه‌های مولر دوم و ابتدای تشکیل فورکای آن است. کشیدن مولرهای اول دائمی در زمان صحیح می‌تواند درمان ارتودنسی جامع بیمار را به طور قابل توجهی تسهیل نماید و کیفیت آن را افزایش دهد. از طرفی توجه به این نکته نیز ضروری است که هر بیماری کاندید مناسبی برای کشیدن مولر اول دائمی نیست. بنابراین در طرح ریزی درمان درمورد مولر اول با پیش‌آگهی ضعیف، مشورت با متخصص ارتودنسی به خصوص در بیمارانی با مال‌اکلوزن Cl II و Cl III بسیار توصیه می‌شود. امروزه استفاده از انکوریج اسکلتال نیز امکان دستیابی به نتایج درمانی ایده‌آل را پس از کشیدن مولر اول دائمی میسر ساخته است.

شواهد علمی موجود در زمینه تصمیم‌گیری درمورد مولرهای اول دائمی به مخاطره افتاده ضعیف است. تاکنون هیچ مطالعه بالینی تصادفی در مورد نتایج حاصل از روش‌های درمانی مختلف گزارش نشده است. با توجه به شیوه پوسیدگی در مولرهای اول دائمی انجام مطالعات بالینی و سیستماتیک در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

Class II division 2 –

در چنین بیمارانی کنترل اوربایت پس از کشیدن مولرهای اول دائمی به خصوص در فک پایین می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد (۲۱، ۱۱، ۳). به طور کلی در این بیماران باید از کشیدن دندان در فک پایین اجتناب کرد (۱۱، ۳)، در صورت وجود مولر اول دائمی پیش‌آگهی ضعیف، ممکن است حفظ دندان تا رویش مولر دوم دائمی ترجیح داشته باشد (۳). به طور کلی در این موارد ارزیابی بالینی و سفالومتریک بیمار و تصمیم‌گیری صحیح در مورد طرح درمان ارتودنسی جامع پیش از اقدام به کشیدن ضرورت دارد.

Class III –

به عنوان یک قانون کلی در این بیماران باید از کشیدن مولرهای اول دائمی بالا اجتناب کرد (۲۱) زیرا درمان استاری بعدی بیمار را دچار مشکل می‌کند. همچنین کشیدن جبرانی و تعادلی هم توصیه نمی‌گردد (۲۱). کشیدن مولرهای اول دائمی پایین هم در موارد نامناسب، ممکن است ارتودنسی پیش از جراحی بیمار را دچار مشکل نماید (۳). با این حال در موارد انتخاب شده کشیدن مولر اول دائمی می‌تواند فضای مورد نیاز برای تصحیح اورجت، اوربایت و رابطه مولری را فراهم نماید (۳۵).

نتیجه‌گیری

طرح ریزی درمان برای مولرهای اول دائمی به شدت تخریب شده،

منابع:

- 1- Andrews LF. The six keys to normal occlusion. Am J Orthod. 1972;62(3):296-309.
- 2- Telli AE, S Aytan. Changes in the dental arch due to obligatory early extraction of first permanent molars. Turk Ortodont Derg. 1989;2(1):138-43.
- 3- Ong DC, Bleakley JE. Compromised first permanent molars: an orthodontic perspective. Aust Dent J. 2010;55(1):2-14.
- 4- Seow WK. Clinical diagnosis of enamel defects: pitfalls and practical guidelines. Int Dent J. 1997;47(3):173-82.
- 5- Caglaroglu M, Kilic N, Erdem A. Effects of early unilateral first molar extraction on skeletal asymmetry. Am J Orthod. 2008;134(2):270-5.
- 6- Halicioglu K, Toptas O, Akkas I, Celikoglu M. Permanent first molar extraction in adolescents and young adults and its effect on the development of third molar. Clin Oral Investig. 2014;18(5):1489-94.
- 7- Jalevik B, Möller M. Evaluation of spontaneous space closure and development of permanent dentition after extraction of hypomineralized permanent first molars. Int J Ped Dent. 2007;17(5):328-35.
- 8- Nanda R. Esthetics and Biomechanics in Orthodontics. 2nd ed. 2015: Elsevier.
- 9- Chua E, Felicita A. The orthodontic extraction of permanent molars: a literature review. Aust orthod j. 2015;31(1):69-77.
- 10- Dixit S, Khanduri M, Jain S, Garg S. Extraction of First

- Permanent Molar with Developmental Anomalies: A Dilemma! Br Dent J. 2003;200:313-20.
- 11-** Gill DS, Lee RT, Tredwin CJ. Treatment planning for the loss of first permanent molars. Dent Update. 2001;28(6):304-8.
- 12-** Williams J, Gowans A. Hypomineralised first permanent molars and the orthodontist. Eur J of Ped Dent. 2003;4:129-32.
- 13-** Alesia K, Khalil HS. Reasons for and patterns relating to the extraction of permanent teeth in a subset of the Saudi population. Clinic Cosm Invest Dent. 2013;51-6.
- 14-** Demirbuga S, Tuncay O, Cantekin K, Cayabatmaz M, Dincer AN, Kilinc Hİ, Sekerci AE. Frequency and distribution of early tooth loss and endodontic treatment needs of permanent first molars in a Turkish pediatric population. Eur J of Dent. 2013;7(1): S99-S104.
- 15-** Sandler PJ, R Atkinson, Murray AM. For four sixes. Am J of Orthod. 2000;117(4):418-34.
- 16-** Jälevik B, Klingberg G. Dental treatment, dental fear and behaviour management problems in children with severe enamel hypomineralization of their permanent first molars. Intern J of Ped Dent. 2002;12(1):24-32.
- 17-** Albadri S, Zaitoun H, McDonnell ST, Davidson LE. Extraction of first permanent molar teeth: results from three dental hospitals. Br Dent J. 2007;203(7):408-9.
- 18-** Rahhal AA. Extraction Timing of Heavily Destrued Upper First Permanent Molars. Open J of Stomat. 2014;5(4):161-8.
- 19-** Eichenberger M, Erb J, Zwahlen M, Schätzle M. The timing of extraction of non-restorable first permanent molars: a systematic review. Eur J of Ped Dent. 2015;16(4):272-8.
- 20-** Travess H, D Roberts-Harry, Sandy J. Orthodontics. Part 8: extractions in orthodontics. B Dent J. 2004;1(4):195-203.
- 21-** Cobourne MT, Williams A, Harrison M. National clinical guidelines for the extraction of first permanent molars in children. Br Dent J. 2014;217(11):643-8.
- 22-** Teo TK, Ashley PF, Parekh S, Noar J. The evaluation of spontaneous space closure after the extraction of first permanent molars. Eur archives of Ped Dent. 2013;14(4):207-12.
- 23-** Mordecai R. Treatment planning for the loss of first permanent molars. Dent Update. 2002;29(2):author reply 98-9.
- 24-** Abu Aihaja ES, PF McSheny, Richardson A. A cephalometric study of the effect of extraction of lower first permanent molars. J Clin Pediatr Dent. 2000;24(3):195-8.
- 25-** Normando AD, Maia FA, da Silva Ursi WJ, Simone JL. Dentoalveolar changes after unilateral extractions of mandibular first molars and their influence on third molar development and position. World J Orthod. 2010;11(1):55-60.
- 26-** Halicioglu K, Toptas O, Akkas I, Celikoglu M. Permanent first molar extraction in adolescents and young adults and its effect on the development of third molar. Clinic Oral Invest. 2014;18(5):1489-94.
- 27-** Bayram M, Özer M, Arici S. Effects of first molar extraction on third molar angulation and eruption space. Oral Surg, Oral Med, Oral Path, Oral Rad, and Endo. 2009;107(2):e14-e20.
- 28-** Livas C, Halazonetis DJ, Booij JW, Katsaros C. Extraction of maxillary first molars improves second and third molar inclinations in Class II Division 1 malocclusion. Am J of Orthod. 2011;140(3):377-82.
- 29-** Silva ITPd. Angle Class I malocclusion treated with extraction of first permanent molars. Dent Press J of Orthod; 2010. 15(4):133-43.
- 30-** Abu AE, McSheny P, Richardson A. A cephalometric study of the effect of extraction of lower first permanent molars. The J of Clinic Ped Dent. 1999;24(3):195-8.
- 31-** Jacobs C, Jacobs-Müller C, Luley C, Erbe C, Wehrbein H. Orthodontic space closure after first molar extraction without skeletal anchorage. J of Orofacial Orthop. 2011;72(1):51-60.
- 32-** Chung KR, Kim SH, Kook YA, Kang YG, Sinclair PM. Dental midline correction using two component C-orthodontic mini-implant. Prog Orthod. 2009;10(2):76-86.
- 33-** Al-Fraidi A, Afify AR. Unusual treatment of bimaxillary dentoalveolar protrusion via miniscrews and molar extraction. J of Orthod Sci. 2012;1(2):51.
- 34-** Stalpers MJ, Booij JW, Bronkhorst EM, Kuijpers-Jagtman AM, Katsaros C. Extraction of maxillary first permanent molars in patients with Class II Division 1 malocclusion. Am J of Orthod and Dent Orthop. 2007;132(3):316-23.
- 35-** de Oliveira Ruellas AC, Baratieri C, Roma MB, de Moraes Izquierdo A, Boaventura L, Rodrigues CS, et al. Angle Class III malocclusion treated with mandibular first molar extractions. Am J of Orthod and Dent Orthop. 2012;142(3):384-92.