

مهار رشد میکرووارگانیسم‌های پاتوژن کanal ریشه دندان به روش Antibiosis توسط لакتیک اسید باکتریا، یک مطالعه *In vitro*

دکتر فرج اکبری نجفیانی* - دکتر محمد سعید شیخ‌رضابی[†] - دکتر سعید نگهبانی***

*استادیار گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

**دانشیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
***اندودنتیست

Title: In vitro growth inhibition of intra root canal pathogenic microorganisms by Lactic Acid Bacteria, an Antibiosis method.

Authors: A. Nakhjavani F. Assistant Professor*, Sheikhrezaie MS. Associate Professor** Negahbani S. Endodontist

Address: *Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

**Department of Endodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Background and Aim: Elimination of microorganisms and their byproducts from root canal system is one of important aims of root canal therapy. This object is gained by using of many chemomechanical techniques but with noncertain success. A new method is used of nonpathogenic bacteria for growth inhibition of pathogenic bacteria, Antibiosis, in root canal therapy. The aim of this study was in vitro evaluation of antimicrobial effect of probiotics, such as Lactic Acid Bacteria (LAB) on the infected root canal bacteria.

Materials and Methods: Isolated bacteria from infected root canal were grown and then scattered onto the muller Hinton agar plates which contain wells, LAB, extracted from dairy products, were added into these wells, Inhibition effected of LAB was determined. Furthermore the sample taken from the inhibition zone and possible resistant monoclonal bacteria also were identified, then 6 sensitive and 14 resistant samples were selected and *E. faecalis* species were added to them; Then antimicrobial effects of LAB on these samples was reevaluated.

Results: The results showed that 66.7% of the samples were sensitive at least to one type of LAB, and 33% were resistant to all kind of LAB. Meanwhile the outgrowing anaerobic bacteria inside the inhibition zone were from the low frequency oral bacterial flora. Furthermore, adding *E. faecalis* to the samples caused more sensitivity of them to LAB. Mc-Neamar test recognized the difference significant.

Conclusion: This study showed that the LAB inhibit growth of the pathogenic root canal bacteriae. Furthermore, presence of *E. faecalis* reinforces the antimicrobial effect of LAB. It seemed that LAB maybe have potential to use in endodontic practice for elimination of root canal infections.

Key Words: Lactic Acid Bacteria (LAB); Antibiosis; Apical periodontitis; Root canal infection

چکیده

زمینه و هدف: حذف میکرووارگانیسم‌های بیماریزا و فراورده‌های آنها از داخل کanal ریشه می‌باشد. این دستاورد با استفاده از روش‌های مکانیکی و شیمیایی مختلفی فراهم می‌گردد اما تاثیر حاصله موقفيت قطعی را نشان نمی‌دهد. در سالیان اخیر متدهایی جهت استفاده از باکتری‌های غیربیماریزا جهت مهار رشد میکروارگانیسم‌های بیماریزا در علوم پزشکی ارایه شده است (آنتیبیوپسیس)، اما در درمان‌های اندودنتیک تاکنون این روش‌ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثر خرد باکتریایی لакتیک اسید باکتریها (LAB) بر روی باکتری‌های کanal ریشه عفونی بود که می‌تواند یکی از موارد استفاده از پروبیوتیک‌ها در دندانپزشکی باشد.

روش بررسی: باکتری‌های جدا شده از کanal‌های ریشه‌های عفونی دندان را رشد داده و بر روی پلیت‌های حاوی محیط Muller Hinton agar دارای چاهک پخش نمودیم، سپس به چاهک‌های موجود LAB اضافه شد. پلیت‌های مذکور در محیط بی‌هوایی نگهداری شدند. سپس رشد و اثر مهاری لакتیک اسید

[†] مؤلف مسؤول: نشانی: تهران - خیلابان قدس - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی اندودنتیکس
تلفن: ۰۲۱۸۷۵۲۱۸ نشانی الکترونیک: sheykh_r@yahoo.com

باکتری‌ها بررسی شد. همچنین از درون هاله‌ای ایجاد شده اطراف چاهکها نمونه برداری و تک کلوفنی‌های مقاوم احتمالی تعیین هویت شد. سپس تعدادی از نمونه‌هایی که حساس و یا مقاوم بودند به تفکیک انتخاب و به آنها سوش میکروبی (*E.f*) *Entrococcus faecalis* اختلاف گردید و اثر LAB همانند روش فوق مجددأ بررسی گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که ۶۶٪ از نمونه‌های میکروبی کanal ریشه حداقل نسبت به یک سری از LAB حساس بودند و ۲۳٪ از نمونه‌ها به تمامی موارد LAB تحت آزمایش مقاوم بودند. ضمن اینکه باکتری‌های بی‌هوایی رشد یافته در هاله مهاری LAB جزء سویه‌های با تواتر پایین فلور نرمал دهان می‌باشند. همچنین اختلاف نمودن *E.f* به نمونه‌های میکروبی باعث افزایش حساسیت این عفونت‌ها به LAB شد. این اختلاف با استفاده از آزمون Mc-Neamar معنی‌دار بود.

بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که LAB می‌توانند رشد باکتری‌های بیماری‌زای کanal ریشه را مهار نمایند. پاتوجه به اینکه باکتری *E.f* در عفونت‌های مقاوم به درمان، غالب می‌باشد و از سوی دیگر حضور همین میکروارگانیسم باعث افزایش اثر مهاری LAB بر روی میکروارگانیسم‌های عفونت کanal ریشه می‌شود. می‌توان به نتایج درمانی این روش امیدوار بود.

کلید واژه‌ها: لاکتیک اسید باکتری؛ آنتی بیوزیس؛ پریودنتیت اپیکال؛ عفونت کanal ریشه

وصول: ۰۶/۸۶ اصلاح نهایی: ۰۷/۵۸ تأیید چاپ: ۰۶/۸۷

مقدمه

صرفی روزانه وجود دارند (پروفیوتیک‌ها)، بررسی صورت گیرد. از این گروه می‌توان به لاکتیک اسید باکتریها اشاره نمود که غالباً باسیل‌های گرم منفی بی‌هوایی هستند و در این مطالعه اثر آنها بر روی میکروارگانیسم‌های پاتوژن کanal ریشه مورد بررسی قرار گرفته است. البته قابل ذکر است که این روش تاکنون در درمان‌های اندودنتیک مورد استفاده قرار نگرفته، اما در دیگر شاخه‌های علوم پزشکی و تا حدودی در برخی رشته‌های دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق می‌تواند یک مطالعه جدید در این زمینه محسوب شود و تا رسیدن به هدف مطلوب ذکر شده نیاز به تحقیقات بیشتر بر روی میکروارگانیسم‌های پاتوژن مختلف، گونه‌های دیگر لاكتوباسیل‌ها، شرایط متفاوت دیگر و نهایتاً مطالعات *In vivo* دارد.

روش بررسی

۱- تهییه و تخلیص (LAB) Lactic Acid Bacteria

نمونه‌های لبنی جمع‌آوری شده از سراسر کشور جهت جداسازی باکتری‌های لاکتیک اسید در محیط‌های کشت *lactobacillus agar* و MRS broth agar کشت داده، سپس محیط‌های کشت شده موجود در سه درجه حرارت ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند و هر ۲۴ ساعت رشد میکروارگانیسم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنگاه کلوفنی‌های کرم، قهقهه‌ای یا خاکستری رنگ با قوام خامه‌ای و قطره ۱- ۲ میلی‌متر انتخاب و تحت آزمایش‌های تعیین و تأیید هویت که شامل رنگ‌آمیزی گرم، بررسی میکروسکوپی و تست کاتالاز بود، قرار گرفتند.

باکتری‌ها علت اصلی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال می‌باشند (۱). موفقیت درمان کanal ریشه در گذشته بر پایه ضدغ Fonی کردن کامل کanal ریشه با پروسه‌های شیمیایی و مکانیکی بود. با این حال ضدغ Fonی کردن کامل سیستم کanal ریشه با استفاده از روش‌های معمول مکانیکی و شیمیایی بسیار سخت است (۲). برای ضدغ Fonی کردن کanal ریشه از موادی همچون هیپوکلرید سدیم با غلظت‌های مختلف و کلروهگزیدین و هیدروکسید کلسیم استفاده شده است. اما بدلاًیل مختلف از جمله پیچیدگی سیستم کanal ریشه (۳) و عدم دسترسی مواد به بعضی نواحی آن، وجود لایه اسمیر و دبری (۴)، وجود بیوفیلم میکروبی (۵) و غیرفعال شدن مواد ضدغ Fonی در مجاورت با عاج (۶) و با گذشت زمان و نفوذ بعضی از میکروارگانیسم‌ها به داخل توبول‌های عاجی و عدم دسترسی مواد ضدغ Fonی کننده به آنها، هیچکدام از این مواد نمی‌توانند سیستم کanal ریشه را به طور کامل ضدغ Fonی نمایند و همیشه در درصد قابل توجهی از کanal‌های ریشه، عفونت باقی می‌ماند. با توجه به محدودیت‌های عملی موجود و بعضی معایب مواد ضدغ Fonی کننده مورد استفاده، شاید بهتر باشد روش‌های دیگری بجز استفاده از مواد شیمیایی جهت حذف میکروارگانیسم‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

جهت نیل به این هدف در این تحقیق سعی گردیده بر روی گونه‌های از باکتری‌های غیر پاتوژن که قابلیت مهار رشد میکروارگانیسم‌ها را دارا می‌باشند و به طور معمول نیز در غذای

ذکر است که از ۱۴ نوع LAB متفاوت استخراج شده از محصولات لبینی تولید ایران در این تحقیق استفاده شد. بعد از این مدت پلیت‌های حاوی چاهک‌های لاکتوباسیل از جهت وجود یا عدم وجود هاله رشد اطراف هریک از نمونه‌های LAB مورد مشاهده قرار گرفتند. از درون هاله‌های ایجاد شده در صورت وجود یک یا چند تک کلونی مقاوم، این blood agar کلونی‌ها جدا شده و از آنها کشت بی‌هوایی در محیط agar دارای hemin تهیه و به مدت ۷۲ ساعت دیگر در جار بی‌هوایی تحت همان شرایط بی‌هوایی قبل نگهداری می‌شد. همچنین جهت جداسازی بی‌هوایی‌های اختیاری از بی‌هوایی‌های اجباری، از کلونی‌های جدا شده قبل در محیط muller hinton agar کشت هوایی نیز داده شد.

کلونی‌های بی‌هوایی با استفاده از کیت تشخیص بی‌هوایی RaPID ANA II System (ساخت شرکت remel) طبق پروتکل روش استفاده کارخانه سازنده تعیین هویت شدند.

همچنین جهت بررسی اثر LAB بر E.faecalis به صورت تصادفی ۱۴ نمونه مقاوم و ۶ نمونه حساس از عفونت‌های کانال ریشه را که طی مراحل قبل مشخص شده بودند انتخاب نموده و سویه‌های E. faecalis را به آنها اضافه و مراحل را همانند روش فوق تکرار و نتایج ثبت شد.

آنالیز آماری:

تشکیل و یا عدم تشکیل هاله در اطراف چاهک‌های حاوی LAB به صورت درصد بیان شد و درخصوص مقایسه نتایج حاصله از گروه قبل و بعد از مخلوط کردن با E. faecalis از تست Mc-Neamar استفاده شد.

یافته‌ها

نتایج نشان می‌دهد که از مجموع ۷۵ نمونه کار شده در این تحقیق در ۵۰ نمونه آن حداقل در اطراف یکی از چاهک‌های حاوی LAB هاله مهار رشد دیده شد (۶۶/۷٪) و در ۲۵ نمونه دیگر هیچ‌گونه هاله مهار رشد در اطراف چاهک‌های حاوی LAB دیده نشد (۳۳/۳٪). از کلیه کلونی‌های باکتری‌های مقاوم اطراف چاهک‌های LAB در ۷۵ نمونه کار شده توسط کیت تشخیص بی‌هوایی شناسایی شدند: - C.hastiforme (۴ بار) - C.innocuum (۶ بار)

۲- نمونه‌گیری

تعداد ۷۵ بیمار دارای دندان عفونی با ضایعه پری اپیکال که نیاز به درمان اولیه یا مجدد اندودنتیک داشتند و جهت درمان به بخش تخصصی اندودنتیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. پس از برداشت پوسیدگی و ترمیم دندان‌های مذکور توسط فرز روند انگل و فرز الماسی توربین مجهز به سیستم آب استریل، دندان‌های مذکور با رابردم ایزوله شده و سطح دندان و را بردم با بتادین ۱۰٪ اسکراب شد. بعد از آن سطوح مذکور با سرم فیریولوژیک استریل شستشو شده و خفره دستری تهیه و تکمیل گردید.

با یک عدد فایل ۲۰، ۱۵ و یا ۲۵ استریل مسیر کانال تا ناحیه اپکس بدون شستشوی کانال باز گردید. سپس با استفاده از مخروط‌های کاغذی استریل سایز ۲۰ از داخل کانال نمونه‌برداری صورت گرفت. مخروط‌های کاغذی بدست آمده در لوله‌های حاوی تیوگلیکولات مذیوم قرار گرفت و بلافاصله جهت انجام مراحل بعدی کار به گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقال یافت.

۳- کشت و مجاورت با باکتری‌های لاکتیک اسید

نمونه‌های اخذ شده از کانال‌های عفونی را به محیط کشت تیوگلیکولات دارای معرف انتقال داده و به مدت ۷۲ ساعت در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه جهت رشد میکرووارگانیسم‌های موجود نگهداری شدند:

جهت مجاورت میکرووارگانیسم‌ها و LAB از پلیت‌های حاوی muller hinton agar استفاده شد. ابتدا بوسیله لوله آزمایش باریک به صورت کاملاً استریل بر روی هریک از این محیط کشت‌ها تعداد ۶ عدد چاهک با فاصله کافی ایجاد شد.

با استفاده از فیلدوپلاتین (Loop) از درون لوله محیط کشت تیوگلیکولات حاوی نمونه‌های میکروبی داخل کانال دو لوب پر، محتوی نمونه باکتریایی به صورت مخلوط برداشته شده و بر روی محیط‌های کشت تهیه شده که دارای چاهک بودند بخش شدند. بعد از آن در درون چاهک‌های مذکور LAB تخلیص شده ریخته شد. پلیت‌ها در جار مخصوص بی‌هوایی با فشار دی اکسید کربن ۵-۱۰٪ در دمای ۳۷ درجه به مدت ۷۲ ساعت نگهداری شدند. قابل

از طرفی در مطالعات مختلف دیده شده که در نمونه‌های تهیه شده از کanal در درمان‌های اولیه اندودنتیک، ۹۸٪ از باکتری‌ها، بی‌هوایی اجباری می‌باشند (۲۸). در صورتی که در کanal‌های ریشه که درمان اندودنتیک شده ولی نیاز به درمان مجدد دارند ۷۵٪ موارد بی‌هوایی اختیاری هستند و ۱۷٪ موارد بی‌هوایی اجباری می‌باشند (۲۹). این تحقیقات نشان‌دهنده این مطلب می‌باشد که کanal ریشه دندان‌های درمان ریشه شده محیط مناسبی جهت رشد بی‌هوایی‌های اختیاری می‌باشد.

از مجموع دلایل و قرایین فوق چنین استنباط می‌شود که محیط کanal ریشه بعد از درمان اندودنتیک یک محیط ضدغونی شده و قادر میکروارگانیسم نمی‌باشد و بر فرض این نکته که بتوان محیط قادر میکروارگانیسم ایجاد نمود بدلیل وجود راههای مختلفی که منجر به عفونت مجدد مجموعه کanal ریشه می‌شود و امکان مسدود کردن تمامی راهها وجود ندارد، نمی‌توان این محیط ضدغونی و احیاناً استریل را برای مدت زمان طولانی حفظ کرد. بدین ترتیب یک محیط استریل دارای استعداد بالقوه جهت الودگی مجدد و چه بسا الودگی توسط یک میکروارگانیسم پاتوژن همانند *E. faecalis* می‌باشد که نهایتاً می‌تواند منجر به شکست درمان و ایجاد یک عفونت مقاوم‌تر از قبل گردد. با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد در صورت امکان اگر بتوان از میکروارگانیسمی در محیط کanal ریشه استفاده نمود که ضمن غیر پاتوژن بودن و biocompatible باشد با داشتن این امکان (probiotic)، قابلیت زیست در محیط کanal ریشه را نیز داشته باشد و بتواند باعث مهار رشد میکروارگانیسم‌های پاتوژن کanal ریشه شود، می‌تواند تحول بزرگی در درمان‌های اندودنتیک ایجاد نماید.

باتوجه به شرایط خاص سیستم کanal ریشه تحت درمان اندودنتیک، باکتری‌های LAB می‌توانند انتخاب مناسبی جهت بررسی این فرضیه باشند. در این مطالعه این باکتری‌ها را از مواد لبنی که به طور معمول و روزانه توسط انسان مصرف می‌شود (همچون شیر و ماست) و غیر پاتوژن بودن و حتی مفید بودن آنها به اثبات رسیده، استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که باکتری‌های پاتوژن کanal ریشه دندان به LAB مورد آزمایش حساس بوده و رشد آنها مهار می‌شود. همچنین نکته جالب توجه دیگر اینکه اضافه کردن باکتری *E. faecalis* به مخلوط

- C.sporogeness ۲ (بار)
 - C.biformentans ۱ (بار)
 - mob.cartisii ۳ (بار)
 - L.jensenii ۲ (بار)
 - Prop.acnes ۲ (بار)
 - Bifidobacterium ۱ (بار)
 - F.varium ۱ (بار)
 - C.botulinum
 - Wolinella
 - Capnocytophaga
 - A.israelii
 - Pr.corporis
 - Pr.melanologenicous
 - L.acidophilus
 - E.faecalis
- در خصوص بررسی تأثیر افزودن *E.faecalis* به نمونه‌های میکروبی مقاوم و حساس که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، دیده شد که در ۱۴ نمونه (۷۰٪) مقاوم و ۶ نمونه (۳۰٪) حساس، پس از اضافه نمودن *E.faecalis* به نمونه‌ها، به ۱۴ نمونه (۷۰٪) حساس و ۶ نمونه (۳۰٪) مقاوم تغییر یافتند که این اختلاف ($p=0.01$) معنی‌دار می‌باشد.

بحث و نتیجه گیری

لاکتیک اسید باکتری‌ها (لاکتوباسیل‌ها) تقریباً ۱٪ از فلور میکروبی قابل کشت دهان را تشکیل می‌دهند (۸). لاکتیک اسید باکتریا (LAB) و مخصوصاً تأثیرات مثبتی بر روی هموستازیس (Homeostasis) میزبان شامل فعال کردن سیستم ایمنی دارا می‌باشند و می‌توانند سلول‌های تولید کننده IgA و IgG و ماکروفازها را نیز فعال نمایند. همچنین می‌توانند اثر ضد ویروسی بر علیه ویروس‌های تب خال داشته باشد (۱۰،۹). LAB می‌توانند با تولید متabolیت‌های مختلف مثل H_2O_2 (۱۱)، اسید لاکتیک (۱۲)، Immunomodulation (۱۹-۱۴)، Biosurfactants (۲۲-۲۰) مولکول‌های ضد میکروبی شامل باکتریوسین (Bacteriocin) و مواد شبیه باکتریوسینی (۲۳)، خاصیت ضد باکتریایی داشته باشند.

به صورت in vitro نشان داده شده که بعضی از لاکتوباسیل‌ها و لاکتوکوک‌ها فعالیت ضد میکروبی بر علیه پاتوژن‌های پریودنتال مثل پورپیروموناس ژنژیوالیس و پرووتلایترمیدیا دارا می‌باشند (۲۵،۲۶) و نیز لاکتوباسیل‌های دهانی (homo) و heterofermentative رشد پاتوژن‌های پریودنتال را سرکوب می‌کنند (۲۶).

همچنین دیده شده که LAB بر روی استرپتوکک موتانس مؤثر است و باعث مهار آن می‌شود و می‌تواند پوسیدگی حاصل از آن را کاهش دهد (۲۷).

خصوص انتخاب بهترین LAB چهت کمک به درمان عفونت‌های اندودنتیک باز نماید. مطالعه حاضر عنوان یک مطالعه In vitro و اولیه در این خصوص می‌باشد. لذا چهت رسیدن به یک نتیجه مطلوب و استفاده از LAB در درمان عفونت کانال ریشه نیازمند مطالعات مکمل و گستردگی می‌باشد.

تقدیر و تشکر

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به شماره قرارداد ۱۳۲/۷۹۱۲ می‌باشد.

میکروارگانیسمی حاصل از کanal ریشه عفونی باعث افزایش اثر مهاری LAB بر روی میکروارگانیسم‌ها می‌شود. لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که عفونت کانال ریشه که بواسطه وجود E. faecalis مقاوم‌تر به درمان‌های معمول اندودنتیک می‌شود به روش جدید حساس‌تر است. از طرفی دیگر براساس مطالعات موجود E. faecalis خود نیز به LAB حساس بوده و LAB می‌تواند مانع رشد E. faecalis شوند (۳۰). که این مورد نیز می‌تواند یکی از نقاط قوت LAB در کمک به درمان عفونت‌های کانال ریشه دندان باشد.

همانطور که ذکر شد LAB دارای طیف گسترده‌ای از میکروارگانیسم‌ها می‌باشد که میزان متفاوتی از متابولیت‌های ذکر شده تولید می‌نمایند و این موضوع می‌تواند باب مطالعات دیگری را در

منابع:

- 1- Stephen Cohen , Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the Pulp. 9th ed. London: mosby,2006. p: 581 – 2
- 2- Shuping, G. Ørstavik, D. Sigurdsson, A. Trope, M. Reduction of Intracanal Bacteria Using Nickel-Titanium Rotary Instrumentation and Various Medications. J Endodon,2000; Volume 26(12), December : p 751–755
- 3- Peters LB, Van Winkelhoff AJ, Buijs JF, Wesselink PR. Effects of instrumentation, irrigation and dressing with calcium hydroxide on infection in pulpless teeth with periapical bone lesions. Int Endod J.2002: 35: 13–21.
- 4- John I.Ingle,Leif K. Bakland. Endodontics. 5th ed.London:Hamiltonp , 2002:p 77
- 5- Clark-Holke D, Drake D, Walton R, Rivera E, Gutmiller JM. Bacterial penetration through canals of endodontically treated teeth in the presence or absence of the smear layer. Journal of Dentistry 2003; 31: 275–81.
- 6- Gilbert P. , Das J. , Foley I. Biofilm susceptibility to antimicrobials. Adv Dent Res.1997; U(1),April :160-167.
- 7- Haapasalo HK, SireÅ n EK, Waltimo TMT, érstavik D, Haapasalo MPP. Inactivation of local root canal medicaments by dentine: an in vitro study. International Endodontic Journal.2000; 33: 126-131.
- 8- Koill-Klais P, Mañdar R, Leibur E, Marcotte H, Hammarström L, Mikelsaar M. Oral lactobacilli in chronic periodontitis and periodontal health: species composition and antimicrobial activity.Oral Microbiol Immunol ,2005; 20: p354–361.
- 9- Fernandes C.F., Shahani K.M., Anticarcinogenic and immunological properties of dietary lactobacilli, J. Food Prot.1990 ; 53 : 704–710.
- 10- Watanabe T., Saito H., Protection of mice against herpes simplex virus infection by a Lactobacillus casei preparation (LC9018) in combination with inactivated viral antigen, Microbiol. Immunol. 1986;30 : 111–122.
- 11- St Amant, D.C., Valentim-Bon, I.E. and Jerse, A.E. Inhibition of Neisseria gonorrhoeae by Lactobacillus species that are commonly isolated from the female genital tract. Infect. Immun. 2002; 70: 7169–7171.
- 12- Vandenbergh, P.A. Lactic acid bacteria, their metabolic products and interference with microbial growth. FEMS Microbiol. Rev. 1993 ;12 : 221–238.
- 13- Velraeds, M.M., Van Der Mei, H.C., Reid, G. and Busscher, H.J. Inhibition of initial adhesion of uropathogenic Enterococcus faecalis by biosurfactants from Lactobacillus isolates. Appl. Environ. Microbiol.1996;62: 1958–1963.
- 14- Blum, S. and Schiffriin, E.J. Intestinal microflora and homeostasis of the mucosal immune response: implications for probiotic bacteria? Curr. Issues Intest. Microbiol.2003; 4: 53–60.
- 15- Minja Miettinen, Jaana Vuopio-Varkila, Kari Varkila. Production of Human Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin-6, and Interleukin-10 Is Induced by Lactic Acid Bacteria. Infection and immunity; 1996, Vol. 64, No. 12 : p. 5403–5405
- 16- Klebanoff, S.J., Watts, D.H., Mehlin, C. and Headley, C.M. Lactobacilli and vaginal host defense: activation of the human immunodeficiency virus type 1 long terminal repeat, cytokine production, and NF-kappaB. J. Infect. Dis.1999; 179: 653–660.
- 17- Chen, T., Isomaki, P., Rimpilainen, M. and Toivanen, P. Human cytokine responses induced by gram-positive cell walls of normal intestinal microbiota. Clin. Exp. Immunol ,1999 ; 118: 261–267.
- 18- Yasui, H., Shida, K., Matsuzaki, T. and Yokokura, T. Immunomodulatory function of lactic acid bacteria. Antonie Van Leeuwenhoek ,1999 ; 76: 383–389. (abstract)
- 19- Matsuzaki, T. and Chin, J. (2000) Modulating

- immune responses with probiotic bacteria. *Immunol. Cell Biol.* 2000; 78: 67–73. (abstract)
- 20-** Kim, T.S., Hur, J.W., Yu, M.A., Cheigh, C.I., Kim, K.N., Hwang, J.K. and Pyun, Y.R. Antagonism of *Helicobacter pylori* by bacteriocins of lactic acid bacteria. *J. Food Protect.* 2003; 66: 3–12.
- 21-** Zamfir, M., Callewaert, R., Cornea, P.C., Savu, L., Vatafu, I. and De Vuyst, L. Purification and characterization of a bacteriocin produced by *Lactobacillus acidophilus* IBB 801. *J Appl Microbiol* 1999; 87: 923–931.
- 22-** Zamfir, M., Callewaert, R., Cornea, P.C. and De Vuyst, L. Production kinetics of acidophilin 801, a bacteriocin produced by *Lactobacillus acidophilus* IBB 801. *FEMS Microbiol. Lett.* 2000; 190: 305–308.
- 23-** M Silva, N V Jacobus, C Deneke, and S L Gorbach. Antimicrobial substance from a human *Lactobacillus* strain. *Antimicrob Agents Chemother.* 1987 August; 31(8): 1231–1233.
- 24-** Doran A, Kneist S, Verran J. Ecological control: in vitro inhibition of anaerobic bacteria by oral streptococci. *Microp Ecol Health Dis* 2004; 16: 23–27.
- 25-** Soookhee S, Chulasiri M, Prachyabrued W. Lactic acid bacteria from healthy oral cavity of Thai volunteers: inhibition of oral pathogens. *J Appl Microbiol* 2001; 90: 172– 179.
- 26-** Koill-Klais P, Mañdar R, Leibur E, Marcotte H, Hammarström L, Mikelsaar M. Oral lactobacilli in chronic periodontitis and periodontal health: species composition and antimicrobial activity. *Oral Microbiol Immunol* 2005; 20: 354–361.
- 27-** H. Nikawaa, S. Makihiraa, H. Fukushimaa, H. Nishimuraa, Y. Ozakia, K. Ishidaa, S. Darmawana, T. Hamadaa, K. Harab, A. Matsumotob, T. Takemotob, R. Aimic *Lactobacillus reuteri* in bovine milk fermented decreases the oral carriage of mutans streptococci *International Journal of Food Microbiology*, 2004; 95 : 219– 223
- 28-** John I.Ingle,Leif K. Bakland. *Endodontics*. 5th.London:Hamiltonp , 2002 p : 67
- 29-** Adib V, Spratt D, Ng Y-L, Gulabivala K. Cultivable microbial flora associated with persistent periapical disease and coronal leakage after root canal treatment: a preliminary study. *Int Endod J*, 2004; 37:542–551.
- 30-** A. Nakhdjavani F., Moazami N., Lamea H.Growth inhibition of pathogens by lactic acid bacteria producing inhibitory substances. *Medical Journal of IRI*,1996; Vol 10,No.2:p159 -163.