

# بررسی در بیماران کلاس II و کلاس III اسکلتال

دکتر طاهره حسینزاده نیک<sup>\*</sup> - دکتر اعظم ملکوتی<sup>\*\*</sup>

\*دانشیار گروه آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

<sup>\*\*</sup>دندانپزشک

**Title:** An investigation of craniocervical posture in class II & class III skeletal patients

**Authors:** HoseinZadeh-Nik T. Associate Professor\*, Malakooti A. Dentist

**Address:** \* Department of Orthodontic, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

**Statement of Problem:** Craniocervical Posture is a factor in the development and function of Craniofacial Structure. Previous studies of different samples have demonstrated associations between craniocervical posture and craniofacial morphology.

**Purpose:** This study aimed to examine whether any significant association is evident or not between craniocervical posture and the occurrence of Class II & Class III skeletal malocclusions.

**Materials and Methods:** A sample of 76 subjects with Class II & Class III skeletal malocclusion aged 9-11 and >18 years were selected. None of them had received orthodontic treatment. Lateral cephalometric radiographs were taken in natural head position (NHP), and craniocervical and cranohorizontal angels were traced and determined for analysis of craniocervical posture.

**Results:** According to the craniocervical posture, most class II skeletal patients have flexed heads and class III skeletal patients have extended heads, as a result malocclusion in these patients seems to become more severe. With increase in age, class II skeletal patients have more flexed their heads and malocclusion become more severe, while with increase in age in class III skeletal patients, their heads become extended and once again malocclusion thought to be more severe. In class II skeletal patients, craniocervical posture has a significant correlation with the vertical growth pattern, but shows little correlation with the horizontal growth pattern. In class III skeletal patients, craniocervical posture shows no correlation to any of the vertical & horizontal growth patterns, of course the mean of vertical angles is less in these patients and probably in order to make these relation significant in Class III skeletal patients there is need for more samples. In class II & class III skeletal patients, the amount of Na.prep-point A and pog-Na.prep with craniocervical posture shows a significant correlation.

**Conclusion:** Consideration of craniocervical posture (in addition to cephalometric angles) lead to making better treatment planning.

**Key words:** Craniocervical posture; Natural head position; Head posture; Class II; Class III

*Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences (Vol. 17; No. 4; 2005)*

+ مؤلف مسؤول: دکتر طاهره حسینزاده نیک؛ آدرس: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان قدس - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی ارتودنسی تلفن: ۰۲۶۴۰۲۶۴۰ داخلي ۲۲۱۳ دورنگار: ۰۲۶۰۱۱۲۲

## چکیده

**بیان مسأله:** موقعیت (Posture) سر و ستون گردنی (Craniocervical Posture) به عنوان عاملی مؤثر در رشد و نمو و عملکرد ساختارهای دندانی صورتی مطرح شده است. توجه به ارتباط بین Posture کرانیوسرویکال و انواع مالاکلوژن‌ها و فرم سر و صورت (مورفولوژی کرانیوفاسیال) می‌تواند در تصمیم‌گیری بهتر جهت درمان مالاکلوژن‌های مختلف مفید باشد.

**هدف:** مطالعه حاضر با هدف بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین Posture کرانیوسرویکال و مالاکلوژن‌های کلاس II و کلاس III اسکلتال انجام شد.

**روش بررسی:** در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطوعی، ۷۶ بیمار مبتلا به مالاکلوژن اسکلتال کلاس II و کلاس III در دو محدوده سنی ۹-۱۱ سال و بالای ۱۸ سال انتخاب شدند؛ از بیماران در موقعیت طبیعی سر (Natural Head Position: NHP) رادیوگرافی لترال سفالومتری تهیه شد. بعد از Tracing علاوه بر آنالیزهای رایج سفالومتری، زوایای کرانیوسرویکال (NSL/CVT, NSL/OPT) و زوایای سرویکوکوئریزوونتال (OPT/HOR, CVT/HOR) نیز جهت تعیین Posture کرانیوسرویکال اندازه گیری شد.

**یافته‌ها:** با توجه به Posture کرانیوسرویکال، بیماران کلاس II اسکلتال بیشتر سرشان را به سمت جلو و پایین متمایل کردند (Flexion) و بیماران کلاس III اسکلتال بیشتر سرشان را به سمت عقب و بالا متمایل کردند (Extension)؛ در نتیجه مالاکلوژن این بیماران شدیدتر به نظر رسید. با افزایش سن، بیماران کلاس II اسکلتال سرشان را به سمت جلو و پایین بیشتر متمایل کردند و مالاکلوژن بیماران شدیدتر به نظر رسید؛ در صورتی که بیماران کلاس III اسکلتال با افزایش سن، سرشان را به سمت عقب و بالا متمایل کردند و باز هم موجب شدیدتر به نظر رسیدن مالاکلوژن شد. در بیماران کلاس II اسکلتال، Posture کرانیوسرویکال همبستگی معنی‌داری با رشد عمودی داشت، ولی با رشد افقی همبستگی کمی نشان داد. در بیماران کلاس III اسکلتال Posture کرانیوسرویکال با هیچ‌کدام از ابعاد رشدی عمودی و افقی همبستگی نشان نداد. در بیماران کلاس II و III اسکلتال، مقادیر pog-Na.prep و pog-Na.prep-point A با Posture کرانیوسرویکال همبستگی معنی‌داری نشان داد.

**نتیجه گیری:** از آنجا که اساس طرح درمان در دیدگاه‌های جدید ارتدونسی از نمای صورت آغاز می‌گردد و با استفاده از نتایج حاصل از آنالیزهای سفالومتری تعديل می‌گردد، توجه به Posture کرانیوسرویکال علاوه بر زوایای سفالومتری این مزیت را دارد که تشدید یا اصلاح روابط فکی با تعییر در موقعیت سر در طرح درمان در نظر گرفته می‌شود.

**کلید واژه‌ها:** Posture کرانیوسرویکال؛ وضعیت طبیعی قرارگیری سر؛ وضعیت قرارگیری سر؛ کلاس II، کلاس III

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۷، شماره ۴، سال ۱۳۸۳)

## مقدمه

برای تعیین Posture کرانیوسرویکال هر فرد، نه تنها داشتن و در اختیار داشتن یک موقعیت طبیعی از سر بلکه داشتن یک موقعیت طبیعی از ستون گردنی نیز لازم است. ثبت رادیوگرافی‌های سفالومتری در NHP (Natural Head Position) نه تنها یک موقعیت طبیعی از سر، بلکه یک موقعیت طبیعی از ستون گردنی را نیز در اختیار آناتروپولوژی، NHP به عنوان یک پایه Postural برای آنالیز

تحقیقات نشان داده است که Posture سر و ستون گردنی (Cranio-Cervical Posture) به عنوان عاملی مؤثر در رشد و نمو و عملکرد ساختارهای دندانی صورتی، مطرح است. ارتباط بین Posture کرانیوسرویکال و انواع مالاکلوژن‌ها و رشد و نمو صورت (مورفولوژی کرانیوفاسیال) در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته و نتایج متفاوتی ارائه شده است (۱-۹).

زاویه کرانیوسروپیکال در بیماران قبل و بعد از جراحی اصلاح پروگناتیسم فک پایین انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بعد از جراحی ۷۷٪ از بیماران موقعیت سرشان را تغییر دادند (۱۶).

مطالعات Solow و Siersbaek-Nielsen در سال ۱۹۹۲ اشاره داد که یک زاویه کرانیوسروپیکال کوچک در ارتباط با رشد افقی صورت و زاویه کرانیوسروپیکال بزرگ در رابطه با رشد عمودی صورت می‌باشد (۷).

در سال ۱۹۹۸، Solow و Sonnesen مطالعه‌ای با هدف تعیین یک الگوی ارتباطی بین Posture سر و گردن و موقع مال‌اکلوژن‌های مختلف انجام دادند. اکلوژن زوایای کرانیوسروپیکال نشان داد و بیمارانی که دارای این مال‌اکلوژن بودند، زوایای کرانیوسروپیکالی ۳-۴٪ کوچکتر از بیماران فاقد این مال‌اکلوژن داشتند؛ در این مطالعه برای مال‌اکلوژن‌های مرتبط با فضاهای دندانی (Space Posture) Anomalies کرانیوسروپیکال به دست آمد (۱۷).

مطالعه حاضر با هدف بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین موقعیت کرانیوفاسیال و مال‌اکلوژن‌های کلاس II و III اسکلتال انجام شد.

### روش بررسی

در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی، چهار گروه ۱۹ نفره (۷۶ نفر) از بیماران مبتلا به مال‌اکلوژن اسکلتال کلاس II - در دو دوره سنی ۹-۱۱ سال (دوران رشد اسکلتال) و بالای ۱۸ سال (پتانسیل رشدی خاتمه یافته) - و بیماران مبتلا به مال‌اکلوژن اسکلتال کلاس III - در دو دوره سنی ۹-۱۱ سال و بالای ۱۸ سال - مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران براساس معاینات کلینیکی، شامل معاینه داخل دهانی با استفاده از آینه دندانپزشکی و معاینه خارج

مورفوولژی کرانیوفاسیال فرض شده است (۱۰-۱۴). این مسأله که آیا در افرادی که مال‌اکلوژن کلاس II و با کلاس III اسکلتال دارند، با تغییر موقعیت سر به سمت بالا، این مال‌اکلوژن از نظر کلینیکی خفیفتر و فک پایین بیماران عقب‌آمده‌تر به نظر می‌رسد یا بر عکس، حائز اهمیت است؛ بنابراین Posture کرانیوسروپیکال در شدیدتر یا خفیفتر به نظر رسیدن مال‌اکلوژن‌ها نقش بسزایی دارد. ارتباط بین Head Posture و مورفوولژی کرانیوفاسیال برای اولین بار در سال ۱۹۲۶ توسط Schwartz بیان شد؛ وی تکامل مال‌اکلوژن کلاس II را به Hyper Extension سر در رابطه با ستون گردنی در حین خواب نسبت داد (۱).

در سال ۱۹۷۶ Solow و Tallgren پی برندند که روابط عمودی فک همبستگی مثبتی با موقعیت سر در رابطه با ستون گردنی دارد؛ در حالی که روابط سازیتال فک همبستگی ضعیفی با زاویه کرانیوسروپیکال نشان داد (۲).

این محققان یک سال بعد، مطالعه‌ای مشابه با هدف تحلیل ارتباطات بین مورفوولژی دنتتوالوئولار و روابط سر و ستون گردنی انجام دادند و هیچ ارتباطی بین Posture کرانیوسروپیکال و پروگناتیسم آلوئولار، شبیه انسیزورها یا اورجت گزارش نکردند (۴).

در سال ۱۹۸۴ Solow و همکاران گزارش کردند که به طور متوسط زاویه زیاد کرانیوسروپیکال در ارتباط با ابعاد کوچک فک پایین، رتروگناتیسم فک پایین و شبیه زیاد آن می‌باشد (۱).

در سال ۱۹۸۶ Solow و Siersback-Nielsen مشاهده کردند که کاهش زاویه کرانیوسروپیکال در ارتباط با چرخش رشدی رو به جلو در فک پایین و افزایش زاویه کرانیوسروپیکال مرتبط با چرخش رشدی رو به عقب یا کاهش چرخش رشدی رو به جلو در فک پایین بود (۵).

در سال ۱۹۸۹ Wenzel و همکاران، مطالعه‌ای با هدف ارزیابی تأثیر موقعیت فک پایین روی Posture سر با ارزیابی

چهارمین مهره گردنی  
خطوط رفرنس گردنی:  
Mammalian Vertebra Tangent) OPT  
به زوائد انتوئید که از cv2ip می‌گذرد.  
Cervical Vertebra Tangent) CVT): مماس

خلفی به زوائد انتوئید که از cv4ip می‌گذرد.  
پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات به دست آمده  
داده‌پردازی شد و در آنها شاخصهای مورد لزوم مانند میانگین  
و انحراف معیار محاسبه گردید و آزمونهای آماری لازم و  
آزمون همبستگی Pearson Correlation به عمل آمد و از  
نتایج آزمونها در راستای قبول یا رد فرضیات استفاده گردید.

### یافته‌ها

میانگین زوایای کرانیوسرویکال NSL/OPT و NSL/CVT در بیماران کلاس II بیشتر از بیماران کلاس III بود؛ در حالی که میانگین زوایای NSL/OPT/HOR در بیماران کلاس II کمتر از بیماران کلاس III بود (جدول ۱).

در بیماران کلاس II میانگین زوایای کرانیوسرویکال NSL/CVT و NSL/OPT با افزایش سن افزایش یافت؛ در صورتی که میانگین زوایای NSL/OPT/HOR و NSL/CVT/HOR با افزایش سن کاهش یافت (جدول ۲).

در بیماران کلاس III میانگین زوایای کرانیوسرویکال NSL/OPT و NSL/CVT با افزایش سن کاهش یافت؛ ولی میانگین زوایای NSL/OPT/HOR و NSL/CVT/HOR با افزایش سن افزایش یافت (جدول ۳).

در بیماران کلاس II زوایای کرانیوسرویکال NSL/OPT و NSL/CVT همبستگی کاملاً معنی‌داری را با رشد عمودی نشان داد ( $P < 0.02$ ) (جدول ۴).

در بیماران کلاس III زوایای تعیین‌کننده Cranio Cervical Posture همبستگی معنی‌داری با رشد

دهانی با مشاهده صورت بیمار از رویه‌رو و نیمرخ، انتخاب گردیدند و در صورت داشتن شرایط لازم جهت انجام رادیوگرافی لترال سفالومتری بر پایه NHP به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شدند.

مشخصاتی که در انتخاب نمونه‌ها مورد نظر بودند، به شرح زیر بود:

- بیماران در دو دوره سنی ۹-۱۱ سال و بالای ۱۸ سال باشند.
- بیماران دارای مالاکلوزن اسکلتال کلاس II و III باشند.

- بیماران هیچ‌گونه آنومالی کرانیوفاسیال، انسداد راه هوایی، سابقه ضربه به TMJ، سابقه درمان ارتودنسی، سابقه بیماری سیستمیک یا مادرزادی و مشکل شدید بینایی نداشته باشند.

پس از انتخاب بیماران، کلیشه‌های رادیوگرافی Trace و Stainer، McNamara، Harvold Wit's برای تعیین مالاکلوزن کلاس II و III و زوایای کرانیوسرویکال (NSL/CVT, NSL/OPT) و سرویکو-هوریزونتال (CVT/HOR, OPT/HOR) برای تعیین Cranio-Cervical Posture انجام شد.

برای تعیین Cranio-Cervical Posture از روش مورد استفاده در مطالعات Solow و Tallgren استفاده شد (۱۷) (شکل ۱)؛ بدین‌منظور نقاط و خطوط مرجع گردنی مورد استفاده شامل موارد زیر بودند:

### نقاط مرجع گردنی:

cv2tg: خلفی- فوقانی ترین نقطه روی زوائد انتوئید

دومین مهره گردنی

cv2ip: خلفی- تحتانی ترین نقطه روی Body (جسم)

دومین مهره گردنی

cv4ip: خلفی- تحتانی ترین نقطه روی Body (جسم)

عمودی نشان نداد (جدول ۵). در بیماران کلاس III Posture کرانیوسروپکال همگنی معنی‌داری با رشد افقی نشان نداد؛ در حالی که با مقادیر Na.prep-point A و Pog-Na.prep تا حدی همگنی معنی‌داری با شاخصهای بعد افقی Wit's ANB و نشان نداد؛ ولی با مقادیر A و Na.prep-point Pog-Na.prep همگنی معنی‌داری داشت (جدول ۷).

جدول ۱- مقایسه زوایای کرانیوسروپکال در بیماران CI II و CI III

P-value	انحراف معیار	میانگین	تعداد	کلاس	زوایا
.۰/۰۶۵	۹/۴۶۱۲۶	۹۷/۳۵	۴۰	۲	NSL/OPT
.۰/۰۶۵	۸/۷۷۰۵۴	۹۳/۵۲۵	۴۰		
.۰/۰۰۹	۱۰/۰۷۷۱۱	۱۰۴/۱۲۵	۴۰	۲	NSL/CVT
.۰/۰۰۹	۸/۳۷۵۱۸	۹۸/۶	۴۰		
.۰/۲۶۹	۸/۱۵۲۹۸	۹۱/۸۷۵	۴۰	۲	OPT/HOR
.۰/۲۶۹	۸/۳۰۶۲۸	۹۳/۹۲۵	۴۰		
.۰/۰۴۳	۷/۶۱۵۶	۸۵/۵۵	۴۰	۲	CVT/HOR
.۰/۰۴۳	۷/۵۸۸۶۲	۸۹/۰۵	۴۰		

جدول ۲- مقایسه زوایای کرانیوسروپکال در بیماران CI II در حال رشد و بالغین

P-value	انحراف معیار	میانگین	تعداد	سن	زوایا
.۰/۱۳۴	۷/۲۴۰۵۹	۹۵/۱۰	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	NSL/OPT
.۰/۱۳۶	۱۰/۹۱۷۸۸	۹۹/۶	۲۰		
.۰/۰۷۱	۷/۷۳۱۵۱	۱۰۱/۲۵	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	NSL/CVT
.۰/۰۷۲	۱۱/۴۰۷۰۱	۱۰۷	۲۰		
.۰/۰۲۹	۸/۷۷۳۶۱	۹۴/۹۵	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	OPT/HOR
.۰/۰۳۰	۶/۵۷۶۶۷	۸۹/۱۰	۲۰		
.۰/۰۰۱	۷/۰۶۰۶۴	۸۹/۲۰	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	CVT/HOR
.۰/۰۰۲	۶/۴۱۴۶۲	۸۱/۹۰	۲۰		

جدول ۳- مقایسه زوایای کرانیوسروپکال در بیماران CI III در حال رشد و بالغین

P-value	انحراف معیار	میانگین	تعداد	سن	زوایا
.۰/۱۶۸	۹/۴۳۹۴۲	۹۵/۴۵	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	NSL/OPT
.۰/۱۶۸	۷/۸۰۹۵۸	۹۱/۶۰	۲۰		
.۰/۲۴۷	۸/۸۹۸۷	۱۰۰/۱۵	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	NSL/CVT
.۰/۲۴۷	۷/۷۲۸۷۹	۹۷/۰۵	۲۰		
.۰/۴۶۵	۹/۷۰۳۳۶	۹۲/۹۵	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	OPT/HOR
.۰/۴۶۵	۶/۷۴۲۶۴	۹۴/۹	۲۰		
.۰/۸۰۶	۸/۵۴۰۱۵	۸۸/۷۵	۲۰	سال ۹-۱۱ بالای ۱۸ سال	CVT/HOR
.۰/۸۰۶	۶/۷۱۴۲۸	۸۹/۳۵	۲۰		

**بحث و نتیجه‌گیری**

دیگری از Solow و Tallgren همخوانی ندارد (۴) که ممکن

است به دلیل تفاوت در روش تحقیق باشد.

در بیماران کلاس II با افزایش سن سر به سمت جلو و پایین متمایل می‌شود و Flexion می‌یابد و مالاکلوژن شدیدتر به نظر می‌رسد؛ در حالی که در بیماران کلاس III با افزایش سن، سر به سمت عقب و بالا متمایل می‌شود و Extension پیدا می‌کند و موجب شدیدتر به نظر رسیدن مالاکلوژن می‌شود.

در بیماران کلاس II شب سر نسبت به ستون گردنی بیشتر و شب سر گردنی نسبت به افق حقیقی کمتر از بیماران کلاس III است و موجب می‌شود سر بیماران کلاس II بیشتر به سمت جلو و پایین متمایل گردد و Flexion پیدا کند؛ بر عکس سر بیماران کلاس III، بیشتر به سمت عقب و بالا متمایل است و سر Extension پیدا می‌کند؛ در نتیجه مالاکلوژن بیماران کلاس II و III شدیدتر به نظر می‌رسد.

این نتیجه با یافته‌های مطالعه Solow (۲) و Tallgren (۱) همخوانی دارد؛ اما با نتایج مطالعه Solow و همکاران (۱) همخوانی ندارد.

**جدول ۴- رابطه Cranio-Cervical Posture با تغییرات رشدی عمودی در بیماران CI II**

زاویه	نتیجه	NSL/OPT	NSL/CTV	CVT/HOR	OPT/HOR
SN-GOGN	ضریب همبستگی پیرسون	-0/541 ..	-0/526 ..	-0/276 ..	-0/222
	P-value	< 0/0001	< 0/0001	0/085	0/150
	تعداد	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
FMA	ضریب همبستگی پیرسون	-0/567 ..	-0/544 ..	-0/286 ..	-0/3620
	P-value	< 0/0001	< 0/0001	0/114	0/021
	تعداد	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
Jarabak Index	ضریب همبستگی پیرسون	-0/47500	-0/49500	-0/099	-0/087
	P-value	0/002	0/001	0/542	0/091
	تعداد	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰

.. همبستگی در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است.

**جدول ۵- رابطه Cranio-Cervical Posture با تغییرات رشدی عمودی در بیماران CI III**

زاویه	نتیجه	NSL/OPT	NSL/CTV	CVT/HOR	OPT/HOR
SN-GOGN	ضریب همبستگی پیرسون	-0/248	-0/291	-0/122	-0/096
	P-value	-0/122	-0/68	-0/453	-0/556
	تعداد	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
FMA	ضریب همبستگی پیرسون	-0/219	-0/180	-0/1033	-0/022
	P-value	0/175	0/267	0/841	0/891
	تعداد	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
Jarabak Index	ضریب همبستگی پیرسون	-0/208	-0/250	-0/056	-0/023
	P-value	0/199	0/120	0/729	0/89
	تعداد	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰

جدول ۶- رابطه Cranio-Cervical Posture با تغییرات رشدی افقی در بیماران CI II

CVT/HOR	OPT/HOR	NSL/CTV	NSL/OPT	نتیجه	زاویه
-0/145	-0/145	-0/27	-0/257	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/373	-0/371	-0/092	-0/11	P-value	ANB
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/125	-0/126	-0/28	-0/315	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/442	-0/402	-0/08	-0/48	P-value	Wit's
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/219	-0/145	-0/18	-0/01	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/175	-0/27	-0/915	-0/901	P-value	Diff-Jaw
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/22	-0/241	-0/409	-0/396	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/172	-0/125	-0/003	-0/011	P-value	Na.prep-A
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/397	-0/426	-0/268	-0/184	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/011	-0/005	-0/094	-0/256	P-value	Pog-Na.prep
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	

.. همبستگی در سطح ۰/۰ معنی دار است.

جدول ۷- رابطه Cranio-Cervical Posture با تغییرات رشدی افقی در بیماران CI III

CVT/HOR	OPT/HOR	NSL/CTV	NSL/OPT	نتیجه	زاویه
-0/118	-0/228	-0/022	-0/089	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/468	-0/157	-0/894	-0/586	P-value	ANB
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/029	-0/028	-0/089	-0/096	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/861	-0/865	-0/583	-0/557	P-value	Wit's
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/028	-0/018	-0/122	-0/124	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/818	-0/911	-0/415	-0/444	P-value	Diff-Jaw
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/264	-0/2820	-0/284	-0/203	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/1	-0/022	-0/075	-0/209	P-value	Na.prep-A
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	
-0/250	-0/2760	-0/206	-0/158	ضریب همبستگی پیرسون	
-0/027	-0/017	-0/203	-0/23	P-value	Pog-Na.prep
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	تعداد	


.. همبستگی در سطح ۰/۰ معنی دار است.

همبستگی معنی‌داری با رشد عمودی نشان نداد؛ متاسفانه در این زمینه مطالعه مشابهی برای مقایسه یافت نشد. از آنجا که متغیر اصلی برای تعیین نمونه‌ها بر اساس هدف اصلی تحقیق شاخصهای بعد افقی بودند، شاید در بیماران کلاس III برای بررسی Posture کرانیوسرویکال و بعد عمودی نیاز به حجم نمونه بیشتری باشد و نتایج حاصل از این بررسی می‌تواند راهنمایی برای بررسیهای بعدی باشد. زوایای کرانیوسرویکال همبستگی آماری معنی‌داری در بیماران کلاس II و III با شاخصهای ANB و Wit's و Nasion-Gnathion-Lateral (NGL) نشان نداد ولی در بیماران کلاس II زوایای کرانیوسرویکال با مقدار زوایای سرویکوهوریزوتال با مقدار Na.prep-point A pog-Na.prep وجود داشت. در بیماران کلاس III نیز زوایای سرویکوهوریزوتال با pog-Na.prep همبستگی معنی‌دار داشت.

از آنجا که مقادیر A و Na.prep-point A pog-Na.prep از آنالیز McNamara تعیین‌کننده‌های معنی‌داری برای تعیین نمای اسکلتال می‌باشند، می‌توان اختلاف در نتایج حاصل از این موارد را به اختلاف میان آنالیزها و تأثیر عوامل هندسی مختلف بر روی آنها نسبت داد.

### تشکر و قدردانی

این تحقیق در مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد؛ بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی اعلام می‌گردد.



شکل ۱- نمونه Tracing سفالومتری بیماران

همچنین از بین زوایای تعیین‌کننده Posture کرانیوسرویکال، زوایای سرویکوهوریزوتال با افزایش سن بیشتر تغییر می‌کنند؛ یعنی شیب ستون گردنی نسبت به افق حقیقی بیشتر از شیب آن نسبت به سر تغییر می‌یابد. در تحقیق حاضر، زوایای کرانیوسرویکال در بیماران کلاس II، همبستگی مثبت و معنی‌داری با رشد عمودی وجود داشت ( $P=0.000$ )؛ در حالی که زوایای سرویکوهوریزوتال تا حدی رابطه منفی نشان دادن ولی تغییر آنها از نظر آماری معنی‌دار نبود که با یافته‌های Matalan Siersbaek-Nielsen و Solow (۲) Tallgren و Solow (۷) همخوانی دارد.

در بیماران کلاس III Posture کرانیوسرویکال

### منابع :

- 1- Solow B, Siersbaek-Nielsen S, Greve E. Airway adequacy, head posture, and craniofacial morphology. Am J Orthod. 1984; 86(3):214-23.
- 2- Solow B, Tallgren A. Head posture and craniofacial morphology. Am J Phys Anthropol. 1976; 44(3):417-35.
- 3- Marcotte MR. Head posture and dentofacial proportions. Angle Orthod. 1981; 51 (3):208-13.
- 4- Solow B, Tallgren A. Dentoalveolar morphology in relation to craniocervical posture. Angle Orthod. 1977; 47(3): 157-64.

- 5- Solow B, Siersbaek-Nielsen S. Growth changes in head posture related to craniofacial development. Am J Orthod. 1986; 89(2):132-40.
- 6- Showfety KJ, Vig PS, Matteson S, Phillips C. Associations between the postural orientation of sella-nasion and skeletodental morphology. Angle Orthod. 1987; 57(2):99-112.
- 7- Solow B, Siersbaek-Nielsen S. Cervical and craniocervical posture as predictors of craniofacial growth. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992; 101(5):449-58.
- 8- Solow B, Tallgren A. Natural head position in standing subjects. Acta Odontol Scand. 1971; 29(5):591-607.
- 9- Solow B, Sandham A. Cranio-cervical posture: a factor in the development and function of the dentofacial structures. Eur J Orthod. 2002; 24(5): 447-56.
- 10- Leitao P, Nanda RS. Relationship of natural head position to craniofacial morphology. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000; 117(4):406-17.
- 11- Lundstrom A, Lundstrom F, Lebret LM, Moorrees CF. Natural head position and natural head orientation: basic considerations in cephalometric analysis and research. Eur J Orthod. 1995; 17(2): 111-20.
- 12- Lundstrom F, Lundstrom A. Natural head position as a basis for cephalometric analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992; 101(3):244-7.
- 13- Viazis AD. A cephalometric analysis based on natural head position. J Clin Orthod. 1991; 25(3):172-81.
- 14- Viazis AD. Atlas of Orthodontics: Principles and Clinical Applications. Philadelphia: Saunders; 1993.
- 15- Huggare J. Postural disorders and dentofacial morphology. Acta Odontol Scand. 1998; 56(6): 383-6.
- 16- Wenzel A, Williams S, Ritzau M. Changes in head posture and nasopharyngeal airway following surgical correction of mandibular prognathism. Eur J Orthod. 1989; 11(1):37-42.
- 17- Solow B, Sonnesen L. Head posture and malocclusions. Eur J Orthod. 1998; 20(6):685-93.