

تأثیر نوع زایمان بر بروز نهایی دندان مولر اول دائمی

دکتر حسین افشار - دکتر بهمن سراج - دکتر آوا عمامادالساداتی

استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
متخصص دندانپزشکی کودکان

Title: An investigation on the relationship between the type of delivery and enamel defects of the first permanent molars

Authors: Afshar H. Assistant Professor^{*}, Seraj B. Assistant Professor^{*}, Emadosadati A. Pedodontist

Address: Dept. of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Statement of Problem: Previous experiences and clinical observations indicate that enamel hypoplasia and hypocalcification of first permanent molars, among infants born in Cessarian Section Delivery (C/S) is more common than those born in Normal Vaginal Delivery (NVD). Moreover, the first permanent molar is the only tooth that its "cusp tip calcification" starts exactly at the time of delivery.

Purpose: The aim of this research was to investigate the relationship between delivery type and clinical feature of the first permanent molar. Meanwhile, the different effects of the elective and selective types of cesarian, on the clinical feature of first permanent molar, were studied.

Materials and Methods: Birth files, relation to the year 1994 and before, were extracted from a gynecologist clinic. One hundred patients with NVD, 50 patients with selective cesarian delivery and 50 patients with elective cesarian delivery were chosen to examine clinical feature of the first permanent molars of their children. The children, 6 years old or more, were examined. The medical information of the mother were extracted from her file and that of child, were asked from the mother. To analyze the result, χ^2 test was used.

Results: The prevalence of enamel defects (hypoplasia and hypocalcification) of the first permanent molar among children born by C/S, were significantly different from the children born by NVD ($P=0.0002$). Mean while, the prevalence of these enamel defects in the selective cesarian delivery was more than elective cesarian delivery (17% vs. 9%), which was not statistically significant ($P=0.07$)

Conclusion: It is suggested that gynecologists, pediatricians and pedodontists provide the parents with necessary information about the child's first permanent tooth and ask them to pay enough attention to keep this tooth which is considered as the key of occlusion.

Key words: Enamel defect; Enamel hypoplasia; Enamel hypocalcification; Cessarian Section Delivery (C/S); Normal Vaginal Delivery (NVD).

Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences (Vol. 16; No.2; 2003)

چکیده

بیان مسئله: تجربیات قبلی و مشاهدات کلینیکی حاکی از آن است که هیپوپلازی و هیپوكلسیفیکاسیون دندانهای مولر اول دائمی در کودکانی که به روش سزارین به دنیا آمداند، شایعتر از کودکانی است که به روش طبیعی تولد یافته‌اند؛ همچنین دندان مولر اول دائمی تنها دندانی است که دقیقاً در حول و حوش زایمان، کلسیفیکاسیون رأس کاسپ‌های آن آغاز می‌شود.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نوع زایمان و وضعیت کلینیکی اولین مولر دائمی انجام شد؛ همچنین تفاوت تأثیر Selective یا Elective بودن زایمانهای سزارین بر وضعیت اولین مولر دائمی بررسی گردید.

روش بررسی: با مراجعه به مطب پزشک جراح و متخصص زنان و زایمان، پرونده‌های زایمان مربوط به سالهای ۱۳۷۳ و قبل از آن استخراج شد؛ تعداد ۱۰۰ بیمار با زایمان طبیعی و ۵۰ بیمار با زایمان سزارین Selective و ۵۰ بیمار با زایمان سزارین Elective انتخاب شدند تا وضعیت دندانهای مولر اول دائمی فرزندان آنها بررسی شود. پس از تماس با بیمار برای معاینه فرزند ۶ سال به بالای آنها هماهنگی شد. اطلاعات پزشکی مادر از پرونده پزشکی وی استخراج گردید و در مورد اطلاعات مربوط به فرزند، از مادر سؤال شد. به منظور تحلیل نتایج از آزمون χ^2 استفاده شد.

یافته‌ها: نقايس مينائي (هيپوپلازى و هيپوكليسيفيكاسيون) دندان مولر اول دائمي در فرزندان متولدشده به روش سزارين به طور معنى داری با زایمان طبیعی اختلاف داشت ($P=0.0002$)؛ در ضمن ميزان شيوع اين نقايس مينائي در زايمانهای سزارين Selective بيشتر از زايمانهای سزارين 17% برابر 9% ولی از نظر آماري در اين مورد اختلاف معنى داری وجود نداشت ($P = 0.07$).

نتيجه گيري: لازم است پزشكان متخصص زنان و زایمان، متخصص کودکان و دندانپزشک متخصص کودکان آگاهی لازم را در اين زمينه به والدين ارائه نمایند تا آنها ضمن مراجعه به موقع، توجه كافی برای حفظ اين اولين دندان دائمي کودک که کلید اکلوژن وی محسوب می شود، مبذول دارند.

كليدواژه‌ها: نقايس مينا؛ هيپوپلازى مينا؛ هيپوكليسيفيكاسيون مينا؛ زایمان سزارين؛ زایمان طبیعی (واژينال)

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۸۲)

اختلال اساساً يك اختلال اكتودرمال است و تمامی

قسمتهای با منشأ مزودرمی دندان سالم می باشند. در هيپوكليسيفيكاسيون ماتريكس مينا نرمال است اما به علت عدم بلوغ، درخشندگی ميناي طبیعی وجود ندرد و مينا کدر است و ممکن است به وسیله مضغ ساییده شود^(۴). عوامل مسبب ايجاد هيپوپلازى مينا، موجب هيپوكليسيفيكاسيون نيز می شوند^(۵)؛ علل هيپوپلازى مينا به طور کلي به دو دسته موضوعي و سيستميک تقسيم می شوند. هيپوپلازى با منشأ سيستميک را هيپوپلازى كرونولوزيک می نامند؛ زيرا اين ضايعه در قسمتهایي از دندان که در دوره تشکيل مينا چار اختلال متابوليک شده، مشاهده می شود^(۶)؛ يكى از اين عوامل زایمان تروماتيک می باشد که تأثير آن عموماً در اولين مولرهای دائمي مشهود است^(۷). يكى از نماهای شائع در معاینه کلينيکي روتين در

مقدمه

تجربيات قبلی و مشاهدات کلينيکي حاکی از آن است که هيپوپلازى و هيپوكليسيفيكاسيون دندانهای مولر اول دائمي در کودکانی که به روش سزارين به دنيا آمدند، شایعتر از کودکانی است که به روش طبیعی تولد یافته‌اند؛ همچنین دندان مولر اول دائمي تنها دندانی است که دقیقاً در حول و حوش زایمان، کليسيفيكاسيون رأس کاسپ‌های آن آغاز می شود.

با بروز اختلال در تشکيل ماتريكس، هيپوپلازى ايجاد می شود که اگر اين اختلال در مينزاليزاسيون باشد، به هيپوكليسيفيكاسيون مينا منجر می شود^(۱). هيپوپلازى می تواند خفيف یا شديد باشد^(۲)؛ وسعت نواحي چار نواقص هيپوپلاستيك به مدت وجود عامل اختلال در فعاليت سلول‌های آملوبلاست بستگی دارد و به انواع خفيف، متوسط و شديد طبقه‌بندی می شود^(۳). اين

طول مدت بيماري کاملاً وجود داشت و تنها در مورد ۲ نفر هیچ مشکل پزشکی در طول اين دوران گزارش نشد. در بقیه موارد، حالت متوسطی وجود داشت؛ به عبارت ديگر مشکل پزشکی گزارش شده بود ولی انطباق دقیق با وسعت و ناحیه هیپوكلسیفیکالسیون نداشت (۸).

در يك مطالعه، تأثير سزارین در شیوع بیشتر اختلال عملکرد آملوبلاست‌ها، در مقایسه با زایمان طبیعی مشاهده شد؛ شیوع نقايس مینائي در کودکان متولدشده به روش سزارین ۳۶٪ و در کودکان متولدشده به روش طبیعی ۱۳٪ بود (۱۱).

هدف از اين مطالعه، پي بردن به اثر زایمان بر آن دسته نقايس مینائي است که در اثر اختلال در عملکرد سلولهای آملوبلاست ایجاد می‌شود؛ همچنین با توجه به شیوع زایمانهای سزارین Elective (سزارین بدون وجود دلایل پزشکی) نسبت به سزارین Selective، (سزارین به علت دلایل پزشکی) تأثير هر يك از اين دو برعکرد آملوبلاست‌ها نيز مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی

در اين مطالعه که به صورت همگروهي گذشته‌نگر (Historical Cohort) صورت گرفت، با مراجعة به مطب چهار پزشك متخصص زنان و زایمان (عضو هيأت علمي دانشگاه)، پرونده زایمان سالهای ۷۳ و قبل از آن استخراج شد و با بيمار برای معاينه فرزند وی هماهنگی شد.

پس از ملاقات حضوري مادر و فرزند مجموعه اطلاعات در پرسشنامه ثبت گردید. نوع زایمان، علت زایمان سزارین و سایر شرایط و وضعیت سیستمیک مادر در موقع زایمان، از پرونده پزشکی او استخراج شد.

در مورد وضعیت کودک هنگام زایمان و بيماريهای احتمالي وی در سال اول بعد از تولد، به اطلاعات مادر اکتفا

بسیاری از دندانها و اغلب در دندانهای مولر اول دائمي، اپاسيتی‌های موجود بر روی مينا می‌باشد و ميزان درگيري دندان از يك نقطه در رأس کاسپها تا درگيري کل تاج دندان متغير است.

در كشور هلند، به دليل شباهت رنگ و قوام اين ضایعات به پنیر هلندی، مولرهای مبتلا به اختلال مینای ایدیوباتیک Cheese Molar (IED) نامیده شده‌اند (۷,۸). به عقیده Koch، اتیولوژی هیپومینزالیزاسیون مینا یا ژنتیکی، اکتسابی و یا ایدیوباتیک (نامعلوم) است (۹).

علل و شدت ضایعه، نشان‌دهنده زمان شروع اختلال عملکرد آملوبلاست‌ها و طول مدت بروز اين اختلال است. در ضایعات هیپوكلسیفیه، ماتریکس مینا به طور کامل ترشح می‌شود ولی رسوب فسفات کلسیم در ماتریکس به علت يکی از دو مورد زیر، می‌تواند دچار اختلال باشد:

- ۱- اختلال در آملوبلاست‌ها منجر به جذب ناکافی پروتئین‌های ماتریکس می‌شود و در نتیجه فضای کافی برای رسوب فسفات کلسیم وجود نخواهد داشت.
- ۲- جذب کافی فسفات کلسیم وجود ندارد که مربوط به نامناسب بودن و کافی نبودن منبع آن می‌باشد (۱۰).

Amerongen و همکاران در يك مطالعه مقدماتی گذشته‌نگر در هلند، علل بروز Cheese Molar را بويژه با تأکيد بر بيماريهای پس از زمان تولد و در طی دوره نوزادی بررسی کردند. تعداد ۲۱ کودک که دارای اين ضایعات بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای به کمک پرونده پزشکی و اطلاعات والدين آنها تکمیل گردید. عمدۀ سؤالات درباره مشکلات و بيماريهای کودک در حين تولد و تا سن سه سالگی بود. معاينه کلینيکی دندانهای مولر هم انجام شد و وسعت و ناحیه هیپوكلسیفیکالسیون از نظر انطباق با بيماريهای کودکی یا مشکلات آن دوران تعیین گردید. در ۵۷٪ از بيماران اين تطابق علت و معلول از نظر زمان بروز و

اختیار گذاشتن پرونده بیماران و دسترسی آسان به بیماران از طریق تماس تلفنی دلیل انتخاب بیماران از مطب بود و تغییر شماره تلفن برخی بیماران از جمله مشکلات حین کار بود که منجر به حذف پرونده آنان شد؛ در ضمن عده‌ای از بیماران پس از تماس تلفنی تمایل به همکاری نداشتند.

در نهایت اکثریت قریب به اتفاق مادران از دلایل زایمان سزارین خود اطلاع کافی داشتند و انتطبق بین پاسخ مادران با پرونده پزشکی آنها بسیار چشمگیر بود.

با فرض شیوع نقايس مینائي در مولر اول به روش زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب 13% و 36% و $\alpha=0/1$ حجم نمونه در هر گروه ۹۳ مورد محاسبه گردید.

پس از تکمیل معاينات کلینیکی و پرسشنامه تدوین شده بر اساس پرونده پزشکی مادر و اطلاعات شخصی او، تجزیه و تحلیل آماری بدین صورت انجام شد که ابتدا با استفاده از آزمون χ^2 بین نسبت افراد واجد نقص مینائي در گروههای مقایسه شد؛ سپس با آزمون آنالیز واریانس میانگین دندانهای واجد نقص در گروهها با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.

يافته‌ها

در جدول ۱ علت انجام تمامی سزارین‌هایی که جزء مطالعه حاضر بودند، به تفکیک آورده شده است. طبق نتایج این جدول، شایعترین علت سزارین Selective، عدم تناسب اندازه سر جنین و لگن مادر می‌باشد که در مطالعه حاضر ۲۰٪ کل سزارین‌ها را به خود اختصاص داده بود.

جدول ۲ ارتباط نوع زایمان و وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی را نشان می‌دهد. به طور کلی در صورت سالم بودن هر ۴ دندان فوق، کودک در گروه سالم قرار می‌گرفت و در غیر این صورت (حتی با داشتن یک دندان مولر اول دائمی با نقص مینائي)، وارد گروه بیمار می‌شد. در جدول ۳ وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی کودکان

گردید؛ پس از تکمیل پرسشنامه، دندانهای مولر اول دائمی کودک معاينه و اطلاعات مربوطه ثبت شد.

در نظر گرفتن تمامی عوامل مسبب هیپوپلازی مینا از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین دلیل در مرحله اول همه عواملی که منحصرأ در محدوده زمان زایمان مادر و اوایل نوزادی، کودک در معرض آن قرار داشته است و پتانسیل ایجاد هیپوپلازی مینا را در خود داشتند، مورد توجه قرار گرفت. افراد مورد مطالعه حائز شرایط زیر بودند:

- وجود دندانهای مولر اول دائمی در کودک (با حداقل ۶ سال سن)

- ترمیم نشدن دندان مولر اول دائمی (قابل رویت بودن رأس کاسپ‌ها)

- عدم هیپوپلازی و هیپوکلسیفیکاسیون در ثنایای فک بالا و پایین

- بیمار نبودن مادر و عدم مصرف دارو توسط وی در ماه آخر بارداری

- طی دوران کامل جنینی (Full term)
- عدم ابتلای کودک به بیماری خاص هنگام تولد و در ۲-۳ ماه اول پس از تولد

بدین ترتیب ۱۰۰ نمونه به عنوان گروه شاهد که از طریق زایمان طبیعی متولد شده بودند و ۱۰۰ کودک به عنوان گروه مورد که از طریق زایمان سزارین (۵۰ نمونه Selective و ۵۰ نمونه Elective) متولد شده بودند، وارد مطالعه شدند.

معاینه کودکان اغلب در نور طبیعی و معمولی اطاق و به کمک آبسلانگ، پنبه یا گاز انجام شد. معاینه بویژه بر رأس کاسپ‌های دندانهای مولر اول دائمی متمرکز بود و هرگونه نقص مینائي این دندانها اعم از هیپوپلازی و هیپو-کلسیفیکاسیون ثبت می‌گردید.

لازم به ذکر است همکاری مطلوب پزشکان در مورد در

توجیه پذیر می‌باشد (۱۱).

با توجه به این که تمام کودکان سزارین شده، دندانهای مولر اول دائمی هیپوپلاستیک و هیپوکلسفیکاسیون دندان و یا گاهی این نقص بر روی تمام دندانهای مولر اول مشاهده نمی‌شود، می‌توان اظهار داشت که احتمالاً نوع بیهوشی، طول مدت بیهوشی، مشکلات احتمالی در حین عمل، مهارت جراح و عملکرد او به هنگام خروج نوزاد، می‌تواند بر میزان و چگونگی بروز ترومما در کودک تأثیرگذار باشد.

این مطالعه نشان داد که عمل سزارین به خودی خود و صرف‌نظر از علت آن، می‌تواند عامل بروز نقص مینایی در آملوبلاست‌های دندانهای مولر اول دائمی باشد و احتمالاً نفس عمل سزارین (برش رحم و خروج نوزاد) و یا عوامل جانبی مثل بیهوشی فرد در صدمه به آملوبلاست‌ها دخیل می‌باشند.

این که چرا در ۷۴٪ موارد زایمان سزارین، هر چهار دندان مولر اول سالم بودند و یا در بعضی موارد یک، دو یا سه دندان دچار نقص مینایی و بقیه سالم بودند، دقیقاً مشخص نیست؛ تصور می‌شود میزان مقاومت آملوبلاست‌ها در افراد مختلف، نسبت به عوامل مؤثر بر آنها متفاوت است و این عوامل تأثیرگذار باید به یک حد آستانه‌ای برسند تا باعث اختلال در عملکرد آنها و ترشح مینایی هیپوپلاستیک گردد؛ به عبارت دیگر شاید آستانه آسیب منجر به ترشح مینایی هیپوپلاستیک در آملوبلاست‌های افراد مختلف متفاوت باشد.

همچنین ممکن است مجموعه شرایط فردی مادر و جنین در بروز نقص مینایی مؤثر باشد و مجموع این دو عامل تعیین‌کننده وضعیت آملوبلاست‌ها از نظر ترشح کردن مینایی سالم و یا هیپوپلاستیک می‌باشد.
ابتلای یک، دو یا سه دندان و سالم بودن بقیه دندانها را

متولدشده به روش سزارین، در دو گروه سزارین‌های Selective و Elective با هم مقایسه شده‌اند.

آزمون χ^2 بین هیپوپلازی و هیپوکلسفیکاسیون دندان مولر اول دائمی با نوع زایمان ارتباط معنی‌داری را نشان داد ($P=0.002$) ولی با نوع سزارین ارتباط معنی‌داری را نشان نداد ($P=0.07$).

لازم به ذکر است که متوسط دندانهای دچار نقص مینایی چه در زایمان طبیعی و چه در زایمانهای سزارین (اعم از Selective و یا Elective) با سن مادر در موقع زایمان، جنس کودک، رتبه تولد وی، طول مدت بارداری و طول مدت شیردهی ارتباط معنی‌داری نداشت.

فراوانی مطلق و نسبی سالم یا دچار نقص بودن هر دندان مولر به تفکیک نوع زایمان محاسبه شد و در تمام موارد نتیجه آزمون معنی‌دار بود (جدول ۲).

بحث

۲۶٪ از کودکان متولدشده با زایمان سزارین دارای نقص مینایی مولر اول دائمی بودند که در ۱۷٪ از آنها این نقص در هر ۴ دندان مولر اول دائمی وجود داشت؛ در حالی که این میزان در بین کودکان متولدشده با زایمان طبیعی ۷٪ بود؛ در ۵٪ هر ۴ دندان گرفتار بودند.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین هیپوپلازی و هیپوکلسفیکاسیون دندان مولر اول دائمی با نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و با اطمینان بالای ۹۹٪ ($P<0.01$) این رابطه از لحاظ آماری صحیح است.

در یک مطالعه میزان هیپوپلازی و هیپوکلسفیکاسیون مولرهای اول دائمی در کودکان متولدشده با زایمان سزارین و طبیعی به ترتیب ۳۶٪ و ۱۳٪ گزارش شد که با توجه به مقطعی بودن نوع این مطالعه، اختلاف درصدهای مطالعه فعلی با این درصدها از لحاظ آماری کاملاً قابل قبول و

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی علل سزارین در گروه زایمانهای سزارین

درصد	تعداد	علل سزارین	
۲۴	۲۴	تمایل خود فرد	سزارین Elective
۲۶	۲۶	سزارین قلی	
۷	۷	Fetal Distress	Selective سزارین
۶	۶	Malpresentation	
۵	۵	مشکلات جفت	
۴	۴	ختم حاملگی	
۲۰	۲۰	CPD*	
۸	۸	حاملگی پرخطر	
۱۰۰	۱۰۰	جمع	

* عدم تناسب اندازه سر جنین و لگن مادر
(Cranio Pelvic Disproportion)

جدول ۲- توزیع فراوانی دندانهای مولر اول دائمی سالم و دچار نقص مینایی در کودکان مورد مطالعه

جمع	طبعی	سزارین	نوع زایمان
۱۶۷	۹۳	۷۴	وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی
۳	۱	۲	هر چهار دندان ۶ سالم
۵	۰	۵	یک دندان ۶ با نقص مینایی
۳	۱	۲	دو دندان ۶ با نقص مینایی
۲۲	۵	۱۷	سه دندان ۶ با نقص مینایی
۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	چهار دندان ۶ با نقص مینایی
جمع			

جدول ۳- توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی کودکان متولد شده به روش سزارین

جمع		Selective		Elective		علل سزارین
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی
۷۴	۷۴	۵۶	۳۳	۸۲	۴۱	سالم
۲	۲	۴	۲	۰	۰	یک دندان ۶ با نقص مینایی
۵	۵	۸	۴	۲	۱	دو دندان ۶ با نقص مینایی
۲	۲	۴	۲	۰	۰	سه دندان ۶ با نقص مینایی
۱۷	۱۷	۱۸	۹	۱۶	۸	چهار دندان ۶ با نقص مینایی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۵۰	جمع

می‌توان با مسئله متفاوت بودن زمان رویش دندانهای مشابه توجیه کرد؛ بنابراین هر چهار دندان مولر اول دائمی دقیقاً همزمان کلسفیفیه نمی‌شوند و ممکن است تا چند روز در زمان کلسفیکاسیون اختلاف وجود داشته باشد. با توجه به این مسئله و این که عامل زایمان در یک زمان خاص و صرفاً در طی چندین ساعت محدود تأثیرگذار است، این وضعیت می‌تواند تا حدی قابل توجیه باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

طبق نتایج حاصل از مطالعه حاضر، عمل سزارین صرف نظر از دلیل انجام آن، می‌تواند عامل بروز نقص مینایی در دندانهای مولر اول دائمی باشد. وجود این نقص مینایی عامل زمینه‌ای مستعد نمودن این دندانها به ایجاد و پیشرفت هرچه سریعتر پوییدگی تاحد تخریب کامل تاج و درگیری پالپ این دندانها است که با توجه به جوان بودن آنها، در صورت عدم درمان بموقع و صحیح، موجب ازدست رفتن این اولین دندانهای دائمی کودک که کلید اکلوژن آتی او محسوب می‌شود، می‌باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که حتی الامکان از انجام عمل سزارین بویژه وقتی دلیل پزشکی برای آن وجود ندارد، پرهیز شود

نقش عوامل مختلف دخیل در طی عمل جراحی سزارین در بروز هیوبلازی و هیپوکلسفیکاسیون مولرهای اول دائمی انجام شود تا مشخص گردد که کدامیک از عوامل داروهای بیهوشی، عوارض جانبی عمل جراحی، مهارت جراح و ... بر اختلال عملکرد آملوبلاست‌ها مؤثر می‌باشد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از آقای دکتر فیروز آزردگان استاد محترم گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که در امور آماری این تحقیق صمیمانه یاری فرمودند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

همچنین لازم است پزشکان متخصص زنان و زایمان، متخصص کودکان و دندانپزشکان بویژه متخصصان دندانپزشکی کودکان از احتمال بروز هیوبلازی و هیپوکلسفیکاسیون در اثر زایمان سزارین (با یا بدون دلیل پزشکی) در این اولین دندان دائمی کودک آگاه باشند و اطلاعات لازم را در این زمینه به والدین این کودکان ارائه نمایند تا در صورت مواجهه با چنین وضعیتی با مراجعه به موقع مانع از دست رفتن این دندانها که اساس ثبات اکلوژن دهان کودک در سیستم دندانهای دائمی است، شوند. ترمیم تاج این دندانها قبل از بروز پوسیدگی و یا در مراحل اولیه آن می‌تواند حیات این دندانها را برای طولانی مدت حفظ نماید. همچنین پیشنهاد می‌شود مطالعات آتی در ارتباط با

منابع:

- 1- Bhaskar SN. Orban's Oral Histology & Embryology. 11th ed. 1995: Chapt 3.
- 2- Mc Donald RE, Avery DR. Dentistry for the Child & Adolescent. 7th ed. St. Louis: Mosby; 2000: Chapt 7.
- 3- Burkitt HG, Young B, Heath JW. Wheater's Functional Histology. A Text & Colour Atlas. 3rd ed. 1993: Chapt 13.
- 4- Wood, Goaz. Differential Diagnosis of Oral Lesions. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 1997.
- 5- Pinkham JR. Pediatric dentistry infancy through adolescence. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999: Chapt 3.
- 6- Brockle B. Dental Radiology, Understanding the X-ray Image. London: Oxford; 1997: Chapt 5.
- 7- Weerheijm KL, Groen HJ, Beentjes VE, Poorterman JH. Prevalence of cheese molars in eleven-year-old Dutch children. ASDC J Dent Child 2001 Jul-Aug; 68 (4): 259-62, 229.
- 8- Amerongen WE, Kreden CM. Cheese Molars. A Pilot study of the etiology of hypocalcifications in first permanent molars. ASDC J Dent Child 1995 July-August; 266-69.
- 9- Koch SW. Epidemiological study of idiopathic enamel hypomineralization in permanent teeth of Swedish children. Dent Oral Epidemiol 1987 Oct; 15: 279-85.
- 10- Murray JJ, Shaw L. Classification and prevalence of enamel opacities in the human deciduous and permanent dentition. Arch Oral Biol 1979 Jan; 24: 7-13.

۱۱- افشار، حسین (استاد راهنمای)؛ حاتمی، حمیرا. بررسی اثر نوع زایمان (سزارین) در هیوبلازی و هیپوکلسفیکاسیون دندان مولر اول دائمی. پایان‌نامه شماره ۳۰۸۵ دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران، ۱۳۷۲-۷۳.