

تأثیر نوع زایمان بر بروز نقصانات مینایی دندان مولر اول دائمی

دکتر حسین افشار^{*}- دکتر بهمن سراج^{*}- دکتر آوا عمامه‌الساداتی^{**}

استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

^{**} متخصص دندانپزشکی کودکان

Title: An investigation on the relationship between the type of delivery and enamel defects of the first permanent molars

Authors: Afshar H. Assistant Professor*, Seraj B. Assistant Professor*, Emadosadati A. Pedodontist

Address: Dept. of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Statement of Problem: Previous experiences and clinical observations indicate that enamel hypoplasia and hypocalcification of first permanent molars, among infants born in Cessarian Section Delivery (C/S) is more common than those born in Normal Vaginal Delivery (NVD). Moreover, the first permanent molar is the only tooth that its "cusp tip calcification" starts exactly at the time of delivery.

Purpose: The aim of this research was to investigate the relationship between delivery type and clinical feature of the first permanent molar. Meanwhile, the different effects of the elective and selective types of cesarian, on the clinical feature of first permanent molar, were studied.

Materials and Methods: Birth files, relation to the year 1994 and before, were extracted from a gynecologist clinic. One hundred patients with NVD, 50 patients with selective cesarian delivery and 50 patients with elective cesarian delivery were chosen to examine clinical feature of the first permanent molars of their children. The children, 6 years old or more, were examined. The medical information of the mother were extracted from her file and that of child, were asked from the mother. To analyze the result, χ^2 test was used.

Results: The prevalence of enamel defects (hypoplasia and hypocalcification) of the first permanent molar among children born by C/S, were significantly different from the children born by NVD ($P=0.0002$). Mean while, the prevalence of these enamel defects in the selective cesarian delivery was more than elective cesarian delivery (17% vs. 9%), which was not statistically significant ($P=0.07$)

Conclusion: It is suggested that gynecologists, pediatricians and pedodontists provide the parents with necessary information about the child's first permanent tooth and ask them to pay enough attention to keep this tooth which is considered as the key of occlusion.

Key words: Enamel defect; Enamel hypoplasia; Enamel hypocalcification; Cessarian Section Delivery (C/S); Normal Vaginal Delivery (NVD).

Journal of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences (Vol. 16; No.2; 2003)

چکیده

بیان مسئله: تجربیات قبلی و مشاهدات کلینیکی حاکی از آن است که هیپوپلازی و هیپوكلسیفیکاسیون دندانهای مولر اول دائمی در کودکانی که به روش سزارین به دنیا آمدند، شایعتر از کودکانی است که به روش طبیعی تولد یافته‌اند؛ همچنین دندان مولر اول دائمی تنها دندانی است که دقیقاً در حول و حوش زایمان، کلسیفیکاسیون رأس کاسپ‌های آن آغاز می‌شود.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نوع زایمان و وضعیت کلینیکی اولین مولر دائمی انجام شد؛ همچنین تفاوت تأثیر Selective Elective یا بودن زایمانهای سزارین بر وضعیت اولین مولر دائمی بررسی گردید.

روش بررسی: با مراجعه به مطب پزشک جراح و متخصص زنان و زایمان، پرونده‌های زایمان مربوط به سالهای ۱۳۷۳ و قبل از آن استخراج شد؛ تعداد ۱۰۰ بیمار با زایمان طبیعی و ۵۰ بیمار با زایمان سزارین Selective و ۵۰ بیمار با زایمان سزارین Elective انتخاب شدند تا وضعیت دندانهای مولر اول دائمی فرزندان آنها بررسی شود. پس از تماس با بیمار برای معاینه فرزند ۶ سال به بالای آنها هماهنگی شد. اطلاعات پزشکی مادر از پرونده پزشکی وی استخراج گردید و در مورد اطلاعات مربوط به فرزند، از مادر سؤال شد. به منظور تحلیل نتایج از آزمون ۲٪ استفاده شد.

یافته‌ها: نفایص مینایی (هیپوپلازی و هیپوكلسیفیکاسیون) دندان مولر اول دائمی در فرزندان متولدشده به روش سزارین به طور معنی‌داری با زایمان طبیعی اختلاف داشت ($P=0.0002$)؛ در ضمن میزان شیوع این نفایص مینایی در زایمانهای سزارین Selective بیشتر از زایمانهای سزارین 17% برابر 9% ولی از نظر آماری در این مورد اختلاف معنی‌داری وجود نداشت ($P=0.07$).

نتیجه‌گیری: لازم است پزشکان متخصص زنان و زایمان، متخصص کودکان و دندانپزشک متخصص کودکان آگاهی لازم را در این زمینه به والدین ارائه نمایند تا آنها ضمن مراجعه به موقع، توجه کافی برای حفظ این اولین دندان دائمی کودک که کلید اکلوژن وی محسوب می‌شود، مبذول دارند.

کلیدواژه‌ها: نفایص مینایی؛ هیپوپلازی مینایی؛ هیپوكلسیفیکاسیون مینایی؛ زایمان سزارین؛ زایمان طبیعی (واژینال)

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۸۲)

اختلال اساساً یک اختلال اکتوورمال است و تمامی

قسمتهای با منشأ مزودرمی دندان سالم می‌باشند.

در هیپوکلسیفیکاسیون ماتریکس مینای نرمال است اما به علت عدم بلوغ درخشندگی مینای طبیعی وجود ندرد و مینای کدر است و ممکن است به وسیله مضخ ساییده شود (۴).

عوامل مسبب ایجاد هیپوپلازی مینای، موجب هیپوکلسیفیکاسیون نیز می‌شوند (۵)؛ علل هیپوپلازی مینای به طور کلی به دو دسته موضعی و سیستمیک تقسیم می‌شوند.

هیپوپلازی با منشأ سیستمیک را هیپوپلازی کرونولوژیک می‌نامند؛ زیرا این ضایعه در قسمتهایی از دندان که در دوره تشکیل مینای دچار اختلال متابولیکی شده، مشاهده می‌شود (۶)؛ یکی از این عوامل زایمان تروماتیک می‌باشد که تأثیر آن معمولاً در اولین مولرهای دائمی مشهود است (۲۶).

یکی از نمایهای شایع در معاینه کلینیکی روتین در

مقدمه

تجربیات قبلی و مشاهدات کلینیکی حاکی از آن است که هیپوپلازی و هیپوكلسیفیکاسیون دندانهای مولر اول دائمی در کودکانی که به روش سزارین به دنیا آمدند، شایعتر از کودکانی است که به روش طبیعی تولد یافته‌اند؛ همچنین دندان مولر اول دائمی تنها دندانی است که دقیقاً در حول و حوش زایمان، کلسیفیکاسیون رأس کاسپ‌های آن آغاز می‌شود.

با بروز اختلال در تشکیل ماتریکس، هیپوپلازی ایجاد می‌شود که اگر این اختلال در مینزالیزاسیون باشد، به هیپوکلسیفیکاسیون مینا منجر می‌شود (۱).

هیپوپلازی می‌تواند خفیف یا شدید باشد (۲)؛ وسعت نواحی دچار نواقص هیپوپلاستیک به مدت وجود عامل اختلال در فعالیت سلول‌های آملوبلاست بستگی دارد و به انواع خفیف، متوسط و شدید طبقه‌بندی می‌شود (۳). این

طول مدت بیماری کاملاً وجود داشت و تنها در مورد ۲ نفر هیچ مشکل پژشکی در طول این دوران گزارش نشد. در بقیه موارد، حالت متوسطی وجود داشت؛ به عبارت دیگر مشکل پژشکی گزارش شده بود ولی انطباق دقیق با وسعت و ناحیه هیپوکلیسیفیکاسیون نداشت (۸).

در یک مطالعه، تأثیر سزارین در شیوع بیشتر اختلال عملکرد آملوبلاست‌ها، در مقایسه با زایمان طبیعی مشاهده شد؛ شیوع نقايسن مینایی در کودکان متولدشده به روش سزارین ۳۶٪ و در کودکان متولدشده به روش طبیعی ۱۲٪ بود (۱۱).

هدف از این مطالعه، پی بردن به اثر زایمان بر آن دسته نقايسن مینایی است که در اثر اختلال در عملکرد سلولهای آملوبلاست ایجاد می‌شود؛ همچین با توجه به شیوع زایمانهای سزارین Elective (سزارین بدون وجود دلایل پژشکی) نسبت به سزارین Selective، (سزارین به علت دلایل پژشکی) تأثیر هر یک از این دو بر عملکرد آملوبلاست‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

روش بودسی

در این مطالعه که به صورت همگروهی گذشته‌نگر (Historical Cohort) صورت گرفت، با مراجعه به مطاب چهار پژشک متخصص زنان و زایمان (عضو هیأت علمی دانشگاه)، پرونده زایمان سالهای ۷۳ و قبل از آن استخراج شد و با بیمار برای معاینه فرزند وی هماهنگی شد. پس از ملاقات حضوری مادر و فرزند مجموعه اطلاعات در پرسشنامه ثبت گردید. نوع زایمان، علت زایمان سزارین و سایر شرایط و وضعیت سیستمیک مادر در موقع زایمان، از پرونده پژشکی او استخراج شد.

در مورد وضعیت کودک هنگام زایمان و بیماریهای احتمالی وی در سال اول بعد از تولد، به اطلاعات مادر اکتفا

بسیاری از دندانها و اغلب در دندانهای مولر اول دائمی، اپاسیتی‌های موجود بر روی مینا می‌باشد و میزان درگیری دندان از یک نقطه در رأس کاسپ‌ها تا درگیری کل تاج دندان متغیر است.

در کشور هلند، به دلیل شباهت رنگ و قوام این ضایعات به پنیر هلندی، مولرهای مبتلا به اختلال مینای ایدیوپاتیک (IED) Cheese Molar نامیده شده‌اند (۷،۸). به عقیده Koch، اتیولوزی هیپومینرالیزاسیون مینا یا ژنتیکی، اکتسابی و یا ایدیوپاتیک (نامعلوم) است (۹).

علل و شدت ضایعه، نشان‌دهنده زمان شروع اختلال عملکرد آملوبلاست‌ها و طول مدت بروز این اختلال است. در ضایعات هیپوکلیسیفیه، ماتریکس مینا به طور کامل ترشح می‌شود ولی رسوب فسفات کلسیم در ماتریکس به علت یکی از دو مورد زیر، می‌تواند دچار اختلال باشد:

۱- اختلال در آملوبلاست‌ها منجر به جذب ناکافی پروتئین‌های ماتریکس می‌شود و در نتیجه فضای کافی برای رسوب فسفات کلسیم وجود نخواهد داشت.

۲- جذب کافی فسفات کلسیم وجود ندارد که مربوط به نامناسب بودن و کافی نبودن منبع آن می‌باشد (۱۰).

Amerongen و همکاران در یک مطالعه مقدماتی گذشته‌نگر در هلند، علل بروز Cheese Molar را بویژه با تأکید بر بیماریهای پس از زمان تولد و در طی دوره نوزادی بررسی کردند. تعداد ۲۱ کودک که دارای این ضایعات بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای به کمک پرونده پژشکی و اطلاعات والدین آنها تکمیل گردید. عمدۀ سؤالات درباره مشکلات و بیماریهای کودک در حین تولد و تا سن سه سالگی بود. معاینه کلینیکی دندانهای مولر هم انجام شد و وسعت و ناحیه هیپوکلیسیفیکاسیون از نظر انطباق با بیماریهای کودکی یا مشکلات آن دوران تعیین گردید. در ۵۷٪ از بیماران این تطابق علت و معلول از نظر زمان بروز و

اختیار گذاشتن پرونده بیماران و دسترسی آسان به بیماران از طریق تماس تلفنی دلیل انتخاب بیماران از مطلب بود و تغییر شماره تلفن برخی بیماران از جمله مشکلات حین کار بود که منجر به حذف پرونده آنان شد؛ در ضمن عده‌ای از بیماران پس از تماس تلفنی تمایل به همکاری نداشتند. در نهایت اکثریت قریب به اتفاق مادران از دلایل زایمان سزارین خود اطلاع کافی داشتند و انتباطق بین پاسخ مادران با پرونده پزشکی آنها بسیار چشمگیر بود.

با فرض شیوع نقايسن مینایی در مولر اول به روش زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب $\alpha = 0.13\%$ و 0.36% حجم نمونه در هر گروه ۹۳ مورد محاسبه گردید.

پس از تکمیل معاینات کلینیکی و پرسشنامه تدوین شده بر اساس پرونده پزشکی مادر و اطلاعات شخصی او، تجزیه و تحلیل آماری بدین صورت انجام شد که ابتدا با استفاده از آزمون χ^2 بین نسبت افراد واجد نقص مینایی در گروههای مقایسه شد؛ سپس با آزمون آنالیز واریانس میانگین دندانهای واجد نقص در گروهها با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها

در جدول ۱ علت انجام تمامی سزارین‌هایی که جزء مطالعه حاضر بودند، به تفکیک آورده شده است. طبق نتایج این جدول، شایعترین علت سزارین Selective، عدم تناسب اندازه سر جنین و لگن مادر می‌باشد که در مطالعه حاضر ۲۰٪ کل سزارین‌ها را به خود اختصاص داده بود.

جدول ۲ ارتباط نوع زایمان و وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی را نشان می‌دهد. به طور کلی در صورت سالم بودن هر ۴ دندان فوق، کودک در گروه سالم قرار می‌گرفت و در غیر این صورت (حتی با داشتن یک دندان مولر اول دائمی با نقص مینایی)، وارد گروه بیمار می‌شد. در جدول ۳ وضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی کودکان

گردید؛ پس از تکمیل پرسشنامه، دندانهای مولر اول دائمی کودک معاینه و اطلاعات مربوطه ثبت شد.

در نظر گرفتن تمامی عوامل مسبب هیپوپلازی مینا از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین دلیل در مرحله اول همه عواملی که منحصرآ در محدوده زمان زایمان مادر و اوایل نوزادی، کودک در معرض آن قرار داشته است و پتانسیل ایجاد هیپوپلازی مینا را در خود داشتند، مورد توجه قرار گرفت. افراد مورد مطالعه حائز شرایط زیر بودند:

- وجود دندانهای مولر اول دائمی در کودک (با حداقل ۶ سال سن)

- ترمیم نشدن دندان مولر اول دائمی (قابل رویت بودن رأس کاسپ‌ها)

- عدم هیپوپلازی و هیپوکلسیفیکاسیون در ثنایای فک بالا و پایین

- بیمار نبودن مادر و عدم مصرف دارو توسط وی در ماه آخر بارداری

- طی دوران کامل جنینی (Full term)

- عدم ابتلای کودک به بیماری خاص هنگام تولد و در ۲-۳ ماه اول پس از تولد

بدین ترتیب ۱۰۰ نمونه به عنوان گروه شاهد که از طریق زایمان طبیعی متولد شده بودند و ۱۰۰ کودک به عنوان گروه مورد که از طریق زایمان سزارین (۵۰ نمونه Selective و ۵۰ نمونه Elective) متولد شده بودند، وارد مطالعه شدند.

معاینه کودکان اغلب در نور طبیعی و معمولی اطلاق و به کمک آبسلانگ، پنبه یا گاز انجام شد. معاینه بویژه بر رأس کاسپ‌های دندانهای مولر اول دائمی متمرکز بود و هرگونه نقص مینایی این دندانها اعم از هیپوپلازی و هیپوکلسیفیکاسیون ثبت می‌گردید.

لازم به ذکر است همکاری مطلوب پزشکان در مورد در

توجیه پذیر می‌باشد (۱۱).

با توجه به این که تمام کودکان سزارین شده، دندانهای مولر اول دائمی هیپوپلاستیک و هیپوکلیسیفیه ندارند و یا گاهی این نقص بر روی تمام دندانهای مولر اول مشاهده نمی‌شود، می‌توان اظهار داشت که احتمالاً نوع بیهوشی، طول مدت بیهوشی، مشکلات احتمالی در حین عمل، مهارت جراح و عملکرد او به هنگام خروج نوزاد، می‌تواند بر میزان و چگونگی بروز ترومما در کودک تأثیرگذار باشد.

این مطالعه نشان داد که عمل سزارین به خودی خود و صرف نظر از علت آن، می‌تواند عامل بروز نقص مینایی در آملوبلاست‌های دندانهای مولر اول دائمی باشد و احتمالاً نفس عمل سزارین (برش رحم و خروج نوزاد) و یا عوامل جانبی مثل بیهوشی فرد در صدمه به آملوبلاست‌ها دخیل می‌باشد.

این که چرا در ۷۴٪ موارد زایمان سزارین، هر چهار دندان مولر اول سالم بودند و یا در بعضی موارد یک، دو یا سه دندان دچار نقص مینایی و بقیه سالم بودند، دقیقاً مشخص نیست؛ تصور می‌شود میزان مقاومت آملوبلاست‌ها در افراد مختلف، نسبت به عوامل مؤثر بر آنها متفاوت است و این عوامل تأثیرگذار باید به یک حد آستانه‌ای برسند تا باعث اختلال در عملکرد آنها و ترشح مینای هیپوپلاستیک گردد؛ به عبارت دیگر شاید آستانه آسیب منجر به ترشح مینای هیپوپلاستیک در آملوبلاست‌های افراد مختلف متفاوت باشد.

همچنین ممکن است مجموعه شرایط فردی مادر و جنین در بروز نقص مینای مؤثر باشد و مجموع این دو عامل تعیین‌کننده وضعیت آملوبلاست‌ها از نظر ترشح کردن مینای سالم و یا هیپوپلاستیک می‌باشد.

ابتلای یک، دو یا سه دندان و سالم بودن بقیه دندانها را

متولدشده به روش سزارین، در دو گروه سزارین‌های Selective و Elective با هم مقایسه شده‌اند.

آزمون^۲ بین هیپوپلازی و هیپوکلیسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی با نوع زایمان ارتباط معنی‌داری را نشان داد ($P=0.0002$) ولی با نوع سزارین ارتباط معنی‌داری را نشان نداد ($P=0.07$).

لازم به ذکر است که متوسط دندانهای دچار نقص مینایی چه در زایمان طبیعی و چه در زایمانهای سزارین (اعم از Selective و یا Elective) با سن مادر در موقع زایمان، جنس کودک، رتبه تولد وی، طول مدت بارداری و طول مدت شیردهی ارتباط معنی‌داری نداشت.

فراوانی مطلق و نسبی سالم یا دچار نقص بودن هر دندان مولر به تفکیک نوع زایمان محاسبه شد و در تمام موارد نتیجه آزمون معنی‌دار بود (جدول ۲).

بحث

۲۶٪ از کودکان متولدشده با زایمان سزارین دارای نقص مینایی مولر اول دائمی بودند که در ۱۷٪ از آنها این نقص در هر ۴ دندان مولر اول دائمی وجود داشت؛ در حالی که این میزان در بین کودکان متولدشده با زایمان طبیعی ۷٪ بود؛ در ۵٪ هر ۴ دندان گرفتار بودند.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین هیپوپلازی و هیپوکلیسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی با نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و با اطمینان بالای ۹۹٪ (۰/۰۰ α) این رابطه از لحاظ آماری صحیح است.

در یک مطالعه میزان هیپوپلازی و هیپوکلیسیفیکاسیون مولرهای اول دائمی در کودکان متولدشده با زایمان سزارین و طبیعی به ترتیب ۳۶٪ و ۱۳٪ گزارش شد که با توجه به مقطعی بودن نوع این مطالعه، اختلاف درصدهای مطالعه فعلی با این درصدها از لحاظ آماری کاملاً قابل قبول و

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی علل سزارین در گروه زایمانهای سزارین

		علت سزارین		سزارین
درصد	تعداد	تمایل خود فرد	Elective	
۲۴	۲۴	سزارین قبلی		
۲۶	۲۶	Fetal Distress	Selective	
۷	۷	Malpresentation		
۶	۶	مشکلات جفت		
۵	۵	خت حاملگی		
۴	۴	CPD*		
۲۰	۲۰	حاملگی پرخطر		
۸	۸			
۱۰۰	۱۰۰	جمع		

*عدم تناسب اندازه سر جنین و لگن مادر
(Cranio Pelvic Disproportion)

جدول ۲- توزیع فراوانی دندانهای مولر اول دائمی سالم و دچار نقص مینایی در کودکان مورد مطالعه

		نوع زایمان		و ضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی
جمع	طبیعی	سزارین		
۱۶۷	۹۳	۷۴	هر چهار دندان ۶ سالم	
۲	۱	۲	یک دندان ۶ با نقص مینایی	
۵	۰	۵	دو دندان ۶ با نقص مینایی	
۲	۱	۲	سه دندان ۶ با نقص مینایی	
۲۲	۵	۱۷	چهار دندان ۶ با نقص مینایی	
۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	جمع	

جدول ۳- توزیع فراوانی مطلق و نسبی و ضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی کودکان متولدشده به روش سزارین

		Selectiv		Electiv		علت سزارین	و ضعیت کلینیکی دندانهای مولر اول دائمی
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۷۴	۷۴	۶۶	۳۳	۸۲	۴۱	سالم	
۲	۲	۴	۲	۰	۰	یک دندان ۶ با نقص مینایی	
۵	۵	۸	۴	۲	۱	دو دندان ۶ با نقص مینایی	
۲	۲	۴	۲	۰	۰	سه دندان ۶ با نقص مینایی	
۱۷	۱۷	۱۸	۹	۱۶	۸	چهار دندان ۶ با نقص مینایی	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۵۰	جمع	

می‌توان با مسئله متفاوت بودن زمان رویش دندانهای مشابه توجیه کرد؛ بنابراین هر چهار دندان مولر اول دائمی دقیقاً همزمان کلیسیفیکاسیون اخلاق و وجود داشته باشد. با توجه به این مسئله و این که عامل زایمان در یک زمان خاص و صرفاً در طی چندین ساعت محدود تأثیرگذار است، این وضعیت می‌تواند تا حدی قابل توجیه باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

طبق نتایج حاصل از مطالعه حاضر، عمل سزارین صرف نظر از دلیل انجام آن، می‌تواند عامل بروز نقص مینایی در دندانهای مولر اول دائمی باشد. وجود این نقص مینایی عامل زمینه‌ای مستعد نمودن این دندانها به ایجاد و پیشرفت هرچه سریعتر پوسیدگی تاحد تخریب کامل تاج و درگیری پالپ این دندانها است که با توجه به جوان بودن آنها، در صورت عدم درمان بموقع و صحیح، موجب ازدسترفتن این اولین دندانهای دائمی کودک که کلید اکلوژن آنی او محسوب می‌شود، می‌باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که حتی الامکان از انجام عمل سزارین بويژه وقتی دلیل پزشکی برای آن وجود ندارد، پرهیز شود

نقش عوامل مختلف دخیل در طی عمل جراحی سزارین در بروز هیپوپلازی و هیپوکلسيفيکاسيون مولرهای اول دائمی انجام شود تا مشخص گردد که کدامیک از عوامل داروهای بیهوشی، عوارض جانبی عمل جراحی، مهارت جراح و ... بر اختلال عملکرد آملوبلاستها مؤثر می‌باشد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از آقای دکتر فیروز آزردگان استاد محترم گروه آموزشی ایدمیولوژی و آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که در امور آماری این تحقیق صمیمانه یاری فرمودند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

همچنین لازم است پزشکان متخصص زنان و زایمان، متخصص کودکان و دندانپزشکان بویژه متخصصان دندانپزشکی کودکان از احتمال بروز هیپوپلازی و هیپوکلسيفيکاسيون در اثر زایمان سزارین (با یا بدون دلیل پزشکی) در این اولین دندان دائمی کودک آگاه باشند و اطلاعات لازم را در این زمینه به والدین این کودکان ارائه نمایند تا درصورت مواجهه با چنین وضعیتی با مراجعه به موقع مانع ازدسترفتن این دندانها که اساس ثبات اکلوژن دهان کودک در سیستم دندانهای دائمی است، شوند. ترمیم تاج این دندانها قبل از بروز پوسیدگی و یا در مراحل اولیه آن می‌تواند حیات این دندانها را برای طولانی مدت حفظ نماید. همچنین پیشنهاد می‌شود مطالعات آتی در ارتباط با

منابع:

- 1- Bhaskar SN. Orban's Oral Histology & Embryology. 11th ed. 1995: Chapt 3.
- 2- Mc Donald RE, Avery DR. Dentistry for the Child & Adolescent. 7th ed. St. Louis: Mosby; 2000: Chapt 7.
- 3- Burkitt HG, Young B, Heath JW. Wheater's Functional Histology. A Text & Colour Atlas. 3rd ed. 1993: Chapt13.
- 4- Wood, Goaz. Differential Diagnosis of Oral Lesions.5th ed. Philadelphia: Saunders; 1997.
- 5- Pinkham JR. Pediatric dentistry infancy through adolescence. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999: Chapt 3.
- 6- Brockle B. Dental Radiology, Understanding the X-ray Image. London: Oxford; 1997: Chapt 5.
- 7- Weerheijm KL, Groen HJ, Beentjes VE, Poorterman JH. Prevalence of cheese molars in eleven-year-old Dutch children. ASDC J Dent Child 2001 Jul-Aug; 68 (4): 259-62, 229.
- 8- Amerongen WE, Kreden CM. Cheese Molars. A Pilot study of the etiology of hypocalcifications in first permanent molars. ASDC J Dent Child 1995 July-August; 266-69.
- 9- Koch SW. Epidemiological study of idiopathic enamel hypomineralization in permanent teeth of Swedish children. Dent Oral Epidemiol 1987 Oct; 15: 279-85.
- 10- Murray JJ, Shaw L. Classification and prevalence of enamel opacities in the human deciduous and permanent dentition. Arch Oral Biol 1979 Jan; 24: 7-13.

۱۱- افشار، حسین (استاد راهنمایی)؛ حانعی، حمیرا. بررسی اثر نوع زایمان (سزارین) در هیپوپلازی و هیپوکلسيفيکاسيون دندان مولر اول دائمی. پایان‌نامه شماره ۳۰ دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، ۱۳۷۲-۷۳. ۸۵