

بررسی ارزش رنگ آمیزی(PTAH) در تشخیص افتراقی تومورهای غدد بزاقی

دکتر فرشته بقانی نائینی * دکتر اسماعیل یزدی ** دکتر مریم سید مجیدی ***

* استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

** استاد گروه آموزشی آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

*** استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل

Title: An evaluation on the importance of phosphotungstic acid haematoxylin (PTAH) staining in differential diagnosis of salivary gland neoplasms

Authors: Baghaie Naeini F. Assistant Professor*, Yazdi E. Professor*, Seyed Majidi M. Assistant Professor**

Address: *Dept. of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

**Dept. of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Abstract: The differential diagnosis between pleomorphic adenoma, the most common salivary gland neoplasm, microscopically, and two other common salivary gland neoplasms, meaning adenoid cystic carcinoma and mucoepidermoid carcinoma, is difficult. The purpose of this study was to determine the differences between pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma and mucoepidermoid carcinoma regarding the staining intensity with PTAH and H&E and also to investigate the relationship between staining intensity with PTAH and malignancy grade in mucoepidermoid carcinoma. 72 paraffin embedded samples including 24 pleomorphic adenoma, 24 adenoid cystic carcinoma and 24 mucoepidermoid carcinoma were selected and stained with PTAH. The staining intensity in total, in nucleus and cytoplasm of tumoral cells were evaluated and compared with H & E staining, statistically. The results were analyzed by Kruskal-Wallis, and Wilcoxon signed ranks tests ($P<0.05$). The logistic model was presented to predict the degree of malignancies through the assessment of nucleus and cytoplasm staining intensity in tumoral cells, and the patient's age. In this study, a statistically significant relationship was observed between staining intensity by PTAH and H& E in nucleus of tumoral cells in pleomorphic adenoma. Moreover, statistically significant relation between staining intensity by PTAH and H & E in cytoplasm of tumoral cells in adenoid cystic carcinoma was found. But there was no relation in other cases. On the other hand, a statistically significant relation between intensity of staining in total, in nucleus and cytoplasm of tumoral cells and the type of tumor was found. No relation was obtained between malignancy grade of mucoepidermoid carcinoma and staining intensity in total, in nucleus and cytoplasm of tumoral cells. The presented logistic model indicated a direct relation between tumor malignancy with patient's age and staining intensity in nucleus of tumoral cells, but a reverse relation was found between cytoplasm staining intensity in tumoral cells and tumor malignancy. Our findings show that PTAH and H & E staining methods, lead to similar results, however, PTAH staining is a reliable method in differential diagnosis of such salivary gland tumors.

Key Words: Pleomorphic Adenoma – Adenoid Cystic Carcinoma – Mucoepidermoid Carcinoma – PTAH – Differential Diagnosis.

Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences (Vol. 15, No. 4, 2003)

چکیده

تشخیص افتراقی بین پلنومورفیک آدنوما به عنوان شایعترین نوپلاسم غده بزاقی از نظر تغییرات ریزبینی با دو نوپلاسم شایع دیگر غدد بزاقی، آدنوئید سیستیک کارسینوما و موکواپی درموئید کارسینوما دشوار و پیچیده می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه شدت رنگ‌پذیری بین پلنومورفیک آدنوما، آدنوئید سیستیک کارسینوما و موکواپی درموئید کارسینوما در رنگ‌آمیزی با PTAH و H&E و نیز ارتباط بین شدت رنگ‌پذیری با PTAH و درجه بدخیمی در موکواپی درموئید کارسینوما انجام شد. ۷۲ نمونه پارافینه شامل ۲۴ مورد پلنومورفیک آدنوما، ۲۴ مورد آدنوئید سیستیک کارسینوما و ۲۴ مورد موکواپی درموئید کارسینوما انتخاب و برپاها با PTAH رنگ‌آمیزی گردیدند. شدت رنگ‌پذیری به طور کلی و شدت رنگ‌پذیری هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال تعیین و با نتایج حاصل از روش رنگ‌آمیزی H&E مقایسه گردید. در تحلیل نتایج، از آزمونهای Logistic و Kruskal-Wallis استفاده شد. مدل Wilcoxon signed ranks برای بدست آوردن نسبت احتمال خوش‌خیم یا بدخیم‌بودن تومور با استفاده از شدت رنگ‌پذیری هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال و سن بیمار ارائه شد. در این مطالعه، بین شدت رنگ‌پذیری هسته سلول‌های تومورال در پلنومورفیک آدنوما و نیز بین شدت رنگ‌پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما در دو روش رنگ‌آمیزی، تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید، اما در سایر موارد ارتباطی دیده نشد. از طرف دیگر، بین شدت رنگ‌پذیری کلی، هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال و نوع تومور ارتباط آماری معنی‌داری بدست آمد. بین درجه بدخیمی موکواپی درموئید کارسینوما و شدت رنگ‌پذیری کلی، شدت در هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال ارتباطی ملاحظه نشد. در مدل Logistic ارائه شده معلوم شد ارتباط مستقیمی بین بدخیم بودن تومور با سن بیمار و شدت رنگ‌پذیری هسته سلول‌های تومورال وجود دارد ولی شدت رنگ‌پذیری سیتوپلاسم سلول‌های تومورال و بدخیم بودن تومور با هم نسبت معکوس داشتند. یافته‌ها نشان داد که این دو روش رنگ‌آمیزی نتایج تقریباً مشابهی دارند ولی PTAH در تشخیص افتراقی ضایعات مورد نظر مؤثر و مفید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: پلنومورفیک آدنوما – آدنوئید سیستیک کارسینوما – موکواپی درموئید کارسینوما – PTAH – تشخیص افتراقی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۵، شماره ۴، سال ۱۳۸۱)

مقدمه

مانند ایمونوهیستوشیمی، میکروسکوپ الکترونی، روش‌های مختلف بیولوژی سلولی و سیتوترنیک استفاده شده است معزالک، هزینه بالا و روش‌های پیچیده اجرایی، استفاده روزمره از آنها را با محدودیتها مواجه می‌سازد. رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی روش‌های ساده و در عین حال قابل دسترسی می‌باشند که در تشخیص افتراقی بسیاری از تومورها مطرح می‌گردند. تعداد زیادی از تومورهای غدد بزاقی از سلول‌های اپی‌تیال و میواپی‌تیال منشا می‌گیرند و تعداد دیگری نیز واجد سلول‌های انکوستیت می‌باشند(۱). از آنجایی که هر دو نوع این سلول‌ها با رنگ‌آمیزی

پلنومورفیک آدنوما شایعترین تومور غدد بزاقی است که شباهتهای بسیاری با دو تومور شایع دیگر غدد بزاقی یعنی موکو اپیدرموئید کارسینوما و آدنوئید سیستیک کارسینوما دارد به نحوی که گاه تشخیص میکروسکوپی این ضایعات از یکدیگر بسیار دشوار می‌باشد(۲).

همچنین به دلیل تفاوت‌های بسیار در پیش آگهی و روش‌های درمانی، تشخیص قطعی نوع ضایعه و در نهایت طرح و اجرای درمان صحیح آن از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در این راستا گرچه از روش‌های پیشرفته و متعددی

اسلایدها با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند و وجود یا عدم وجود رنگ پذیری و شدت رنگ پذیری کلی، همچنین شدت در هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال مورد ارزیابی قرار گرفت. شدت رنگ پذیری به منفی، ضعیف، متوسط و شدید تقسیم‌بندی گردید و برای آنها بترتیب اعداد صفر، یک، دو، سه در نظر گرفته شد. سلول‌های تومورال در میدانهای میکروسکوپی با بزرگنمایی $100 \times 400 \times$ از نظر بررسی شدت رنگ پذیری کلی و با بزرگنمایی $100 \times$ از نظر بررسی شدت رنگ پذیری در هسته و سیتوپلاسم توسط یک نفر مورد ارزیابی قرار گرفت.

برای مقایسه میزان شدت رنگ پذیری در سه گروه تومور آزمون ناپارامتری Kruskal-Wallis و برای مقایسه دو روش مشابه رنگ آمیزی (H&E و PTAH) در هر یک Wilcoxon signed ranks از سه تومور از آزمون ناپارامتری استفاده شد. البته رابطه درجه بدخیمی در موکوپی درموئید کارسینوما با شدت رنگ پذیری نیز بررسی گردید. همچنین مدل Logistic برای یافتن نسبت شانس بدخیم یا خوش‌خیم بودن تومورهای مورد بررسی، با توجه به متغیرهای موجود ارائه شد.

یافته‌ها

الف) پلثومورفیک آدنوما

بیماران شامل ۱۳ نفر مؤنث ($54/2\%$) و ۱۱ نفر مذکور ($45/8\%$) با متوسط سن ۳۲ سال و محدوده سنی ۱۷-۶۵ سال بودند. نتایج حاصل از مقایسه بین دو روش رنگ آمیزی PTAH و H&E در جدول ۱ آمده است.

ب) موکوپی درموئید کارسینوما

بیماران شامل ۱۴ نفر مذکور ($58/3\%$) و ۱۰ نفر مؤنث ($41/7\%$) با متوسط سن ۴۴ سال و محدوده سنی ۱۵-۶۵

(Phosphotungstic haematoxylin acid) PTAH رنگ می‌گیرند قرار شد تا نقش این رنگ آمیزی در تشخیص افتراقی سه تومور شایع غدد بزاوی مورد بررسی قرار گیرد. نظر به اینکه تاکنون گزارشی از شدت رنگ پذیری با PTAH در تومورهای غدد بزاوی به منظور افتراق آنها در دست نمی‌باشد می‌توان گفت که مطالعه حاضر برای اولین بار شدت رنگ آمیزی را در سلول‌های تومورال، هسته و سیتوپلاسم آنها در پلثومورفیک آدنوما، آدنوئید سیستیک کارسینوما و موکو اپیدرموئید کارسینوما مورد بررسی قرار می‌دهد.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت تجربی از نوع آزمایشگاهی می‌باشد. در این تحقیق پس از بررسی نمونه‌های موجود در بایگانی بخش آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ و بایگانی بخش آسیب‌شناسی انتستیو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در فاصله زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹، ۷۲ نمونه از سه گروه شایعتر تومورهای غدد بزاوی که دسترسی به تعداد نمونه فوق برای آنها امکان‌پذیر باشد متشکل از ۲۴ مورد پلثومورفیک آدنوما، ۲۴ مورد آدنوئید سیستیک کارسینوما و ۲۴ مورد موکوپی درموئید کارسینومای غده بزاوی انتخاب شد. کلیه اسلایدهای میکروسکوپی نمونه‌های مذکور به منظور تأیید تشخیص بازنگری شدند، سپس از بلوک‌های پارافینی برش شش میکرونی تهیه و با PTAH رنگ آمیزی گردید. لازم به ذکر است که جهت از بین بردن اثر غلظت و زمان کلیه نمونه‌ها با هم رنگ آمیزی شدند. در این رنگ آمیزی هسته سلول‌ها و فیبرین به رنگ آبی، رشته کلاژن به رنگ قرمز مایل به زرد یا قهوه‌ای و رشته‌های الاستیک ضخیم به رنگ ارغوانی در می‌آیند.

بدخیمی و شدت رنگ پذیری در هسته سلول‌های تومورال دست یافت ($P=0.068$).

Kruskal-Wallis - در بررسی این مورد با آزمون ناپارامتری رابطه معنی‌داری بدست نیامد. ($P>0.05$)

ج) آدنوئید سیستیک کارسینوما
بیماران شامل هشت نفر مؤنث (۲۲٪) و ۱۶ نفر مذکر (۶۶٪) با متوسط سن ۴۷ سال و محدوده سنی ۲۷-۷۸ سال بودند. نتایج بررسی رنگ آمیزی PTAH و مقایسه آن با H&E در جدول ۳ ارائه شده است.

سال بودند. مقایسه بین دو روش رنگ آمیزی PTAH و H&E در جدول ۲ آمده است.

در مورد بررسی درجه بدخیمی تومور و شدت رنگ پذیری با PTAH در موکوایی در موئید کارسینوما با استفاده از Spearman correlation نتایج زیر بدست آمد.

- بین درجه بدخیمی تومور و شدت رنگ پذیری کلی و شدت در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال رابطه معنی‌داری دیده نشد ($P=0.05$).

- از طرف دیگر به نظر می‌رسد که با انتخاب حجم بزرگتری از نمونه بتوان به رابطه معنی‌داری بین درجه

جدول ۱- شدت و میزان رنگ پذیری سلول‌های تومورال در پلنومورفیک آدنوما با دو روش رنگ آمیزی

سیتوپلاسم سلول		هسته سلول		کلی		رنگ پذیری شنید
H&E	PTAH	H&E	PTAH	H&E	PTAH	
%۰	%۴۲	%۰	%۰	%۰	%۰	عدم رنگ پذیری
%۷۵	%۶۲۵	%۸۲	%۳۷۵	%۱۶۷	%۱۶۷	رنگ پذیری خفیف
%۲۵	%۳۲۳	%۸۷۵	%۶۲۵	%۸۲۳	%۸۲۳	رنگ پذیری متوسط
%۰	%۰	%۴۲	%۰	%۰	%۰	رنگ پذیری شدید
$P=0.728$		$P=0.111$		$P=0.367$		نتیجه آزمون

جدول ۲- شدت و میزان رنگ پذیری سلول‌های تومورال در موکوایی در موئید کارسینوما با دو روش رنگ آمیزی

سیتوپلاسم سلول		هسته سلول		کلی		رنگ پذیری شنید
H&E	PTAH	H&E	PTAH	H&E	PTAH	
%۴۲	%۲۵	%۰	%۰	%۰	%۰	عدم رنگ پذیری
%۹۵۸	%۵۴۲	%۲۰۸	%۴۱۷	%۲۹۲	%۴۵۸	رنگ پذیری خفیف
%۰	%۱۶۷	%۷۰۸	%۳۷۵	%۶۶۷	%۲۷۵	رنگ پذیری متوسط
%۰	%۴۲	%۸۲	%۲۰۸	%۴۲	%۱۶۷	رنگ پذیری شدید
$P=0.796$		$P=0.593$		$P=0.851$		نتیجه آزمون

جدول ۳- شدت و میزان رنگ پذیری سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما با دو روش رنگ آمیزی

سیتوپلاسم سلول		هسته سلول		کلی		رنگ پذیری
H&E	PTAH	H&E	PTAH	H&E	PTAH	
%۴/۲	%۲۷/۵	%۰	%۰	%۰	%۰	عدم رنگ پذیری
%۷۹/۲	%۴۵/۸	%۴/۲	%۴/۲	%۶/۲	%۰	رنگ پذیری خفیف
%۱۶/۷	%۱۶/۷	%۵۴/۲	%۵۰	%۵۴/۲	%۶۶/۷	رنگ پذیری متوسط
%۰	%۰	%۴۱/۷	%۴۵/۸	%۴۱/۷	%۳۲/۲	رنگ پذیری شدید
$P = .1046$		$P = .1763$		$P = .0705$		نتیجه آزمون

شدت رنگ پذیری با PTAH مؤثر است ($P < .05$). با محاسبات آماری، مدل سازی Logistic انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شد: از ۷۲ نمونه مورد مطالعه، ۲۴ مورد (۳۳٪) دارای تومور خوش خیم و ۴۸ مورد (۶۶٪) بقیه دارای تومور بدخیم عدد بزرگی بودند. حداقل سن بیماران ۱۵ و حداً کثر ۷۸ سال بود (متوجه سن ۴۱ سال). مدل ارائه شده به صورت زیر است:

$$\text{Logit } P(X) = (-2/88) + (1/82) + (0.01062) + (\text{شدت رنگ پذیری در هسته سلول های تومورال}) - (\text{شدت رنگ پذیری در سیتوپلاسم سلول های تومورال})$$

با توجه به مدل بدست آمده شدت رنگ پذیری با PTAH در هسته سلول‌های تومورال با شدت بدخیمی تومور نسبت مستقیم دارد (Odds Ratio = ۵/۱۳۳). همچنین می‌توان گفت که شدت رنگ پذیری با سیتوپلاسم سلول‌های تومورال با شدت بدخیمی رابطه عکس دارد (Odds Ratio = ۰/۱۹). از طرف دیگر در مورد ارتباط بدخیم بودن تومور با سن می‌توان گفت هر چه سن افزایش یابد، خطر بدخیم بودن تومور بالا می‌رود. Odds Ratio = ۱/۰۶۴۸ (جدول ۴).

با توجه به جداول شماره ۲، ۳ و انجام آنالیز ناپارامتری Wilcoxon signed ranks ارتباط معنی‌داری بین شدت رنگ پذیری در هسته سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما بین دو روش رنگ آمیزی دیده شد. همچنین این ارتباط در مورد شدت رنگ پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال در پلئومورفیک آدنوما بین دو روش فوق صادق بود، ولی در سایر موارد ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد.

آنالیز ناپارامتری Kruskal-Wallis test برای بررسی رابطه بین نوع تومور و شدت رنگ پذیری کلی، شدت در هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال با PTAH انجام شد که در تمامی موارد معنی‌دار بود، به این صورت که سلول‌های تومورال به طور کلی در موکوپایی درموئید کارسینوما کمتر از پلئومورفیک آدنوما و هر دو کمتر از آدنوئید سیستیک کارسینوما رنگ می‌گیرند ($P = .0001$). حال آنکه شدت رنگ پذیری در هسته سلول‌های تومورال در پلئومورفیک آدنوما کمتر از موکوپایی درموئید کارسینوما و هر دو کمتر از آدنوئید سیستیک کارسینوما می‌باشد ($P = .0000$). از طرف دیگر شدت رنگ پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما کمتر از موکوپایی درموئید کارسینوما است و هر دو کمتر از پلئومورفیک آدنوما هستند ($P = .039$). پس نوع تومور در

جدول ۴- رابطه بین شدت رنگ پذیری، سن و Odds Ratio

متغیر	سن	PTAH با سلول های نومورال	شنیده از شبه ای تومور	P.Value	Odds Ratio β (نسبت شانس)	حدود اطمینان ۹۵٪ برای نسبت شانس
شدت رنگ پذیری در هسته سلول های تومورال با PTAH			۱/۶۲۹۹	.۰۰۶۳	۵/۱۰۳۲	۱/۵۸۵۰ - ۱۶/۴۱۶۰
شدت رنگ پذیری در سیتو پلاسم سلول های نومورال با PTAH			-۱/۶۲۱۲	.۰۰۴۷	.۰/۱۹۷۷	.۰/۰۶۴۳ - .۰/۰۶۷۷
			.۰/۰۶۲۸	.۰۰۶۴	۱/۰۶۴۸	۱/۰۱۷۸ - ۱/۱۱۴۰

برای مشخص کردن سلول های میوپایی تلیال در غدد بزاقی طبیعی موفقتر است. همچنین Shear در ۱۹۶۶ و Iron haematoxyling PTAH در ۱۹۷۰ هر دو روش را برای نشان دادن سلول های میوپایی تلیال موفق دانستند (۷، ۸). در ۱۹۸۶، Palmer سلول های میوپایی تلیال را در غدد بزاقی انسان بررسی کرد و دریافت که همان سلول های رنگ شده با PTAH در محیط آسینی ها هستند (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴).

Oxyphilic granular cell adenoma انکوستوما میباشد. خوب خیم و بی نهایت نادر غدد بزاقی است که در زنگ آمیزی H&E متشکل از سلول های درشت با سیتوپلاسم گرانولر اوزینوفیلیک یا همان انکوستوما باشد. این گرانول ها در زنگ آمیزی PTAH آبی رنگ می شوند (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹). این موضوع در ۱۹۸۹ توسط Iskander و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت (۲۰).

در ۱۹۸۸ هم Ellis مواردی از انکوستوما را گزارش کرد که همگی با PTAH رنگ می گرفتند (۲۱) و معتقد بود که سلول های روشن در انکوستوما بر خلاف Mucoepidermoid و adenocarcinoma Acinic cell carcinoma با PTAH رنگ می گیرند (۲۲).

Palmer و همکارانش در ۱۹۸۹ مواردی از خایعات غدد بزاقی را مورد بررسی قرار دادند که دارای تغییرات

بحث

واژه میوپایی تلیال اولین بار توسط Renault در سال ۱۸۹۷ مطرح شد. این سلول شباهت زیادی به سلول اپی تلیالی و سلول عضله صاف دارد و دارای منشا اکتودرمی می باشد. جایگاه این سلول ها بین سلول های غددی و غشاء پایه است و دارای زواید سیتوپلاسمی دندرتیکی بلند و میکروفلامنت ها می باشند (۲ و ۳).

طبق نظر Garrett و Emmelin اعمال این سلول ها در غدد بزاقی عبارتند از:

- کمک به خروج بزاق (با انقباض خود)

- کاهش فشار Luminal

- حمایت از پارانشیم زیرین در مقابل فشار ترشحی

- کمک به جریان بزاق با غلبه بر مقاومت محیطی (۴)

از طرف دیگر آنکوستوما ها سلول های اپی تلیالی بزرگی هستند که واجد سیتوپلاسم گرانول اوزینوفیلیک بوده و در بررسی با میکروسکوپ الکترونی، ماهیت این گرانول ها را میتوکندری دانسته اند.

Zimmerman در ۱۹۲۷ اولین محققی بود که سلول های میوپایی تلیال را در برشهای بافتی طبیعی با استفاده از Heidenhain 'Iron haematoxylin مشاهده و گزارش کرد (۵ و ۶).

بعد از او Mylius در ۱۹۶۰ نشان داد که رنگ آمیزی Mallory 'sphosphotungstic acid haematoxylin

بزاقی مورد بررسی قرار می‌دهد از بسیاری جهات قابل مقایسه با مطالعات قبلی نمی‌باشد. اما در مجموع می‌توان گفت که به جز در مورد شدت رنگ‌پذیری در هسته سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما و در سیتوپلاسم سلول‌ها در پلئومورفیک آدنوما، در سایر موارد دو روش رنگ‌آمیزی PTAH و H&E یکسان عمل کرده‌اند. روش رنگ‌آمیزی PTAH در بررسی رابطه بین درجه و شدت رنگ‌پذیری با PTAH در موکوایی درموئید کارسینوما رابطه معنی‌داری بین درجه بدخیمی تومور با شدت رنگ‌پذیری کلی و شدت رنگ‌پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال دیده نشد، ولی به نظر می‌رسد با انتخاب حجم بزرگتری از نمونه، می‌توان در این مورد دقیق‌تر اظهار نظر کرد.

از نکات برجسته این مطالعه وجود ارتباط آماری کاملاً معنی‌دار بین نوع تومور و شدت رنگ‌پذیری کلی، شدت در هسته و سیتوپلاسم سلول‌های تومورال با PTAH است که نشان‌دهنده ارزشمند بودن این روش در تشخیص افتراقی این ضایعات از یکدیگر می‌باشد.

در موردمدل Logistic بدست آمده‌می‌توان گفت که شدت رنگ‌پذیری در هسته سلول‌های تومورال و سن‌بیمار با بدخیم (Ratio Odds=۵/۱۰۳۳) بودن تومور رابطه مستقیم دارند[[Odds Ratio = ۱/۰۶۴۸]] بدین ترتیب که هسته سلول‌های بدخیم با درجه بیشتری از هسته سلول‌های خوش‌خیم رنگ می‌پذیرند. دلیل این امر را می‌توان به فعالیت بالای میتوزی و متراکم شدن کروماتین جهت انجام تقسیمات بیشتر سلولی نسبت داد که با نتایج دیگر آزمونهای آماری انجام شده در مطالعه، تطابق دارد. همان طوری که دیده شد شدت رنگ‌پذیری در هسته سلول‌های تومورال در آدنوئید سیستیک کارسینوما بیش از موکوایی در موئید کارسینوما و هر دو بیشتر از پلئومورفیک آدنوما بوده است. در رابطه با سن نیز می‌توان گفت که به طور کلی با بالا

انکوسیتیک بودند. اکثر این ضایعات به طور اولیه انکوسیتوما گزارش شده بودند ولی در حقیقت یا تغییر غیر ثوبلاستیک یا تغییر انکوسیتیک در دیگر انواع آدنومها بودند(۲۲). Clear cell oncocytoma در ۱۹۹۴ Davy Mitochondrial- Rich oncocytoma کرد که هر دو نوع تومور با PTAH رنگ می‌گیرند(۲۴).

Hamed در ۱۹۹۴ گزارش موردی از موکوایی درموئید کارسینومای غده پاروتید را به چاپ رسانید که در بررسی بافت‌شناختی متشكل از کیست‌هایی با اندازه‌های مختلف و مفروش از انکوسیت به همراه محدودی سلول موکوسی Goblet بود و آن را Oncocytic mucoepidermoid نام نهاد(۲۵).

Ferreiro در ۱۹۹۵ تمایز انکوسیتیکی را در موکوایی درموئید کارسینوما و پلئومورفیک آدنوما شرح داد که همین مسأله باعث اشتباه در تشخیص افتراقی پلئومورفیک آدنوما از انکوسیتوما شده بود(۲۶).

محققان متعددی نظیر Christopherson (۱۹۴۹)، Blanck (۱۹۵۷) Greenberg & Haley (۱۹۷۰)، Feiner (۱۹۷۶)، Gray (۱۹۷۰)، و همکاران (۱۹۸۶)، Jahan – Parwar (۱۹۸۹)، Palmer (۱۹۸۷) Pulitzer (۱۹۹۹) نیز تغییرات انکوسیتیکی را در تومورهای غدد بزاقی شرح داده‌اند(۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲).

Thompson هم در ۱۹۹۶ مروری بر ۲۲ مورد انکوسیتومای غده بزاقی داشت که با PTAH آبی تیره می‌شدند، این مسأله توسط Ellis در ۱۹۹۸ هم مورد بررسی قرار گرفت(۳۳). Honda و Shintaku در ۱۹۹۷ مشاهده کردند که تومور وارتن دارای سلول‌هایی با ماهیت انکوسیتی است که با PTAH رنگ می‌گیرند(۳۴).

از آنجایی که این مطالعه برای اولین بار شدت رنگ‌پذیری را در جهت تشخیص افتراقی تومورهای غدد

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه می‌توان گفت رنگ‌آمیزی PTAH بین سه نوع تومور مورد بررسی تفاوت‌های مشخصی از لحاظ شدت رنگ‌پذیری کلی، شدت در هسته و شدت در سیتوپلاسم را نشان می‌دهد و در تشخیص افتراقی آنها سودمند خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به متغیرهای مذکور و سن بیمار در مدل Logistic ارائه شده می‌توان در مورد بدخیم یا خوش‌خیم بودن تومور، در مورد سه تومور شایعتر غدد برازقی بررسی شده، اظهار نظر کرد.

رفتن سن فرد خطر بدخیم بودن تومور ایجاد شده افزایش می‌یابد. اما در مورد شدت رنگ‌پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال با شدت بدخیمی تومور نسبت عکس دیده شد ($Odds\ Ratio = +/19$) که با نتایج بدست آمده از سایر آزمونهای آماری انجام شده در این مطالعه نیز تطابق دارد. همان طوری که مشاهده شد در مورد شدت رنگ‌پذیری در سیتوپلاسم سلول‌های تومورال، پلئومورفیک آدنوما بیش از موکوایی درموئید کارسینوما و هر دو بیش از آدنوئید سیستیک کارسینوما رنگ می‌پذیرند.

منابع

- 1- Grenko RJ, Abendroth CS, Davis AT, Levin RJ, Dardick I. Hybrid tumors or salivary gland tumors sharing differentiation pathways? Reexamining adenoid cystic and epithelial-myoepithelial carcinomas. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1998; 86: 188-95.
- 2- Gardesa AL, Bombi JA. Myoepithelial tumors of salivary glands: A clinicopathologic, immunohistochemical, ultrastructural and flowcytometric study. *Semin Diagn Pathol* 1996; 13: 138-47.
- 3- Palmer RM. The identification of myoepithelial cells in human salivary glands. A review and comparison of light microscopical methods. *J Oral Pathol* 1986; 15: 221-29.
- 4- Garrett JR, Emmelin N. Activities of salivary myoepithelial cells. A review. *Med Biol* 1979; 51:1.
- 5- Young JA, Van Lennep EW. Morphology and physiology of salivary myoepithelial cells. *Int Rev Physiol* 1977; 12: 105.
- 6- Van Bogaert LJ, Maldague P, Collette JM, Abarca J. Study on the histochemical specificity for myoepithelial cells of the tanno- molybdic method. *Ann Histochem* 1976; 21:229.
- 7- Van Bogaert LJ, Abarca J, Maldague P. Appraisals and pitfalls of myoepithelial cell staining by levano fast cyanine 5RN. *Histochemistry* 1977; 54: 251.
- 8- Van Bogaert LJ, Quinones JA, Maldague P. A modified levanol fast cyanine 5RN staining method for myoepithelial cells. *J Microsc* 1979; 115: 289.
- 9- Franke WW, Schmid E, Freudenstein C, Appelhans B, Osborn M, Weber K, Keenan TW. Intermediate cells of the prekeratin type in myoepithelial cells. *J Cell Biol* 1980; 84:633.
- 10- Daley TD, Wysocki GP, Smout MS, Slinger RP. Epithelial-myoepithelial carcinoma of salivary glands. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1984 May;57(5):512-19.
- 11- Corio RL, Sciubba JJ, Brannon RB, Batsakis JG. Epithelial-myoepithelial carcinoma of intercalated duct origin. A clinicopathologic and ultrastructural assessment of sixteen cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1982 Mar;53(3):280-7.
- 12- Luna MA, Ordonez NG, Mackay B, Batsakis JG, Guillamondegui O. Salivary epithelial-myoepithelial carcinomas of intercalated ducts: a clinical, electron microscopic, and immunocytochemical study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1985 May;59(5):482-90.
- 13- Lampe H, Ruby RR, Greenway RE, DeRose G, Wysocki GP. Epithelial-myoepithelial carcinoma of the salivary gland. *J Otolaryngol* 1984 Aug;13(4):247-51.

- 14- Redman R. Myoepithelium of salivary glands. *Microsc Res Techn* 1994; 27:24-25.
- 15- Neville BW. Oral and Macillofacial Pathology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1995, 336.
- 16- Sapp JP, Eversole LR. Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology. 1st ed. St Louis: Mosby; 1997: 292-300.
- 17- Dardick I. Color Atlas. Text of Salivary Gland Tumor Pathology. New York, Tokyo: Igaku- Shoin Medical Publishers INC; 1996: 69-74,105-16.
- 18- Rosai J. Ackerman's Surgical Pathology. 8th ed. New York: Mosby; 1995: 826-27.
- 19- Regezi JA, Sciubba JJ. Oral Pathology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 1999: 247-48.
- 20- Iskander KG, Hamid S, Moussa M, Seif EJ. Oxyphilic granular cell adenoma (Oncocytoma)-a histochemical and ultrastructural study. *Egypt Dent J* 1989; 35(4): 359-68.
- 21- Ellis GL. Clear Cell oncocytoma of salivary gland. *Hum Pathol* 1988; 19(7): 862-67.
- 22- Paulino AF, Huvos AG. Oncocytic and oncocytoid tumors of the salivary glands. *Semin Diagn Pathol* 1999 May;16(2):98-104. Review.
- 23- Palmer TJ, Gleeson MJ, Eveson JW, Cawson RA. Oncocytic adenomas and oncocytic hyperplasia of salivary glands. A clinicopathologic study of 26 cases. *Histopathol* 1989; 16: 487-93.
- 24- Davy GL, Dardick I, Hammond E, Thomas J, Rapids G. Relationship of clear cell oncocytoma to mitochondrial-rich (typical) oncocytomas of parotid salivary gland. An ultrastructural study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1994; 77:469-78.
- 25- Hamed G, Shmookler BM, Ellis GL, Punja U, Feldman D. Oncocytic mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland. *Arch Pathol Lab Med* 1994; 118(3): 313-14.
- 26- Ferreiro JA, Stylopoulos N. Oncocytic differentiation in salivary gland tumors. *J Laryngol Otol* 1995; 109: 569-71.
- 27- Stylopoulos FJA. Oncocytic differentiation in salivary gland tumors. *J Laryngol Otol* 1995; 109:569-70.
- 28- Brandwein MS, Huvos AG. Oncocytic tumors of major salivary glands. A study of 68 cases with follow-up of 44 patients. *Am J Surg Pathol* 1991; 15:514-28.
- 29- Dardick I, Birek G, Lingen MW, Rowe E. Differentiation and the cytomorphology of salivary gland tumors with specific reference to oncocytic metaplasia. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1999; 88:691-701.
- 30- Thompson LD, Weing BM, Ellis GL. Oncocytomas of the submandibular gland. A series of 22 cases and a review of the literature. *Cancer* 1996; 78:2281-87.
- 31- Shintaku M, Honda T. Identification of oncocytic lesions of salivary glands by anti-mitochondrial immunohistochemistry. *Histopathol* 1997; 31(5): 408-11.
- 32- Jahan Parwar B, Huberman RM, Donovan DJ, Schwartz MR, Ostrowski ML. Oncocytic mucoepidermoid carcinoma of the salivary gland. *Am J Surg Pathol* 1999; 23(5): 523-29.
- 33- Waldo SGS. Oncocytic change in mucoepidermoid carcinoma of parotid gland. *Arch Pathol* 1975; 99: 663-66.
- 34- Dardick I, Claude A, Parks WR, Hoppe D, Stinson J, Burns BF, Little J, Brown DL, Dairkee SH. Warthin's tumor: an ultrastructural and immunohistochemical study of basilar epithelium. *Ultrastruct Pathol* 1988;12(4):419-32. Review.