

بررسی آینده‌نگر تظاهرات دهانی در مبتلایان به کمبود انتخابی ایمونوگلوبولین A در مرکز طبی کودکان (سال ۸۰-۱۳۷۹)

دکتر زهرا پورپاک^{*}، دکتر مهدی شهرابی^{**}، دکتر ژاله نیکفر جام^{***}، دکتر محمد مؤذنی^{****}، لاله نیکفر جام^{*}
دکتر اصغر آقا محمدی^{*}

* عضو هیأت علمی بخش ایمunoتولوژی و آلمزی بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

** استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

*** استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان

**** عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

Title: A prospective study on oral manifestations in selective IgA deficient patients in children medical center of Tehran University of Medical Sciences (2000- 2001)

Authors: Pourpak Z. Assistant Professor*, Shahrabi M. Assistant Professor**, Nikfarjam J. Assistant Professor***, Moazeni M. Assistant Professor****, Nikfarjam L. Academic Staff*, Aghamohammadi A. Assistant Professor*

Address: *Dept. of Immunology. Children Hospital Medical Center. Tehran University of Medical Sciences

** Dept. of Pediatric Dentistry. Faculty of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences

*** Dept. of Pediatric Dentistry. Faculty of Dentistry. Rafsanjan University of Medical Sciences

**** Medical Faculty. Tarbiat Modrres University, Tehran.

Abstract: IgA selective deficiency is the most common immunodeficiency. The prevalence of it in different races varies from $\frac{1}{400}$ to $\frac{1}{2000}$. Since secretary IgA has has a defensive role in the mucosal

surfaces, supposing is thought that IgA deficiency will be accompanied by oral manifestations. The previous studies showed controversial results about that. The aim of this cohort study was to finding out oral manifestations in IgA- deficient individuals. As a result oral specialists can find the patients in early stages. 11 IgA- deficient patients (with IgA level $< 10 \text{ mg/dl}$ in serum) and 11 normal volunteers with the same age and sex were compared. The ages of the people were between 3 and 18 years old and 5 girls and 6 boys were in each group. Their oral examination included DMFT (Decayed, Missed and Filled Teeth), periodontal condition, Plaque accumulation and oral mucosal lesions. Saliva immunoglobulin and secretary component levels were detected by enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA) and serum immunoglobulin levels were detected by single radial immunodiffusion (SRID) methods. All of the IgA- deficient patients had the serum IgA level $< 10 \text{ mg/dl}$ and their immunoglobulin levels were normal. $\frac{9}{11}$ of these patients didn't have SIgA and the rest of them had a little SIgA in their saliva($\frac{1}{2}$)

SIgA levels in sex and age matched normal group). IgA deficient patients showed no statistical significant difference about oral manifestations in comparison with normal group. It may be related to the increase of compensatory SIgM or assistance of other non- immunological defense factors in saliva, phagocytosis and cellular immunity. Thus IgA- deficiency cannot produce any oral manifestations as a criteria to diagnose it.

Key words: IgA deficiency- Saliva- Serum- Secretary component- Immunoglobulins- Oral manifestation

Journal of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences (Vol. 14, No: 3, 2001)

چکیده

شایعترین نقص ایمنی، کمبود انتخابی IgA می‌باشد که در بین نژادها و اقوام مختلف شیوعی بین $\frac{1}{400}$ تا $\frac{1}{2000}$ دارد. چون IgA نقش مهمی در محافظت از مخاط از جمله بافت دهان بر عهده دارد، انتظار می‌رود کمبود آن سبب بروز تظاهرات دهانی گردد. مطالعات گذشته نتایج ضد و نقیضی را در این مورد گزارش کرده‌اند. این مطالعه با بررسی ضایعات دهان و دندان و شیوع آنها در این بیماران بدنیال یافتن ضایعه دهانی خاص به عنوان راهنمای شناسایی بیماران مبتلا به نقص انتخابی IgA می‌باشد تا متخصصین دهان و دندان بتوانند این بیماران را قبل از بروز عوارض زودرس و دیررس بیماری شناسایی کنند. در این بررسی تعداد یازده بیمار مبتلا به نقص انتخابی IgA (با IgA سرمی کمتر از 10 mg/dl) انتخاب شدند و با یازده فرد سالم که از نظر سن و جنس همسان بودند، مقایسه گردیدند. سن افراد مورد مطالعه بین سه تا هجده سال و هر گروه شامل پنج دختر و شش پسر بود. معاینات دهانی شامل ثبت تعداد دندانهای پوسیده، پرسیده و از دست رفته، وضعیت پریودنثیوم، میزان تجمع پلاک میکروبی و ضایعات موجود در مخاط دهان و سرعت ترشح بزاق بود. مقادیر ایمونوگلوبولین‌های بزاق و قطعه ترشحی در هر دو گروه به روش Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) و ایمونوگلوبولین‌های سرمی به روش Single Radial Immunodiffusion (SRID) مورد سنجش قرار گرفتند. IgA سرمی بیماران در 100% موارد کمتر از 10 mg/dl و از نظر سایر ایمونوگلوبولین‌های سرمی طبیعی بودند؛ همچنان در $\frac{9}{11}$ از بیماران SIgA وجود نداشت در حالی که در $\frac{2}{11}$ آنها مقدار کمتر از نصف گروه سالم هم سن و هم جنس خود IgA داشتند. میزان قطعه ترشحی و SIgM بزاق بیماران با کمبود انتخابی IgA در مقایسه با افراد سالم افزایش یافته بود که از نظر آماری این اختلاف معنی دار می‌باشد. در مطالعه حاضر هیچ گونه تفاوتی در تظاهرات دهانی اعم از میزان بالای تجمع پلاک میکروبی، میزان بالای پوسیدگی، وجود بیماریهای پریودنثیم و زخمها و عفونتهای مخاط دهان بین دو گروه مشاهده نشد. این مطلب می‌تواند به دلیل افزایش جبرانی SIgM و یا مساعدت عوامل دفاعی غیرایمونولوژیک بزاق و یا سایر سیستم‌های ایمنی نظیر فاگوسیتوز و ایمنی سلوی باشد؛ بنابر این بیماران دارای کمبود انتخابی IgA قادر تظاهرات دهانی به عنوان یک راهنمای شناسایی برای این بیماری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: کمبود IgA- بزاق- سرم- قطعه ترشحی- ایمونوگلوبولین‌ها- تظاهرات دهانی

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۴، شماره ۳، سال ۱۳۸۰)

زیرا سایر ایمونوگلوبولین‌های سرم مثل IgM و IgG در حد نرمال یا بالاتر از نرمال است؛ به علاوه این افراد دارای سلول‌های T نرمال یا نزدیک نرمال، سلول‌های بیگانه‌خوار طبیعی و عملکرد طبیعی سیستم کمپلمان می‌باشند؛ در ضمن ارتباط این بیماری با حذف جزئی بازوی بلند کروموزوم ۱۸ نیز مشخص شده است (۲،۳،۵)؛
نمای بالینی این بیماران ممکن است از سالم و بدون

مقدمه

نقص انتخابی IgA شایعترین نقص ایمنی اولیه است و با عدم وجود یا کمبود بسیار شدید IgA مشخص می‌شود. میزان IgA سرم این افراد 10 mg/dl یا کمتر می‌باشد (۱)؛ در حالی که در کودکان از سن یک سالگی به حد طبیعی می‌رسد و حداقل 40 mg/dl می‌باشد و در بالغین سالم می‌رسد $450-900 \text{ mg/dl}$ است. این اختلال، انتخابی نامیده می‌شود؛

هدف از انجام این تحقیق بررسی علائم دهانی بیماران مبتلا به نقص IgA به منظور تشخیص احتمالی آن بود تا از این طریق بتوان افراد مشکوک به این نقص را برای شناسایی دقیق بیماری به مراکز ایمونولوژی ارجاع داد تا نه تنها از بروز عوارض دیررس بیماری جلوگیری نمود بلکه از بروز عوارض کشنده فوری ناشی از دریافت خون و فراورده‌های خونی حاوی IgA نیز ممانعت به عمل آورد.

روش بررسی

این تحقیق یک مطالعه کوهورت و شامل دو گروه مواجهه (Exposed) و غیر مواجهه بود.

گروه مواجهه شامل یازده کودک و نوجوان دارای علائم بالینی مربوط به نقص IgA مراجعه‌کننده به بخش ایمونولوژی مرکز طبی کودکان بود. IgA سرمی این بیماران کمتر از 10 mg/dl و سایر ایمونوگلوبولین‌های سرمی آنها نرمال یا بالاتر از نرمال بود. این آزمونها حداقل دو بار و به فواصل دو تا سه ماه تکرار شدند.

- گروه غیر مواجهه شامل یازده کودک و نوجوان سالم از نظر سیستم ایمنی بود. این افراد از بین داوطلبان حاضر به همکاری که از نظر سن و جنس با گروه مواجهه همسان بودند، انتخاب شدند.

در این مطالعه افرادی که از داروهای مؤثر بر سیستم ایمنی مثل سیکلوسپورین، فنیتوئین، طلا، سدیم، والپروات و یا از هرگونه داروی دیگر (از جمله انتی‌بیوتیک‌ها) که بیش از یک ماه استفاده کرده بودند، از مطالعه حذف شدند. معاینات دهانی شامل ارزیابی وضعیت مخاط دهان (لوزه-لهه-مخاط گونه-کام نرم-کام سخت-لبهه-زبان و حلق)، تشخیص وضعیت پوسیدگی دندانی با استفاده از سوند و اینه و نور مناسب بود و اگر سوند در شیارها یا حفره‌های تغییر رنگ یافته دندان، گیر می‌کرد، به عنوان

علامت تا ابتلا به بیماریهای شدید و مهم (عفونت-آلرژی-بیماری‌های اتوایمیون) متفاوت باشد که علت آن هنوز نامشخص است (۷۶،۵،۳).

از آنجایی که ایمونوگلوبولین A دارای عملکرد خاص حفاظت از سطوح مخاطی بدن (چشمها، دهان، گلو، ریه‌ها، دستگاه گوارش و مجرای ادراری تناسلی) از عفونت می‌باشد، لذا در آن دسته از بیماران با نقص انتخابی IgA که دارای تاریخچه‌ای از عفونتهای عودکننده می‌باشند، شایعترین این عفونتها شامل عفونتهای گوش، سینوزیت و پنومونی است؛ همچنین عفونتهای گلو، مجرای گوارش یا چشمها نیز ممکن است ایجاد شوند.

گزارش شده است که آنتی‌بادی‌های ضد IgA در سرم ۴۴٪ از بیماران دارای نقص IgA وجود دارد که می‌تواند منجر به واکنشهای آنافیلاکتیک شدید یا کشنده بعد از تجویز داخل وریدی فراورده‌های خونی حاوی IgA گردد (۱۱)؛ به همین دلیل در این افراد باید از گلبول‌های قرمز شسته‌شده یا فراورده‌های خونی گرفته‌شده از فرد مشابه همان بیمار یا از خود فرد استفاده کرد.

IgA اصلی‌ترین ایمونوگلوبولین موجود در بزاق است و نقش حفاظت مخاط دهان را در برابر هجوم میکروارگانیزم‌ها بر عهده دارد.

Lehner و Moson در سال ۱۹۸۰، Scully در سال ۱۹۸۲ و Cowson در سال ۱۹۹۳ بروز آفته‌های عودکننده، عفونتهای هریتیک مکرر، التهاب لوزه و فارنکس و التهاب شدید لته و کاندیدوزیس را به عنوان علائم دهانی بیماری نقص IgA عنوان کردند (۱۰،۹،۸)؛ در حالی که Leggott در سال ۱۹۸۶، Leggott و همکاران در سال ۱۹۸۷ و Scully و Porter در سال ۱۹۹۳ علائم دهانی مشخصی را در این بیماران گزارش نکردند (۱۲،۴،۱۱).

بزاق نباید چیزی می‌خورد و دهانش را باید با آب شستشو می‌داد تا ذرات غذا در بزاقش باقی نمی‌ماند؛ سپس به مدت ۲ دقیقه بزاقش را در دهان نگه می‌داشت. آنگاه با سرنگ (بدون سر سوزن) بزاق جمع‌آوری گردید. با این کار سرعت ترشح بزاق نیز محاسبه شد. نمونه‌های هر بیمار (چهار نمونه) به حجم ۳۰۰ لیل در فریزر در دمای ۷۰-۷۰ سانتی‌گراد نگهداری شد.

لازم به ذکر است میزان IgG، SIgA، SIgM بزاق و همچنین قطعه ترشحی بزاق به روش ELISA تعیین گردید.

به منظور تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار SPSS استفاده شد؛ همچنین از آزمونهای χ^2 و Fisher برای متغیرهای کیفی و از آزمون t برای متغیرهای کمی استفاده گردید.

یافته‌ها

یافته‌های این مطالعه در قالب جدولهای شماره ۱-۴ ارائه شده است.

در جدول شماره ۱، تعداد، سن، جنس، قد و وزن و در جدول شماره ۲ سطوح ایمونوگلوبولین‌های سرم افراد مورد مطالعه آورده شده است.

نتایج عوامل مورد بررسی در بزاق و تظاهرات دهانی دو گروه مورد مطالعه به ترتیب در جدولهای شماره ۳ و ۴ آمده است.

بین IgA سرمی و SIgA در افراد گروه مواجهه همبستگی مثبت وجود دارد ($P=0.02$)؛ همچنین بین IgM و SIgM بین آنها نیز همبستگی مثبتی به دست آمد ($P=0.18$)؛ در حالی که بین حجم بزاق و ایمونوگلوبولین‌های بزاقی افراد گروه مواجهه هیچ همبستگی وجود نداشت (جدول شماره ۳).

پوسدگی ثبت می‌شد.

در اولین جلسه معاينه به همه افراد هر دو گروه آموزش بهداشت دهان داده شد و در بخش دندانپزشکی مرکز طبی کودکان دندانهایشان، بعد از جمع‌آوری نمونه بزاق، تحت پروفیلاکسی و فلوراایدترایپ قرار گرفت.

اطلاعات مربوط به معاينه اولیه به صورت اطلاعات پایه (Baseline) در نظر گرفته شد و تغییرات نسبت به آن در طی مدت پیگیری ثبت گردید.

معاینات پیگیری هر ماه یک بار انجام می‌شد و حداقل تعداد دفعاتی که طی یک سال مطالعه، افراد باید تحت معاينات پیگیری قرار می‌گرفتند، شش بار تعیین گردید؛ ضمن این که در فواصل معاينات نیز در صورت بروز ضایعات دهانی مراجعه می‌نمودند. معاينات دهانی در بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

ایندکس پلاک و پریودنتال با تغییری مختصر در دندانهای انتخابی ایندکس Ramfjord برای هر بیمار تعیین گردید (۱۳)؛ جهت سهولت کار دندانهای ۱۶، ۲۶، ۱۱ و ۳۱، ۳۶ و ۴۶ انتخاب شدند. برای تعیین ایندکس پلاک از Probe Technique (۱۴) و برای تعیین ایندکس پریودنتال از پروب استفاده شد.

در اولین جلسه معاينه ۲ سی سی از خون سیاهگی همه افراد مورد مطالعه جمع‌آوری و سرم آن جدا گردید و در دمای ۷۰-درجه سانتی‌گراد تا زمان آزمایش نگهداری شد. میزان IgG، IgA و IgM کلی سرم افراد با روش SRID (Single radial immunodiffusion) تعیین گردید.

به منظور بررسی عوامل مورد نظر در بزاق، نمونه‌های تحریک‌نشده بزاق افراد تحت شرایط خاصی جمع‌آوری گردید؛ به این ترتیب که بیمار ۲۰ دقیقه قبل از جمع‌آوری

(P=۰/۰۰) که طبق تعریف مشخص می‌گردد که افراد گروه مواجهه دارای نقص انتخابی IgA می‌باشند (۴،۳،۲) (جدول شماره ۲).

سرعت ترشح بزاق بین دو گروه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد که این یافته مشابه مطالعه Brathall و همکاران می‌باشد (۱۵) (جدول شماره ۳) و نشان می‌دهد در گروه مواجهه مشکل ترشح بزاق وجود ندارد.

همان‌طور که در بخش یافته‌ها ذکر شد، بین سرعت ترشح بزاق و میزان ایمونوگلوبولین‌های بزاق همبستگی وجود ندارد؛ بنابراین اختلاف مقادیر ایمونوگلوبولین‌های بزاق در دو گروه مربوط به حجم یا مقدار بزاق نیست؛ هر چند که اختلاف معنی‌داری هم بین حجم بزاق دو گروه دیده نمی‌شود؛ ضمن این که به نظر می‌رسد برقراری جریان صحیح بزاق سبب ذخیره عوامل غیر ایمونولوژیک بزاق در حفاظت از مخاط دهان می‌شود.

جدول شماره ۲- مقادیر ایمونوگلوبولین‌های سرمی افراد مورد مطالعه

P.value	ایمونوگلوبولین‌های سرم	گروه مواجهه	گروه غیرمواجهه	IgG سرم (mg/dl)
۰/۲۰۴	۱۰۰/۵	۱۳۵/۱/۸۱	میانگین	۱۱/۷۷±۴/۹۳
	۳۸۰/۰۲	۷۷۷/۵۴	انحراف معیار	۳-۱۹
	۴۰۰-۱۹۰۰	۵۵۰-۲۵۰۰	حدود تغییرات	۹۷-۱۸۴
۰/۶۶۲	۱۵۹/۲۷	۱۴۱/۲۷	میانگین	۱۲/۰۹±۴/۷۶
	۷۷/۱۶	۱۱۰/۰۵	انحراف معیار	۳-۱۸
	۷۴-۳۴۰	۲۰-۲۶۰	حدود تغییرات	۹۸-۱۶۰
*۰/۰۰	۱۷۸/۸۱	۱۰	میانگین	۱۳۵/۹۰±۱۹/۴۰
	۱۰۲/۰۱	۰/۰۳	انحراف معیار	۹۷-۱۸۴
	۷۰-۳۷۲	->۱۰	حدود تغییرات	۱۵-۴۶

* اختلاف در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است.

جدول شماره ۱- مشخصات افراد مورد مطالعه از نظر تعداد، سن، قد، وزن و جنس

P.value	گروه مواجهه		گروه غیرمواجهه		جنس	گروههای مطالعه
	مرد	زن	مرد	زن		
-	۶	۵	۶	۵	تعداد	
۰/۸۷۹	۱۱/۷۷±۴/۹۳	۱۲/۰۹±۴/۷۶	میانگین	سن (سال)		
۰/۵۱۰	۱۴۲/۵۴±۲۶/۲۸	۱۳۵/۹۰±۱۹/۴۰	میانگین	قد (سانتی‌متر)		
۰/۳۰۷	۴۰/۲۳±۱۸/۷۶	۳۳/۴±۱۰/۳۴	میانگین	وزن (کیلوگرم)		
	۱۳-۶۶	۱۵-۴۶	حدود تغییرات	حدود تغییرات		

بحث

مطالعه حاضر جهت بررسی تظاهرات دهانی بیماری نقص IgA طراحی گردید تا با شناخت نوع و شیوه این تظاهرات بتوان با روئیت علائم دهانی به تشخیص بالینی احتمالی نقص IgA مشکوک شد و پس از انجام معاینات دقیق ایمونولوژیک بیماران واقعی را شناسایی کرد و آنها را تحت نظر گرفت تا نه تنها از بروز عوارض دیررس بیماری جلوگیری نمود بلکه از بروز عوارض کشنده فوری ناشی از دریافت خون و فراوردهای خونی حاوی IgA نیز ممانعت به عمل آورد؛ یا در صورت عدم مشاهده تظاهرات دهانی در این بیماری از انجام آزمایشات ایمونولوژیک بر اساس بروز تظاهرات دهانی ذکر شده که در بسیاری از منابع علمی آمده است، جلوگیری به عمل آورد (۱۰،۹،۸).

از نظر ایمونوگلوبولین‌های سرمی تنها بین IgA سرمی افراد گروه مواجهه و غیرمواجهه اختلاف معنی‌دار وجود دارد

به نقص SIgA IgA یافت می‌شود؛ هر چند و همکاران در چندین مقاله تأکید کردند که Brandtzaeg در افرادی که IgA سرمی ندارند، در بزاق خود فاقد SIgA می‌باشند (۱۶).

جدول شماره ۴- تظاهرات دهانی افراد مورد مطالعه طی شش بار معاینه

P-value	گروه موواجهه	گروه غیر موواجهه	متغیر
زخم‌های دهانی			
۰/۲۴	۳	۰	آفت
۰/۴۹	۰	۳	هریس
۱/۰۰	۱	۰	کاندیدا
۰/۲۴۹	۴۰	۴۲	التهاب لوزه
	۶	۰	گلوبولین رومبوئید
	۰	۶	زبان شیاردار
	۰	۶	زبان جغایفایی
وضعیت پلاک میکروبی			
۰/۱۱۲	۰/۷۱۲۱	۱/۱۹۷۰	میانگین
	۰/۶۹۱۶	۰/۵۷۴۲	انحراف معیار
DMF مقادیر			
۰/۰۷	۲/۸۸ ± ۲/۸۸	۴/۷۷ ± ۵/۳۹	D
۰/۱۱	۰/۶۸ ± ۱/۲۶	۱/۱۰ ± ۱/۲۸	M
۰/۲۲	۲/۵۳ ± ۲/۴۱	۴/۴۲ ± ۶/۶۹	F

شاید دلیل وجود مقادیر از SIgA در بزاق را بتوان به وجود مقادیر بسیار ناچیز IgA سرمی در افراد دارای نقص IgA مربوط دانست که با روش‌های معمول قابل تعیین نمی‌باشند. این مسئله گویای این مطلب است که این افراد دارای توان تولید IgA هرچند به مقدار بسیار اندک هستند. میزان SIgM در گروه موواجهه نسبت به گروه غیرموواجهه اختلاف معنی‌داری دارد که نقص ژنتیکی در تولید IgA در این بیماران منجر به عدم تولید IgA در سرم و بزاق شده است؛ در ضمن طبق نتایج بدست آمده در این مطالعه، بین IgA و SIgA سرمی همبستگی وجود دارد ($P=0/02$) که خود مؤید همین مطلب است. شایان ذکر است در این مطالعه دو مورد از بیماران مبتلا به نقص IgA در بزاق خود دارای SIgA بودند؛ هر چند در مقایسه با افراد هم‌سن و هم‌جنس خود این میزان بسیار کمتر و حدوداً کمتر از نصف آنها بود. این بافتی مشابه مطالعه Goldberg و همکاران می‌باشد؛ ایشان دریافتند که در بزاق بعضی از بیماران مبتلا

جدول شماره ۳- مشخصات مربوط به بزاق افراد

مورد مطالعه

P.value	گروه غیرموواجهه	گروه موواجهه	گروههای مطالعه	
			عوامل مورد بررسی در بزاق	میانگین
۰/۲۲	۷۰۵ μl/۲ ^۱ ۴۹۰/۷۱ ۵۰-۱۵۰۰ μl ^۲	۴۲۷ μl/۲ ^۱ ۵۰۳/۵۰ ۲۰-۱۵۰۰ μl/۲ ^۱	سرعت ترشح برقی تحریک نشده	
			انحراف معیار	میانگین
			حدود تغییرات	انحراف معیار
			(μg/ml) SIgA	میانگین
*۰/۰۰	۱۰۴/۶۳ ۴۱/۶۷	۱۱/۹۵ ۲۱/۷۰	(μg/ml) SIgM	میانگین
*۰/۰۰۴	۶/۰۰ ۶/۲۴	۳۱/۱۲ ۲۵/۱۱	(μg/ml) IgG-Saliva	انحراف معیار
۰/۶۳	۱۲/۴۰ ۱۰/۹۵	۱۴/۹۶ ۱۳/۷۸	(OD) Secretory Component	میانگین
*۰/۰۰	۰/۵۱ ۰/۱۹	۱/۲۸ ۰/۴۳	میانگین	انحراف معیار

* اختلاف در سطح >0.5 معنی‌دار است.

میزان SIgA بزاق در گروه غیر موواجهه اختلاف معنی‌داری را نسبت به گروه غیر موواجهه نشان می‌دهد و این نکته نشان‌گر این مطلب است که نقص ژنتیکی در تولید IgA در این بیماران منجر به عدم تولید IgA در سرم و بزاق شده است؛ در ضمن طبق نتایج بدست آمده در این مطالعه، بین IgA و SIgA سرمی همبستگی وجود دارد ($P=0/02$) که خود مؤید همین مطلب است. شایان ذکر است در این مطالعه دو مورد از بیماران مبتلا به نقص IgA در بزاق خود دارای SIgA بودند؛ هر چند در مقایسه با افراد هم‌سن و هم‌جنس خود این میزان بسیار کمتر و حدوداً کمتر از نصف آنها بود. این بافتی مشابه مطالعه Goldberg و همکاران می‌باشد؛ ایشان دریافتند که در بزاق بعضی از بیماران مبتلا

مورد کاندیدا مشاهده نشد ولی در این مدت در گروه غیرموواجهه یک مورد کاندیدا مشاهده گردید که این اختلاف نیز بر اساس آزمون Fisher از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد.

در مطالعه حاضر تظاهرات دهانی مثل هیپرتروفی لوزه، زبان جغایایی، زبان شیاردار و گلوسیت رومبوئید نیز دیده شد که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین گروه موواجهه و غیرموواجهه مشاهده نگردید.

این یافته‌ها مشابه مطالعات Leggott در سال ۱۹۸۶ Scully و همکاران در سال ۱۹۸۷ و Porter و Jones در سال ۱۹۹۳ می‌باشد (۱۲، ۴، ۱۱)؛ در حالی که Lehner در سال ۱۹۸۳ Moson در سال ۱۹۸۰، Roitt و Cowson و Scully در سال ۱۹۹۳ بر خلاف مطالعه حاضر آفت‌های عودکننده، عفونتهای هرپتیک مکرر، التهاب لوزه و فارنکس و التهاب شدید لته و کاندیدیوزیس را به عنوان تظاهرات دهانی بیماری نقص IgA معرفی کرده‌اند (۱۰، ۹، ۸).

عدم مشاهده تظاهرات دهانی شاید تا حدی مربوط به اثر افزایشی SIgM در بزاق و اثر حفاظتی آن باشد؛ همچنین سایر عوامل ایمنی نظیر سیستم‌های فاگوسیتوز و ایمنی سلولی و نیز عوامل غیر ایمونولوژیک بزاق لظیز پراکسیداز- لیزوریم و ... که قبلاً ذکر شده است، می‌توانند در جبران نقص IgA کمک کننده باشند.

نتایج متفاوتی که در مطالعات مختلف در مورد تظاهرات دهانی بیماران دارای نقص IgA عنوان شده است، می‌تواند تحت تأثیر عواملی نظیر ژنتیک و یا تغذیه در جوامع مختلف باشد که باید در مقایسه با افراد سالم و همسن و هم‌جنس آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به مقادیر P به دست آمده در این مطالعه اختلاف معنی‌داری از نظر هیچ یک از متغیرهای D, M, I, F نمی‌باشد. در طی یک سال پیگیری در گروه موواجهه هیچ

مقدار قطعه ترشحی در گروه موواجهه نسبت به گروه غیرموواجهه بیشتر بود و اختلاف معنی‌داری را نشان داد و این نکته نشان‌گر این مطلب است که عدم مصرف قطعه ترشحی در تشکیل SIgA منجر به عدم مصرف و افزایش مقدار قطعه ترشحی در بزاق این گروه از بیماران می‌شود. هر چند SIgM به صورت جبرانی افزایش می‌باید ولی این افزایش نمی‌تواند سبب مصرف تمام قطعه ترشحی تولید شده گردد؛ در ضمن نشان می‌دهد که همه بیماران ما قادر به سنتر قطعه ترشحی هستند و نقص تولید SIgA مربوط به نقص قطعه ترشحی نمی‌باشد؛ در ضمن افزایش قطعه ترشحی در بزاق می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای تشخیص نقص IgA مطرح گردد.

IgG بزاق در گروه موواجهه و غیرموواجهه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. این مسأله کاملاً قابل پیش‌بینی بود؛ چون منشأ تولید IgG در بزاق و سرم یکسان است و IgG موجود در بزاق در واقع همان IgG سرم است که از شیار لته‌ای وارد بزاق می‌گردد (۱۹)؛ هرچند پلاسماسل‌های موجود در مخاط دهان نیز IgG را تولید می‌کنند ولی چون این IgG قادر به ترشح نمی‌باشد، نمی‌تواند در غیاب SIgA در بزاق افزایش یابد (۱۸).

در جدول شماره ۴ تظاهرات دهانی افراد گروه موواجهه و غیرموواجهه نشان داده شده است. در طول یک سال پیگیری هیچ مورد آفت در گروه بیمار مشاهده نگردید؛ در حالی که در گروه غیرموواجهه سه مورد آفت مشاهده شد. این اختلاف بر اساس آزمون Fisher از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد؛ همچنین سه مورد هرپس دهان در گروه موواجهه در طی دوره پیگیری یک ساله مشاهده شد، در حالی که در گروه غیرموواجهه هیچ مورد هرپس مشاهده نگردید و این اختلاف نیز بر اساس آزمون Fisher از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. در طی یک سال پیگیری در گروه موواجهه هیچ

پریودنتال مشاهده نشده است (۲۰، ۲۱، ۲۲) و تنها نوتروپنی و سندروم‌های اختلال عملکرد نوتروفیل سبب زخم‌های دهانی می‌شوند و معمولاً نقايسن ایمونوگلوبولینی موجب این امر نمی‌گردد (۲۳). بیماران مورد مطالعه در این بررسی نیز فاقد ضایعات مخاطی دهان و افزایش پوسیدگی دندان و بیماری‌های پریودنتال در مقایسه با گروه غیرمواجهه بودند؛ بنابر نتایج این مطالعه، بیماران دارای نقص انتخابی IgA فاقد تظاهرات دهانی مشخصی برای شناسایی اولیه این بیماری می‌باشند و کمک کننده نیستند.

تشکر و قدردانی

در خاتمه لازم است از کارکنان محترم بخش‌های ایمونولوژی و دندانپزشکی بیمارستان مرکز طبی کودکان، بخش ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و بخش ایمونولوژی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر و قدردانی گردد.

این تحقیق با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است که بدين وسیله تشکر می‌گردد.

بین دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت؛ ولی در مورد پوسیدگی $P=0.7$ بود (میانگین پوسیدگی در افراد گروه مواجهه بیشتر از افراد گروه غیرمواجهه به دست آمد) که چون در این مطالعه تنها یازده نفر از بیماران دارای نقص IgA مورد بررسی قرار گرفتند، این اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد ولی احتمالاً اگر تعداد نمونه‌ها افزایش یابد، ممکن است این اختلاف معنی‌دار شود.

وضعیت پریودنشیوم نیز اختلاف معنی‌داری را بین دو گروه نشان نداد؛ ولی همان طور که گفته شد با توجه به این که تعداد افراد دارای نقص IgA، یازده نفر می‌باشد، شاید با افزایش تعداد نمونه این اختلاف معنی‌دار گردد.

از نظر وضعیت پلاک میکروبی نیز بین دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت؛ این مسأله می‌تواند بیشتر مربوط به چگونگی رعایت بهداشت دهان افراد مورد مطالعه باشد تا اثر حفاظتی SigA؛ زیرا به این بیماران آموزش بهداشت دهان و دندان داده شده بود؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌شود بیماران مبتلا به نقص انتخابی IgA با رعایت بهداشت دهان از تجمع زیاد پلاک میکروبی و عوارض ناشی از آن پیشگیری نمایند.

برخی مطالعات نشان داده‌اند که در بیماران با نقص ایمنی اولیه، افزایشی در پوسیدگی دندانی یا بیماری‌های منابع:

- 1- Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed. London: WB Saunders; 2000: 2414.
- 2- Stites DP, Terr AI. Basic & Clinical Immunology. 7th ed. Connecticut: Appleton & Lange; 1991: Chapter 27.
- 3- The Jeffrey Modell Foundation; (Research/ Knowledge) http://www.jmf.world.com/html/selective_IgA_deficiency.html.
- 4- Leggott PJ, Robertson PB, Greenspan D, Wara DW, Greenspan JS. Oral manifestation of primary and acquired immunodeficiency diseases in children. Pediatr Dent 1987 Jun; 9(2): 98-104.
- 5- Middleton JR. Allergy Principles and Practice. 5th ed. St Louis: Mosby; 1998: Vol: 2. Chapter: 53.
- 6- Mestecky WR, Russell MW, Jacksons Brown TA. The human IgA System: A reassessment. Clin Immunol Immunopathol 1986; 40: 105- 114.
- 7- Atlanta Allergy & Asthma Clinic. Immune deficiency foundation family handbook; 1997; <http://www.atlallergy.com/immunode.htm>.

- 8- Jones JH, Mason DK. *Oral Manifestations of Systemic Disease*. 3rd ed. London: WB Saunders; 1980: 131- 32.
- 9- Roitt I, Lehner T. *Immunology of Oral Diseases*. 2nd ed. London: Blackwell Scientific Publications; 1983; 388- 90.
- 10- Scully C, Cowson RA. *Medical Problem in Dentistry*. 3rd ed. London: Wright; 1993: 473-76.
- 11- Leggott DW. Oral features of immune disorders. *J Dent Res* 1986; 65 (spec, issue): 741 (Abstr; 138).
- 12- Porter SR, Scully C. Oral manifestations in primary immunodeficiencies involving IgA deficiency. *J Oral Pathol Med* March 1993; 22 (3): 117- 19.
- ۱۳- مقدس، حمید؛ دکتر موزه، محمد باقر، انساج پریودنشیوم در سلامت و بیماری. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد، ۱۳۷۲، فصل ۲۸.
- 14- Mc Donald RE, Avery DR. *Dentistry for the Child and Adolescent*. 7th ed. St. Louis: Mosby; 2000: Chapter: 11.
- 15- Lehner T, Cimasoni G. *The Borderland Between Caries and Periodontal Disease*. 2nd ed. London: Academic Press; 1980: 159- 73.
- 16- Adner PL. Studies on salivary IgA. *Sewed Dent J* 1974; 67: 349- 52.
- 17- Engström GN, Engström PE, Hammarström L, Smith CI. Oral conditions in individuals with selective IgA deficiency and common variable immunodeficiency. *J Periodontol* 1992; 63: 984- 89.
- 18- Brandtzaeg P, Fjellanger I. Regional specialization in the mucosal immune system: what happens in the microcompartment? . *Immunology Today* March 1999; 20 (3): 141- 51.
- ۱۹- لهر، توماس. ایمونولوژی بیماری‌های دهان. ترجمه کیهانی، عبدالحسین؛ فقهی شریعه. چاپ اول. تهران: مرکز نشر انتشارات، ۱۳۷۲، فصل ۲.
- 20- Brown LR. Comparison of the plaque microflora in immunodeficient and immunocompetent dental patients. *J Dent Res* 1979; 23: 44.
- 21- Robertson PB. Periodontal status of patients with abnormalities of the immune system. II. observations over a 2 year period. *J Periodontal* 1980; 51:70.
- 22- Tolo K. Periodontal disease mechanisms in immunocompromised patients. *J Clin Periodontol* 1991 Jul; 18(6): 431- 5.
- 23- Malcolm A. Burkets Oral Medicine Diagnosis and Treatment. 9th ed. London: JB Lippincott company; 1994: Chapter 18.