

بررسی شیوع شکستگی تاج دندانهای دائمی و عوامل وابسته به آن در دانش آموزان ۱۴-۷ ساله شهر تهران سال ۱۳۷۵

دکتر ژاله محمودیان* - دکتر علی کوثری** - دکتر الهام فقیه نصیری***

* دانشیار گروه آموزشی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

** استاد بار گروه آموزشی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

*** استاد بار گروه آموزشی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

Title: Evaluation the prevalence of permanent anterior crown fracture and its relevant between 7-14 years students in Tehran, year of 1375

Authors: Mahmodian J.* Associated professor, Kusari A.* Assistant professor, Faghikh-e-Nasiri E. Assistant professor **

Address: *Dept. of pediatric dentistry, Tehran university of Medical sciences & Health services

**Dept. of pediatric dentistry, Tabriz university of Medical sciences & Health services

Abstract: Anterior tooth crown fracture in children is something that each dentist will confront many times during his professional career.

We studied the prevalence of anterior teeth crown fractures between 7-14 years old students in Tehran and some relevant factors like sex, age, the traumatized tooth, amount of overbite and overjet, upper lip coverage, jaw that had fractured tooth or teeth and place of fracture in fractured crown.

1338 boys and 1184 girls were in this study. Tooth fracture was almost the same in boys and 1184 girls with the prevalence of 8%. Fracture was mostly in enamel and average year of fracture was 10 years.

Increased overjet and overbite had direct relation and indirect relation with fracture, also enough lip coverage showed less fracture.

Key words: Crown fracture- Permanent- Anterior.

چکیده

شکستگی تاج دندانهای دائمی کودکان به علل مختلف از جمله مواردی است که هر دندانپزشکی به دفعات با آن مواجه می‌گردد. این مطالعه درمورد شیوع شکستگی تاج دندانهای دائمی در دانش آموزان ۱۴-۷ ساله شهر تهران و عوامل وابسته به آن که عبارتند از جنس، سن، دندان صدمه دیده، فک و ناحیه مورد صدمه، میزان اوربایت (Overbite)، میزان اورجت (Overjet)، پوشش لب بالا و نوع شکستگی ساختمان تاج دندان انجام گرفت. در این مطالعه ۱۳۳۸ پسر و ۱۱۸۴ دختر شرکت داده شدند. عارضه فوق در بین پسران و دختران تقریباً یکسان و حدود ۸٪ بود. سن شایع شکستگی ۱۰ سالگی بود؛ شکستگی بیشتر در میانی دندان ایجاد شده بود. رابطه شکستگی با افزایش اورجت، مستقیم و با افزایش اوربایت و میزان بیشتر پوشش لب بطور معکوس مشاهده گردید.

کلید واژگان: شکستگیهای تاج- دندانهای دائمی- دندانهای دائمی

شایعترین انواع صدمات شکستگی تاج دندانهای دائمی آنها

می‌باشد، لذا این مطالعه (در سال ۱۳۷۵) به منظور بررسی شیوع شکستگی تاج دندانهای دائمی و عوامل وابسته به آن انجام گرفت. هدف از این مطالعه این بود که با آمارهای به

مقدمه و هدف

صدمات واردہ به سیستم دنتوآلتوئلار و عوارض ناشی از آن از جمله مسائلی که دندانپزشکان بخصوص متخصصین کودکان بکرات با آن مواجه می‌شوند و از آنجا که در کودکان

صدمات سیستم دندانی دائمی در طول ۱۴ سال بر روی ۲۶۲ بیمار با ۴۴۵ دندان صدمه دیده انجام شد، به این نتیجه رسیدند که صدمات دندانی تعداد ۱/۴۸ پسر مساوی با تعداد ۱ دختر بوده است. ۳۵٪ پسرها در سن ۱۰-۹ سالگی و ۲۳٪ از دختران در سن ۹ سالگی بیشترین میزان آسیب را داشته‌اند. ۸۰٪ دندانهای ضربه دیده ثنایای فک بالا بوده است و بطور کلی در ۷/۹۰٪ موارد، فک بالا درگیر بوده است(۵).

روش مطالعه

در این مطالعه که از نوع مقطعی (Cross sectional) بوده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای دو مرحله‌ای استفاده شد؛ بدین منظور فهرست کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران تهیه شد و بر اساس مناطق جغرافیایی تقسیم گردید؛ سپس در هر منطقه متناسب با تعداد مدارس، ۲۰ در مجموع ۳۲ مدرسه انتخاب شد که از این تعداد ۲۰ مدرسه ابتدایی و ۱۲ مدرسه راهنمایی بودند. از آنجا که میزان شیوع صدمات دندانی حداقل ۴٪ ذکر شده است لذا چهت دستیابی به یک برآورد فاصله‌ای برای نسبت شیوع شکستگی با ضریب ۹۹٪ و با حداقل خطایی به اندازه ۱٪، نمونه‌ای با حجم ۲۵۲۲ نفر (۱۱۸۴ دختر و ۱۳۳۸ پسر) بصورت تصادفی انتخاب گردید.

نحوه معاینه

پس از تهیه پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات لازم، به مسؤولین بهداشت مدارس مراجعه و ضمن ارائه توضیحات کافی، هماهنگیهای لازم انجام شد. دندانهای کودکان در اتاق بهداشت مدارس با استفاده از آبسلانگ چوبی، سوند، خطکش میلی‌متری (اندو) با نور معمولی اتاق در مجاورت پنجره مورد معاینه قرار گرفت و پرسشنامه تکمیل می‌گردید.

اطلاعات مربوط به پرسشنامه مشخص کننده موارد ذیل بوده است:

سن - جنس - نوع دندانهای مورد ترااما و ناحیه فک - سن آسیب دیدگی - نوع شکستگی (مینا، عاج و ...)- میزان اوربایت و اورجت- میزان پوشش لب

دست آمده و مقایسه با جوامع مختلف بتوانیم علل به وجود آورنده و عوارض حاصل از آن را در جامعه تعیین شده، بررسی نماییم تا راهکارهایی در جهت کاهش این عوارض پیشنهاد گردد و با آگاهیهای لازم که در این زمینه به والدین و مردمان آموزش ارائه می‌گردد، بتوانیم کمکی به حل یکی از مشکلات جامعه خود بنماییم.

لازم به ذکر است انتخاب سن یادشده با توجه به معیارهای پذیرفته شده سازمان بهداشت جهانی، زمان رویش و تکامل دندانهای قدامی و وضعیت روحی - روانی کودکان می‌باشد.

بررسی مقالات

شیوع صدماتی که در اثر ضربه به سیستم دندانی وارد می‌شود، توسط محققین مختلفی مورد بررسی واقع شده است. در مطالعه‌ای که توسط آقایان Marcus (در سال ۱۹۵۱) و Grundy (در سال ۱۹۵۹) انجام گرفت، میزان شیوع صدمات دندانی ۴-۲۵٪ گزارش شد.

در مطالعه آقای Andreasen در سال ۱۹۷۲ میزان شیوع صدمات دندانی در میان کودکان جوامع آسیایی و اروپایی ۴-۱۴٪ گزارش شد؛ در ضمن ایشان معتقدند که ۵۰٪ کودکان قبل از اتمام مدرسه آسیبهای دندانی دارند(۱).

آقایان Ravin و Andreasen طی مطالعه‌ای بر روی کودکان دانمارکی در سال ۱۹۷۲ گزارش کردند که ۳۰٪ از کودکان موردمطالعه دچار صدمه به دندانهای شیری و ۲۲٪ دچار صدمه به دندانهای دائمی شده اند(۲).

آقایان Crona، Larson و Norenj.G (۳) در سال ۱۹۸۹ طی مطالعه‌ای به این نتایج دست یافتند که دندانهای ثنایای فک بالا ۷۰٪ از کلیه دندانهای آسیب دیده را تشکیل می‌دهد و ۷۰٪ دندانهای آسیب دیده، به کودکان گروه سنی ۸-۱۲ سال تعلق دارد؛ در ضمن بیشترین موارد علل ضربه را زمین خوردن به هنگام بازی کردن(۰.۳۴٪)، دوچرخه سواری (۰.۳۰٪)، ورزش (۱۴٪) و زدو خورد (۱۳٪) تشکیل می‌دهند(۴).

آقایان Marechaux Kaba Aysin Darendeliler در مطالعات خود که در سالهای ۱۹۷۴-۱۹۸۸ بر روی

نتایج

با افزایش اورجت، میزان شیوع شکستگی تاج دندان افزایش داشته و با ازدیاد اوربایت میزان شکستگی تاج دندان کاهش داشته است؛ بنابراین شیوع شکستگی تاج دندان با افزایش اورجت نسبت مستقیم و با افزایش اوربایت نسبت معکوس دارد.

نتیجه دیگری که از این مطالعه به دست آمد این است که پوشش ناکافی لب بالا سبب افزایش میزان شکستگی تاج دندانهای قدامی می‌شود. بیشترین خدمات باعث شکستگی یک دندان و بیشترین نوع شکستگی تاج دندان قدامی، شکستگی مینا می‌باشد.

نتایج به دست آمده در قالب جدولهای شماره ۸-۱ نیز ارائه شده است.

در مجموع از میان ۲۵۲۲ نفر کودک مورد معاينه (۱۱۸۴ دختر و ۱۳۳۸ پسر)، ۲۰۸ نفر (۹۵ دختر و ۱۱۳ پسر) دچار شکستگی تاج دندانهای قدامی شده بودند که در واقع در جامعه مورد مطالعه شیوع شکستگی تاج دندانهای قدامی ۸٪ بوده است.

شیوع عارضه فوق بین دختران و پسران تفاوت معنی داری نداشت و سن شایع شکستگی تاج دندانهای قدامی در نمونه مورد مطالعه ۱۰ سالگی بود. شکستگی تاج دندانهای قدامی دائمی بیشتر در فک بالا رخ داده و بیشترین دندان درگیر دندان سانترال راست بالا بوده است.

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی مطلق و درصد افراد مورد مطالعه بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی مختلف

جمع		پسر		دختر		منطقه جغرافیایی	جنس
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی		
۲۰/۴۹	۵۱۷	۱۸/۸۳	۲۵۲	۲۲/۳۸	۲۶۵	شمال	
۱۵/۰۲	۳۷۹	۱۵/۶۹	۲۱۰	۱۴/۲۷	۱۶۹	مرکز	
۱۵/۹	۴۰۱	۱۶/۰۶	۲۱۵	۱۵/۷	۱۸۶	شرق	
۲۲/۷۱	۵۹۸	۲۵/۰۳	۳۳۵	۲۲/۲۱	۲۶۳	غرب	
۲۴/۸۶	۶۲۷	۲۴/۳۶	۳۲۶	۲۵/۴۲	۳۰۱	جنوب	
۱۰۰	۲۵۲۲	۱۰۰	۱۳۳۸	۱۰۰	۱۱۸۴	جمع	

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی شکستگی تاج دندانهای قدامی در جامعه مورد مطالعه بر حسب جنس

جمع		پسر		دختر		وضعیت دندان	جنس
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی		
۸/۲۳	۲۰۸	۸/۴۴	۱۱۳	۸/۰۲	۹۵	شکسته	
۹۱/۷۶	۲۲۱۴	۹۱/۵۵	۱۲۲۵	۹۱/۹۸	۱۰۸۹	سالم	
۱۰۰	۲۵۲۲	۱۰۰	۱۳۳۸	۱۰۰	۱۱۸۴	جمع	

جدول شماره ۳ - بررسی توزیع فراوانی شیوع شکستگی بر حسب سن آسیب‌دیدگی، به تفکیک جنس

پسر		دختر		جنس	سن آسیب‌دیدگی
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی		
۵/۷۶	۶	۱۲/۲	۱۱		۷ سالگی
۸/۶۵	۹	۸/۸	۸		۸ سالگی
۲۲/۰۷	۲۴	۱۸/۸	۱۷		۹ سالگی
۳۶/۶	۳۶	۲۱/۱	۱۹		۱۰ سالگی
۱۵/۳۸	۱۶	۱۶/۶	۱۵		۱۱ سالگی
۶/۷۳	۷	۱۱/۱	۱۰		۱۲ سالگی
۵/۷۶	۶	۱۱/۱	۱۰		۱۳ سالگی
.	.	.	.		۱۴ سالگی

جدول شماره ۷ - توزیع فراوانی تأمی شیوع شکستگی و اورجت‌های مختلف در جامعه مورد مطالعه

بدون شکستگی درصد	با شکستگی		افراد موردمعاينة میزان اورجت	
	فراوانی	درصد		
۹۱/۴۲	۲۲	۸/۵۷	۳	زیر صفر
۹۱/۰۱	۱۷۳۰	۸/۹۹	۱۷۱	۳-۰
۸۹/۰۵	۱۹۵	۱۰/۹۵	۲۴	۶-۳/۱
۶۴/۲۹	۱۸	۳۵/۷۱	۱۰	بزرگتر از ۶

جدول شماره ۸ - توزیع فراوانی تأمی شیوع شکستگی و اورجایت‌های مختلف در جامعه مورد مطالعه

بدون شکستگی درصد	با شکستگی		افراد موردمعاينة میزان اورجایت	
	فراوانی	درصد		
۶۴/۲۹	۱۸	۳۵/۷	۱۰	زیر صفر
۹۰/۷۹	۱۶۶۵	۹/۲۱	۱۶۹	۳-۰
۹۰/۸۵	۲۷۸	۹/۱۵	۲۸	۶-۳/۱
۹۳/۳۶	۱۴	۶/۶۶	۱	بزرگتر از ۶

جدول شماره ۴ - توزیع فراوانی ناحیه‌ای از فک که دندان شکسته در آن قرار دارد.

محل شکستگی	درصد	فراوانی
نیم فک بالا چپ	۵۰	۱۱۷
نیم فک بالا راست	۴۰/۵	۹۵
نیم فک پایین چپ	۵/۵	۱۳
نیم فک پایین راست	۳/۸۴	۹
جمع	۱۰۰	۲۳۴

جدول شماره ۵ - توزیع فراوانی نوع شکستگی دندانها در جامعه مورد مطالعه

نوع شکستگی	درصد	فراوانی
شکستگی مینا	۵۷/۰۱	۱۲۶
شکستگی مینا و عاج	۳۶/۶۵	۸۱
شکستگی مینا و عاج با اکسپوژر	۴/۵۲	۱۰
شکستگی کامل دندان	۱/۸۰	۴
جمع	۱۰۰	۲۲۱

در تجزیه و تحلیل یافته‌های به دست آمده از این مطالعه ملاحظه می‌شود که از نظر شیوع شکستگی تاج دندانهای قدامی در بین دختران و پسران اختلاف معنی‌داری وجود ندارد و تا حدودی می‌توان اذعان نمود که دختران و پسران به یک میزان دچار شکستگی دندانی بوده‌اند (P<0.05) که این نتیجه برخلاف مطالعات آقایان Sabine, Kaba,(۱) Andreasen, (۲) Crona-Larson

جدول شماره ۶ - توزیع فراوانی نوع دندان شکسته در جامعه مورد مطالعه

نوع دندان شکسته	درصد	فراوانی
سانترال	۹۰/۵۹	۲۱۲
لاترال	۸/۹۷	۲۱
کانین	۰/۴۴	۱
جمع	۱۰۰	۲۳۴

درنتیجه میزان شکستگی کمتر خواهد شد. در این مطالعه شکستگی مینای دندان درصد بیشتری نسبت به سایر انواع شکستگی تاج (مینا و عاج- مینا و عاج و پالپ- کامل تاج) دارد که با مطالعات آقای Andreasen در سال ۱۹۷۲ (۲) و Gutz در سال ۱۹۷۱ و Seppojarivner در سال ۱۹۷۷ (۴) مطابقت دارد؛ یعنی هرچه عمق شکستگی کمتر باشد، درصد تعداد شکستگی بیشتر می‌شود.

پیشنهادات

براساس یافته‌های این پژوهش پیشنهادات زیر مطرح می‌گردد:

۱) بالابردن سطح آگاهی والدین از طریق وسائل ارتباط جمعی به منظور راهنمایی در درمان این گونه دندانهای آسیب‌دیده و راههای پیشگیری از بروز صدمات وارده

۲) ارائه آگاهی‌های لازم به مردمان بهداشت مدارس جهت جلوگیری از بروز صدمات وارده و توجه به استفاده از محافظه‌های دهانی در مدرسه در ساعتهاي ورزش دانش‌آموزان (بخصوص در دانش آموزان مستعد)

۳) کودکان با اورجت بالا و اوربایت کم هرچه سریعتر تحت مشاوره و درمانهای ارتدنسی قرار گیرند؛ چرا که ضمن درمان ارتدنسی وضعیت پوششی لب بالا هم تا حدی متعادل خواهد گردید و بدین ترتیب شیوع شکستگی تاج دندانهای قدامی کمتر خواهد شد.

(۵) است که معتقدند پسرها بیشتر از دخترها دچار صدمات دندانی می‌شوند؛ توضیح این که به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکترشدن شرایط زندگی دختران و پسران و استفاده از ورزشهایی با کاربرد امکانات محافظتی بیشتر، این نتیجه طبیعی می‌باشد.

سن شایع شکستگی تاج دندانهای قدامی در جامعه مورد مطالعه ما ۱۰ سالگی بوده است که در مطالعات آقای Seppojarviner مطالعه آقای Kaba در سالهای ۱۹۷۴- ۱۹۸۸ سالین ۱۰-۹ سال بوده است که نزدیک به نتایج به دست آمده در مطالعه ما می‌باشد (۵).

در رابطه با شیوع عارضه در نواحی فکی به این نتیجه رسیدیم که شکستگی دندانی در فک بالا در حدود ۱۰ برابر فک پایین می‌باشد و کلیه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته نشان دهنده بالاتر بودن شیوع صدمات در فک بالا نسبت به فک پایین می‌باشد که این نتیجه به دلیل پوشش دندانهای قدامی فک پایین توسط دندانهای فک بالا و آناتومی خاص دندانهای قدامی بالا بخصوص قبل از پیدا شدن کن tact مزید دستالی مناسب می‌باشد.

پوشش کافی لب بالا باعث می‌شود که میزان شکستگی دندانهای قدامی کمتر شود که این مطلب در این مطالعه گویاست. بالا بودن میزان اورجت، شکستگی را افزایش می‌دهد که به دلیل عدم محافظت کافی دندانهای قدامی به وسیله لب می‌باشد؛ در نتیجه دندان در مقابل ضربه آسیب‌پذیری بیشتری دارد؛ در صورتی که اوربایت بیشتر شود، لب به راحتی دندانهای قدامی را محافظت کرده.

منابع:

- 1- Andreasen JO, Andreasen FM. Traumatic injuries to the teeth. 3rd ed. Munksgaard: Copenhagen 1994; 151-180, 195-250
- 2- Andreasen Jo, Ravin J. Epidemiology of traumatic dental injuries to primary & permanent teeth in a Danish population sample. Int J of oral Surg 1972; 1: 235-239.
- 3- Conallsen G, Norenj G. Luxation injuries to permanent teeth. A retrospective study of etiological factors. Endod Dent Traumatol 1989; 5:170-179.
- 4- Jarvient S. Incisal overjets and traumatic injuries to upper permanent incisor: a retrospective study. Acta Odontal Scand 1997; 36: 359-362.
- 5- Kaba & Sabine. A fourteen years follow up study of traumatic injuries to the permanent dentition. J of Dentistry for children 1989; Nov, Dec.