

بررسی اثر Tug - Back بر سیل آپیکال بصورت Invitro

* دکتر احمد صادقین

** دکتر فرهاد فرهادیان

چکیده

در باره لزوم وجود Tug Back (T.B) در هنگام پرکردن کanal ریشه دندان بین متخصصان رشته اندودنتیکس اتفاق نظر وجود ندارد. بدین منظور ۴۴ دندان تک ریشه مستقیم با آپیکس بسته انتخاب شده و همگی تا شماره ۵۰ فایلینگ شدند. دندانها به دو گروه تقسیم شده و یک گروه با وجود T.B و گروه دیگر بدون وجود T.B بروش تراکم جانبی پوشیدند. میزان نشت آپیکال با استفاده از نفوذ رنگ و زیرمیکروسکپ بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد که متوسط نفوذ رنگ در گروه واحد T.B بطور معنی داری کمتر از گروه فاقد T.B می باشد. بنابراین بین دو متغیر نفوذ رنگ و وجود T.B همبستگی وجود دارد. البته با بررسی های آماری میزان این همبستگی بسیار ضعیف نشان داده شد.

با اندازه گیری مقدار نفوذ MC و مقایسه آن با طول آمده شده کanal مشخص می نماید.

مقدمه

Radiographic Examination
این آزمون برای ارزیابی طول نفوذ MC و مقایسه آن با طول کارکرد و همچنین تطابق جانبی آن با دیواره های کanal ریشه بکار می رود.

Aزمون احساسی یا (Examination)
این آزمون هم می تواند تطابق جانبی MC را با کanal بصورت مقاومت در برابر برداشته شدن Cone از داخل کanal نشان دهد که این ناشی از تماس بین MC و جدار کanal می باشد و در مقالات اندودنتیکس از آن بعنوان Tug Back(T.B) نام برده می شود. بنابراین (T.B) یعنی مقاومت MC در برابر برداشته شدن از داخل کanal که بواسطه تطابق آن با جدار کanal در کل محیط آن و در حالت ایده آل در

قطع ارتباط داخل کanal ریشه دندان با نسوج پری آپیکال یکی از مواردی است که بر موفقیت طولانی مدت درمان موثر است. بطوریکه از نتایج Washington Study روشن می شود، اکثر شکست های اندودنتیک ناشی از ریز نشت مایعات بافتی نسوج پری آپیکال به فضای مهر و موم نشده داخل کanal ریشه و یا عبور مواد محرك از داخل کanal ریشه دندان به فضای ناحیه پری آپیکال می باشد. روش های مختلفی برای پرکردن کanal ریشه وجود دارد در بیشتر روش ها از یک کن بزرگ گوتاپرکا بمنظور پر کردن قسمت اعظم کanal کمک گرفته می شود که کن اصلی یا Master Cone (MC) نامیده می شود. در تمام این روشها بطور عموم و در روش تراکم جانبی بطور اخص، تطابق کن اصلی (MC) با جدار کanal یکی از مهمترین عوامل موثر بر بهبد سیل آپیکال کanal است.^{۱۱} این تطابق از چند جهت می تواند مد نظر قرار گیرد. آزمون چشمی، آزمون رادیوگرافیک و بالاخره آزمون احساسی.

آزمون چشمی یا Visual Examination

این آزمون فاصله نوک MC را تا انتهای کanal آمده شده

۱۱ استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
** دندانپزشک


۲- در جهت عرضی که قطع کanal بشکل گرد نباشد بطوریکه T.B از دو دیواره مقابل نزدیک تر به حاصل شود. با توجه به وجود T.B کاذب و همچنین عدم امکان تشخیص کاذب و یا واقعی بودن T.B در هنگام پر کردن کanal، تاثیر T.B بر Apical Seal مشخص نیست و بررسی مقالات نیز تحقیقات زیادی را در مورد اثر T.B بر کیفیت Apical Seal نشان نمی دهد. تحقیق حاضر برای بررسی اثر T.B بر کیفیت Apical Seal در دندانهای کشیده شده طراحی شده است تا شاید بتواند پاسخگوی بخشی از مسئله فوق باشد.

بخش ^۱ آپیکال کanal ریشه بوجود می آید.


T.B ناشی از اصطکاک MC با جدار کanal در جایی غیر از بخش آپیکال یا تنها بین دو دیواره مقابل از محیط آن، (T.B) حقیقتی نبوده و از آن تحت عنوان T.B کاذب و یا False T.B نام برده می شود (شکل ۱).

T.B کاذب خود بر دو نوع است.

۱- در جهت طولی که تنها در ناحیه ای کرونالی تر از تنگه آپیکال بدست آید و انتهای MC قادر تطابق کامل با جدار کanal باشد.



شکل ۱



شکل ۲

مثبت از کن‌های جانبی و اسپرید استفاده نشد. انتهای کرونالی کanal دندانهای گروه کنترل مثبت همچون گروه کنترل منفی مسدود شد.

بقیه دندانها هم بطور تصادفی به دو گروه واحد و فاقد T.B تقسیم شدند، بطوریکه بیست دندان در گروه فاقد T.B قرار گرفتند و نوزده دندان نیز بطور تصادفی در گروه واحد T.B. برای هر یک از دندانهای گروه فاقد T.B ، یک (MGPC) (Herpo -Brazil) Master Gutta Percha Cone طوری انتخاب شد که قطورترین کن گوتاپرکا باشد که تمام طول آماده شده کanal را شامل شده و در ضمن مقاومتی هم در برابر برداشته شدن از داخل کanal از خود نشان ندهد. برای هر یک از دندانهای گروه واحد T.B یک MGPC طوری انتخاب شد که قطورترین کن گوتاپرکا باشد که طول آماده شده کanal را شامل شده و در ضمن هم داشته باشد. سپس از دو جهت باکولینگوال و مزیودیستال تمام دندانها دو رادیوگراف تهیه شد.

در معالجات روت کanal در هنگام انتخاب MC مناسب جهت پرکردن کanal گاهی لازم می‌شود که نوک کن گوتاپرکا قطع شود، در این مطالعه نیز جهت بدست اوردن MC مناسب در صورت لزوم از انتهای گوتاپرکاها مقداری قطع می‌شد و بدین ترتیب متغیری بنام (T.C) Tip Cut مطرح می‌شود. با تصور اینکه این متغیر احتمالاً بتواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر قرار دهد، مواردی که این عمل انجام می‌گرفت ثبت می‌شد و در این موارد دندان مزبور با TC^+ نشان دار می‌شد و در سایر موارد که کن دست نخورده گوتاپرکا برای کanal مناسب تشخیص داده می‌شد بصورت TC^- طبقه‌بندی می‌شدند.

در این مرحله از آزمایش نیروی T.B توسط یک نیروسنجد (Correx - Swisse) که قادر به اندازه گیری نیرو در حد صدم نیوتون است، در دندانهای واحد T.B اندازه گیری شد. چنانچه نیروی T.B برای دندانی حداکثر ۲۵ صدم نیوتون بود، آن

روشها و مواد Materials & Methods

جهت این مطالعه تعداد ۴۴ دندان تک کanal تازه کشیده شده انسان (سانترال بالا، کانین بالا و پایین، پرمولر اول پایین و پره مولر دوم بالا) که هر کدام دلای ریشه‌ای بدون ترک و پوسیدگی و آپکسی بسته و سالم بود انتخاب و در محلول فرمالین ۱۰٪ جمع‌آوری شدند.

همه دندانها بمدت یک روز در محلول هیپوکلریت سدیم ۲/۵٪ قرار داده شدند که پس از آن جرم و بقایای بافت نرم بوسیله تیغه بیستوری از سطح دندانها پاک شد. پس از قطع تاج آناتومیک دندانها توسط توربین و فرز فیشورالماسی، طول کارکرد ریشه‌ها معادل ۵/۰ الی ۱ میلیمتر کوتاهتر از طول کanal ریشه تعیین و کanalها بروش Step - Back آماده شدند. (پس از دیدن فایل شماره ۱۵ در ناحیه آپکس ۵/۰ الی ۱ میلیمتر از طول آن کم کرده و عنوان طول کارکرد مورد استفاده قرار گرفت). برای همه دندانها فایلینگ تا شماره ۵۰ (MAF) و فلرینگ تا شماره ۸۰ همراه با Recapitulation انجام پذیرفت. قبل از شستشوی نهایی کanal جهت انجام Patency Confirmation (اطمینان از باز بودن آپکس دندان) نوک فایل K-Type شماره ۱۵ به اندازه ۲ میلیمتر از سوراخ انتهایی ریشه (آپیکال فورامن) عبور داده شد.

بعد اشکالات تکنیکی یکی از دندانها از مطالعه حذف شد. سپس دو دندان عنوان کنترل مثبت و دو دندان نیز عنوان کنترل منفی بطور تصادفی در نظر گرفته شدند. انتهای کرونال کanal دندانهای گروه کنترل منفی توسط خمیر پاسمن (Dorident, Austria) به ضخامت حدود ۳ میلیمتر مسدود شد و کanal آنها پر نشده باقی ماند.

برای یکی از دو دندان گروه کنترل مثبت یک MC طوری انتخاب شد که واحد Back - Tug باشد ولی MC انتخاب شده برای دندان دیگر این گروه فاقد Back - Tug بود. سپس شده و در کanal دندان قرار گرفت. در دندانهای گروه کنترل

سپس دندان‌ها با آب جاری بمدت ۱ دقیقه شستشو شدند و با استفاده از تیغه بیستوری رنگ آبی متیلن بلو و رنگ قرمز لاک از سطح دندانها پاک شد. سپس مقطع طولی از دندانها توسط دو نیمه کردن آنها بکمک چیزی بدست آمد. بطوريکه هر دندان به دو نیمه باکال و لینگوال تقسیم شد. میزان نفوذ رنگ بوسیله دو مشاهده‌گر بطور جداگانه توسط (Heerbrugg, Switzerland) Stereomicroscope بر حسب میلیمتر و با دقت دهم میلیمتر اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از دو گروه مورد آزمایش، توسط کامپیوتر و با استفاده از تست‌های زیر مورد ارزیابی آماری قرار گرفت:

- Kruskal - Wallis One way of ANOVA
- Mann whitney or Wilcoxon Two - Sample test
- Partial Correlation Coefficients.

نتایج Results

بررسی دندانهای گروه کنترل منفی هیچ‌گونه نفوذ رنگ را در این دندانها نشان نمی‌داد. از دندانهای گروه کنترل مشیت آنکه قادر T.B بود، رنگ در کanal آن بطور کامل نفوذ کرده بود ولی نشت رنگ کمتری در کanal دیگر دندان گروه کنترل مشیت که واحد T.B بود مشاهده شد یعنی در حدود $\frac{2}{3}$ طول کanal).

شاخص‌های مرکزی و پراکنده‌گی نفوذ رنگ در گروه‌های مورد مطالعه و زیر گروه‌های مربوطه در جدول شماره ۱ آورده شده است.

دندان در زیر گروه t.b⁺ یا t.b⁺⁺ ضعیف و در غیر این صورت (اگر نیروی T.B بیش از ۲۵ صدم نیوتن بود) در زیر گروه t.b⁺ یا t.b⁺⁺ قوی قرار می‌گرفت. بدین ترتیب این گروه (واجد t.b⁺) خود به دو زیر گروه t.b⁺ ضعیف (شامل ۱۰ دندان) و t.b⁺⁺ (شامل ۹ دندان) تقسیم شد، سپس هر ۳۹ دندان مورد آزمایش بروش تراکم جانی با استفاده از کن‌های فرعی گوتاپرکا (شماره‌های ۱۵ و ۲۰) و سیلر ZOE بکمک اسپریدرهای شماره B (Maillefer - Suiss) پر شدند. سپس از هر دندان یک رادیوگراف در جهت باکولینگوال تهیه شد. پس از قطع اضافات گوتاپرکا، انتهای کرونال کanal همه این دندانها توسط خمیر پانسمان همانند گروه‌های کنترل مسدود شد.

پس از آن همه دندانها بمدت دو روز در محیط مرطوب در دمای اطاق قرار داده شدند. سپس سطح همه دندانها بجز در ناحیه سوراخ انتهایی با دو لایه لاک ناخن پوشیده شد تا نشت رنگ بداخل کanal تنها از طریق سوراخ انتهایی امکان‌پذیر باشد. البته در مورد دندانهای گروه کنترل منفی سوراخ انتهایی ریشه (AF) نیز با لاک پوشانده شد. پس از خشک شدن لاک سطح ریشه دندانها، همه نمونه‌ها بمدت ۴۸ ساعت در ظرف حاوی ماده رنگی متیلن بلو ۲ درصد (2% Aqueous Methylene Blue Dye) قرار داده شدند. ارتفاع محلول رنگ در ظرف حدود ۳ سانتیمتر و برای همه دندانها یکسان بود تا فشار هیدرواستاتیک محلول که ممکن است نشت را تغییر دهد برای همه نمونه‌ها به یک اندازه باشد.

جدول ۱ - نفوذ رنگ در گروه‌های مورد آزمایش و شاخص‌های مرکزی و پراکنده‌گی آنها

Groups	No	Min	Max	Median	Mean	Std. Dev.
Without T.B or T.B ⁻	۲۰	۱/۷	۵/۰	۲/۲۰	۲/۱۹۷	۱/۰۰۷
With T.B or T.B ⁺	۱۹	۱/۲	۵/۲	۲/۱۵	۲/۵۵۸	۱/۱۱۲
Subgroup t.b ⁺	۱۰	۱/۲	۴/۴	۲/۳۲۵	۲/۶۳۰	۱/۰۷۴
Subgroup t.b ⁺⁺	۹	۱/۴۵	۵/۲	۲/۰۵	۲/۴۷۸	۲/۲۳۲

کanal سالهاست که یکی از موارد مورد بحث در زمینه پرکردگی کanal ریشه دندان است. بعضی از محققین چون Metzger و همکارانش^[۱۲] و Mumford^[۱۳] وجود T.B را در کیفیت سیل آپیکال موثر و الزامی دانسته در حالیکه پارهایی دیگر چون Allison^[۱۴] و همکاران Allison^[۱۵] T.B را بی تأثیر می دانند. دکتر Allison و همکارانش نشان دادند که میزان نشت آپیکال با تطابق رادیوگرافیک MC با جداره کanal ارتباطی ندارد در مطالعه این محققین میزان طول ورود اسپریدر به داخل کanal ریشه مهمترین عامل موثر بر سیل آپیکال عنوان شده است. همانطور که گفته شد منظور از T.B همان مقاومتی است که در زمان بیرون آوردن MC از داخل کanal ریشه دندان احساس می شود که این مقاومت در حقیقت همان نیروی اصطکاکی است که بین MC و جدار کanal وجود دارد.

اصطکاک بر دو نوع است.

الف: استاتیک Static ب: کینتیک Kinetic^[۱۶]

Static Friction از نوع Tug Back یا نوع ثابت است که عوامل موثر بر آن همان عوامل موثر بر اصطکاک می باشند که عبارتند از:

۱ - نیرویی که M.C را بر جدار کanal می فشارد و سطوح آن دو را در کنار هم قرار می دهد.

۲ - طبیعت سطوح تماس (که شامل مخروط گوتاپرکا و سطح دیواره ریشه می باشد).

۳ - وسعت سطوح تماس

نظر به عوامل مختلفی که بر روی T.B موثر بوده و می توانند موجب این اصطکاک و یا مقاومت کاذب در داخل کanal شده و همچنین محدود بودن مطالعات در این زمینه، مطالعه اخیر طرح ریزی گردید.

در این مطالعه دندانهایی با کanal های مستقیم و نسبتاً قطور انتخاب شدند و طول کارکرد (Working Length) آنها بین نیم تا یک میلیمتر کوتاهتر از طول کanal در نظر گرفته شد و MC انتخاب شده نیز قطورترین گوتاپرکا بود که حداقل تا

نتایج بدست آمده از تست آماری Kruskal - Wallis One - Way of ANOVA بین سه گروه T.B⁻ ، t.b⁺ و t.b⁺⁺ نشان می دهد که با این حجم نمونه، در میانگین های نفوذ رنگ این سه گروه از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد ($P = ۰/۱۱۹$). از طرفی با یک نگاه کلی به میانگین های نفوذ رنگ این سه گروه، می توان به یک روند افزایشی Rising trend در میانگین نفوذ رنگ به ترتیب در گروه های T.B⁻ ، t.b⁺ ، t.b⁺⁺ برداشته شد. خود بر وجود یک همبستگی منفی بین F (نیروی Mann DP (میزان نفوذ رنگ) دلالت دارد. با استفاده از Whitney or Wilcoxon Two - Sample Test گروه واحد و فاقد T.B ، مشخص می شود که اختلاف معنی داری در میانگین نفوذ رنگ وجود دارد ($P = ۰/۰۴۷$) یعنی T.B بر مقدار نفوذ رنگ متبلن بلو موثر است به عبارت دیگر در نشت انتهایی Apical Leakage نقش دارد. برای تعیین مقدار این تأثیر لازم است که ضریب همبستگی بین دو متغیر DP و F محاسبه شود. با استفاده از Partial Correlation Coefficient همبستگی منفی ضعیفی بین T.B و DP وجود دارد بطوریکه ضریب همبستگی $r = ۰/۲۵۸$ است، یعنی در حضور T.B نشت رنگ از AF بداخل کanal بمقدار بسیار کمی کاهش می یابد، پس Apical Seal کمی بهبود پیدا می کند. همچنین با انجام Mann Whitney or Wilcoxon Two - Sample Test شد که میانگین های نفوذ رنگ بین این دو گروه اختلاف قابل ملاحظه ای با هم ندارند ($P = ۰/۰۵۹$) پس قطع شدگی نوک MC یا دست نخورده بودن آن نمی تواند تأثیری بر میزان نشت رنگ داشته باشد.

Discussion

بحث Tug Back و تأثیر وجود آن بر بهبود کیفیت پرکردگی

قابل اندازه‌گیری است و ضمناً کارآیی آن در مطالعات مختلف تائید گردیده است.^[۸] در این مطالعه از این روش استفاده شده است. با این وجود اهمیت کلینیکی مقادیر مطلق نشست هنوز مشخص نشده است.^[۹]

به عبارت دیگر به علت اختلاف زیاد بین اندازه باکتری و یا اندوتوكسین و یونهای رنگ، حتی اگر رنگ نیز بتواند در کanal ریشه دندان نفوذ کند، پرکردن آپیکال ریشه ممکن است موقیعت‌آمیز باشد.^[۱۰]

استفاده از دو مشاهده‌گر جهت بررسی و تعیین میزان نشست در این مطالعه کمک می‌کند تا اشتباهات احتمالی کمتر شده و نتایج بدست آمده از اعتبار بیشتری برخوردار باشند. ضمناً از تست‌های مختلف آماری جهت تفسیر نتایج بدست آمده استفاده شده است تا اولاً ارتباط بین عوامل مشخص شده و ثانیاً میزان این ارتباط نیز تعیین گردد.

Kruskal - Wallis One - way of ANOVA چون در مواردی که داده‌ها در گروه‌های مورد مطالعه دارای توزین نرمالی نباشند نیز مفید است، از آن برای آنالیز آماری داده‌ها استفاده شد. آنالیز Mann - Whitney استفاده شد. همان تست قبلی است متنه برای دو گروه کاربرد دارد. در بررسی‌های انجام شده گروه کنترل منفی نشان داده رنگ از لایه پوشاننده سطح ریشه (دولایه لاک ناخن) عبور نکرده است و رنگ تنها از جایی می‌توانست به داخل کanal نفوذ یافته باشد که لاک ناخن سطح ریشه را نپوشاند. نتایج گروه کنترل مثبت نیز نشان داد که نفوذ رنگ بداخل کanal ریشه از طریق AF، براحتی امکان‌پذیر بود و تنها پرکردن آپیکال ریشه می‌توانست بر مقدار نشست موثر باشد.

Kruskal - Wallis همانطوریکه پیشتر نیز بیان گردید، انجام آنالیز Between سه گروه T.B⁻, T.B⁺ و t.b⁺⁺ اختلاف‌معنی‌داری را بین میانگین‌های نفوذ رنگ در این سه گروه نشان نداد (P = .۰۱۹). در حالیکه با انجام آنالیز Mann - whitney بین دو گروه واحد و فاقد T.B، به اختلاف معنی‌داری از نظر

نیم میلیمتری انتهای کanal آماده شده وارد می‌شد. اسپریدر هم تا یک میلیمتری انتهای کanal آماده شده همه دندانها وارد شد تا از این نظر (عمق ورود اسپریدر بداخل کanal) اختلافی بین نمونه‌های مورد مطالعه وجود نداشته باشد، چرا که به عقیده Allison و همکارانش^[۱۱] عمق ورود اسپریدر بداخل کanal مهمترین عامل موثر بر بقیه کیفیت سیل آپیکال می‌باشد.

Tug Back تا حال در کلیه مطالعات انجام شده در زمینه Tactile وجود و میزان T.B براساس احساس عملکننده (Scense استوار بوده است. در این مطالعه برای اولین بار از یک دستگاه نیروسنجه بسیار حساس که قادر به اندازه‌گیری نیرو در حد صدم نیوتون بود استفاده گردید. استفاده از این دستگاه به عملکننده این امکان را می‌دهد که نه تنها وجود T.B را تائید کند بلکه می‌تواند میزان کمی آنرا نیز جهت مقایسه‌های بعدی درجه‌بندی و ارزیابی نماید (T.B قوی و T.B ضعیف).

در مطالعات مختلف میل آپیکالی روشنی برای تعیین نشست بصورت Invivo وجود ندارد ولی روش‌های متعددی برای ارزیابی نشست آپیکال کanal ریشه دندان بصورت Invitro پیشنهاد شده است.^[۱۲] روش‌های زیر از آن جمله‌اند:

۱- نفوذ رنگ Dye Penetration

۲- نفوذ باکتریها و متابولیت‌های باکتریایی

۳- نفوذ رادیوایزوتوپ‌ها

۴- استفاده از هوای فشرده

۵- استفاده از میکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی

۶- فلورومتری و اسپکتروفوتومتری

۷- روش الکتریکی شیمیایی

۸- روش شفاف‌کردن^[۱۳]

۹- روش فیلتراسیون مایعات^[۱۴]

چون روش نفوذ رنگ در مطالعات نشست بطور متداول استفاده شده و مقدار آن نیز براحتی در ریشه‌های مستقیم

خود به مطالعه بیشتری نیاز دارد. از کل مطالب و نتایج حاصل از تحقیق انجام شده چنین بر می‌آید که تاثیر T.B بر موفقیت درمان کم و قابل صرف نظر کردن است. بطوریکه اگر درکار کلینیکی، هنگام انتخاب C.M.C احساس شود مطلوب است، ولی اگر T.B بدست نیامد لزومی نیست که دندانپزشک وقت و نیروی خود را صرف حصول آن کرده و یا جنبه دیگری از درمان را فدای آن کند. و باید توجه داشت که موفقیت درمانهای اندودنتیکز، بستگی کامل به نحوه تهیه و تمیز کردن کانال داشته و بدون تهیه کامل کانال ریشه دندان هرگونه پرکردنی و یا تکنیکی موفقیت چندانی در پی نخواهد داشت.

Summary

The necessity of having "Tug-Back" during the obturation of root canal have been a matter of controversy for many years.

Fourty four single rooted teeth with completed apex were selected for this study. All of the teeth were filed up to # 50. Teeth were divided in two groups. The first group filled with a "Tug - Back" for master cone and lateral condensation Technique, while the second group were filled without a "Tug- Back" for master cone. Apical microleakage were measured using dye and light microscope.

Statistical analysis revealed significant difference between the two groups. Therefore there is a corelation between the apical micro leakage and presence of "Tug- Back" , although this is a very weak corelations.

آماری بین میانگین‌های نفوذ رنگ در دو گروه مذکور بی برده شد ($P=0.47$). این مطلب چنین قابل توجیه است که با توجه به بزرگ نبودن مقدار P - Value در آنالیز اول، بعلت ادغام دو زیر گروه $t.b^+$ و $t.b^{++}$ و تشکیل یک گروه واحد T.B (با حجم نمونه‌ای برابر با کل دو زیر گروه)، اختلاف بین میانگین‌های نفوذ رنگ در دو گروه واحد و فاقد معنی دار شد. پس وجود T.B تا اندازه‌ایی باعث بهتر شدن مهرو موم انتهایی ریشه شده است. ولی از آنجاییکه با انجام آنالیز Mann - Whitney میانگین‌های نفوذ رنگ آن دو مشاهده مشخص بین میانگین‌های نفوذ رنگ گرفت که افزایش نشد. ($P = 0.567$) می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزایش نیروی T.B نقشی در بهبود Apical Seal ندارد. از طرفی ایجاد یک سیل کامل نسبت به مایعات در معالجات کانال ریشه دندان نه تنها غیر قابل دستیابی است، بلکه ضروری هم نمی‌باشد و یک حد بحرانی از ریزنشست وجود دارد که ورای آن باعث بروز یا عدم بهبود ضایعه پری آپیکال می‌شود.^[11] ولی اینکه چه مقدار از ریزنشست لازم است تا در عدم موفقیت کلینیکی درمان موثر باشد مشخص نیست. ضمناً باید توجه داشت که چون T.B نمایانگر تطابق لمسی MC با کانال در ناحیه آپیکال است، و هرچه این تطابق بیشتر باشد سیلر کمتر مصرف شود هسته جامد غیرقابل جذب حجم بیشتری را در کانال اشغال کند، موفقیت درمان خصوصاً در دراز مدت افزایش می‌یابد (زیرا سیلر با گذشت زمان حل می‌شود و کانال سیل خود را از دست می‌دهد).^[12] بنابراین می‌توان انتظار داشت که با احساس T.B احتمال موفقیت طولانی مدت درمان بیشتر شود. در خاتمه باید توجه داشت که در این تحقیق سیل آپیکالی در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج، همبستگی مثبت ضعیفی را بین Apical Seal و Tug - Back نشان داد، در حالیکه شاید با گذشت زمان، T-B تاثیر مثبت بیشتری را ببر AS داشته باشد، که این

REFERENCES

- Allison D A, Michelich R J, Watlon R E. The influence of Master Cone Adaptation on the Quality of the Apical Seal. *J. Endod.* 1981; 7(2): 61-5.
- Metzger Z, Nissan, R, Tagger M, Tomes A. Apical Seal by Customized Versus Standardized Master Cones; a Comparative Study in Flat and Round Canals. *J. Endod.* 1988; 14(8): 381-4.
- Mumford J M, Jedinakiewicz N M. Principles of Endodontics. Chicago: Quintessence; 1988: 74.
- Beiser A. Theory and Problems of Applied Physics: Schaum's Outline Series. Mc Grow Hill Book Co. 1985; Chap 6.
- Karagoz L. [et.al]. Factors Affecting Apical Leakage Assessment. *J. Endod.* 1993; 19(7): 362-5.
- Robertson D, Leeb L J, McKee M, Brewer E. A Clearing Technique for the Study of Root Canal Systems. *J. Endod.* 1980; 6: 421-4.
- Inoue S, Yoshimura M, Tinkle J S, Marshall F J. A 24 - Week Study of the Microleakage of Four Retrofilling Materials Using a Fluid Filtration Method. *J. Endod.* 1991; 17(8); 369-75.
- Motloff I R, Jenson J R, Singer L, Tabibi A. A Comparison of Methods Used in Root Canal Scalability Studies. *Oral Surg.* 1982; 53: 203-8.
- Beatty R G, Vertucci F J, Zakariasen K L. Apical Sealing Efficacy of Endodontic Obturation Techniques. 1986. *Int. Endod. J.* 1980; 19: 237-41.
- Pitford T R. Relation Between Seal of Root Filling and Tissue Response. *Oral Surg.* 1983; 55(3):291-4.
- Kersten H W, Moorer W R. Particles and Molecules in Endodontic Leakage. *Int. Endod. J.* 1989; 22: 118-24.
- El Deeb M E, Zucker K J, Messer H. Apical Leakage In Relation to Radiographic Density of Gutta Percha Using Different Obturation Techniques. *J. Endod.* 1985; 11(1): 25-9.