

تحقیقی پیرامون دوقلوهای همسان و مال اکلولوژن

* دکتر اسفندیار اخوان نیاکی

چکیده

دوقلوهای منوزیگوت معمولاً از نظر ژنتیکی یکسان هستند ممکن است Mirror Image هم بشوند. اختلاف دو عضو منوزیگوت ناشی از عامل ژنتیک (محیط) است. در مطالعه حاضر، دوقلوهای منوزیگوت در دوره‌های مختلف تکامل دندانهای شامل دندانهای شیری و شیری دائمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه اینکه با همه اهمیت عوامل ژنتیک، قدرت عوامل محیطی آنقدر زیاد می‌شود که حتی می‌تواند در مواردی نقش ژنتیک را پایمال نماید.

در بیماریهای الرژیک در منوزیگوت Concordanic بیشتری نسبت به دیزیگوت دیده می‌شود. که دال بر ژنتیک بودن بیماری دارد. درجه Concordance همچنین می‌تواند دلیل بر هتروژنتیک بودن هم باشد. در تقسیم یکزیگوت سیتوپلاسم ممکن است بطور غیریکسان تقسیم شود و از نظر فاکتورهای سیتوپلاسمی فرق داشته باشد. از نظر اسکینر فرنی هم توسط [۱۹۸۳] Kender ممکن است باعث عدم تساوی مواد هسته در دوقلوها مورد بحث قرار گرفتد و بعلاوه Cromosomal Mozaicism در دوقلوهای MZ شود که این می‌تواند میان Discordant Duchenne عالائم بیماریهای X-Linked مثل بیماریهای Muscular Dystrophy در دوقلوهای موئنث که حامل این ژنهای هستند باشد. Broadbent [۱۸] از بانیان کاربرد اندازه‌های سفالومتریک برای Quantify کردن گوناگونی‌های کرانیوفاشیال بوده است. امروزه عقیده عمومی بر این است که تنوع کرانیوفاشیال بوده و توارث کرانیوفاشیال چند فاکتوری است. Continuous

بررسی مقالات

در دوقلوها دو نوع متفاوت منوزیگوت (Monozigot) یا Identical و دیزیگوت (Dizygote) وجود دارد. منوزیگوت‌ها که در آن دو موجود از تقسیم Cleavage یک تخم بارور شده بوجود می‌آیند و معمولاً از نظر ژنتیک یکسان هستند که البته اگر این تقسیم بتاخیر بیافتد پدیده Mirror Image رخ می‌دهد که در نتیجه دو عضو دوقلو ممکن است یکی چپ دست و دیگری راست دست باشد و یا Whorl موهای اکسیپیتال در یک عضو Clockwise و در عضو دیگر Conter Clockwise باشد و یا عدم قرینگی دوطرف ممکن است دیده شود که این مکانیسم ممکن است باعث کاهش شباهت ظاهری در این دوقلوها بشود که البته ناشی از اثر ژنهای نیست. اختلاف دو عضو منوزیگوت ناشی از عامل غیرژنتیک (محیط) است.

منوزیگوت شدن در جهان تقریباً ثابت است. منوزیگوت شدن کمتر به شرایط مادر بستگی دارد. به نظر Emery [۱۹۸۶] دوقلوزائی یک خصلت فamilی است و ژنتیک مادری کمابیش باعث M.Z می‌شود و ژنتیک پدری به نظر می‌رسد اثر کمتری در M.Z داشته باشد.

* دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Vander^[۱] تئوری جدید رشد و تکامل Skull بوسیله Kleauw^[۲] پایه‌ریزی شد و توسط Moss توسعه داده شد.

گوناگونیهای موافق و مخالف (Concordant) در مورفولوژی کرانیوفاشیال دوقلوهای منوزیگوت که دارای شکاف کام هستند توسط مولفین زیادی گزارش شده است که مانع از آنها این است که مرفلولوژی استخوانهای مانگریلوفاشیال و همچنین پدیده شکاف در کام و لب بطوط ژنتیکی از قبل تعیین شده ولی ظاهر آن متعاقب اثرات محیط ایجاد می‌شود.

مطالعات Woolf^[۳] (۱۹۷۱) در مورد ۴۰۷ نفر از افراد مبتلا به کلفت نشان می‌دهد که [P] (CL) بیشتر در پسرها شایع است و CL CP دوبرابر شایعتر از CL هست. در مورد یکطرفه بیشتر در طرف چپ دیده می‌شود و زنهای مبتلا بیشتر از مردهای مبتلا به چههای مبتلا بوجود می‌آورند.

Ross and Johnston^[۴] دریافتند که Cleft های ترمیم نیافته (پره مانگریلا) بوسیله جراحی رشد نرمال پیدا کردند و Zilberman, Poulton^[۵] معتقدند که از اقدام به جراحی پره مانگریلا در اطفال مبتلا خودداری شده و فقط هرچه زودتر بوسیله نیروهای ارتودوییک قسمت پره مانگریلا به عقب رانده شود.

Kahn and Hayward^[۶] (۱۹۷۴) دوکیس دوقلوی Identical را با اختلاف فاختن اسکلتال گزارش کردند که در دوقلوی اول یکی از اعضاء کلاس III اسکلتال با پروگناتیسم شدید و رابطه کلاس III دنتال بودند در حالیکه عضو دیگر رابطه فانکشنال مولرها کلاس I بود ولی رابطه اسکلتال III و در دوقلوی دیگر یکی از اعضاء دوقلو مبتلا به آسیمتری صورتی ولی عضودیگر با تشابه اسکلتالی فاقد این آسیمتری بود. Lykkjen^[۷] پدیده توارث را که بنام Emergence نامیده می‌شود شرح می‌دهد که نشان دهنده بعضی اثرات متضاد ژنتیکی است و نقش آن در Psychologic Concordance ایجاد فومن Coupling در شخصیت‌رفتاری دوقلوهای منوزیگوت است که منجر به ایجاد Image Self می‌شود.

یعنی تکامل صورت تحت تاثیر ژنهای بسیار و نیز عوامل محیطی است.

در بررسی‌ها معلوم شد که نقش عوامل تعیین‌کننده اکتسابی در گوناگونی اکلوزال تاثیر عمیق‌تری دارد. Robert S. Corruccini^[۸] (۱۹۸۰) و همکاران نشان دادند که یکی بودن محیط زندگی موجب تشابه بسیاری از خصوصیات می‌شود. اگرچه ژنتیک روی Arch Width و Arch Length اثر مهمی دارد ولی تشابه یا اختلاف در محیط در مورد متغیرهای اکلوزالی نظیر اورجت و اوربایت، رابطه مولرها و کروودینگ و چرخش مهم‌تر است.

تحقیقات نشان می‌دهد که دنتال اکلوزن تابعی از طرح کرانیوفاشیال است که از این یافته در طرح درمان و پیش‌بینی رشد مورد استفاده قرار می‌گیرد Hunler W.S.^[۹] (۱۹۷۹).

بررسی تغییرات اسکلتال و مال اکلوزن در دوقلوهای یکسان

دو قلوهای یکسان بخاطر ژنتیک یکسان که دارند قاعدتاً باید در موردناهنجاریهای اسکلتال و مال اکلوزن با منشاء ارثی مشابه باشند ولی عملاً دیده می‌شود که این طور نیست و پیچیدگی Maturation اسکلتال همواره موجب ایجاد اختلاف می‌شود. تغییرهای اکلوزالی در نهایت می‌تواند سبب ایجاد آسیمتری استخوان ماندیبول را نماید که اگر در سنین مناسب درمان ارتودنسی نشود در سنین بالا بدون جراحی، درمان نتیجه نخواهد داد.^[۱۰]

عوامل محیطی متعددی ممکن است روی نواحی رشد اسکلتال مختلف تأثیر بگذارد و باعث ایجاد تغییرات شکل و اندازه فکین شود و مکانیسم‌های زیادی وجود دارد که بوسیله آنها تغییرات آدپتیو مستقیماً در اثر عوامل محیطی ایجاد می‌شود که این مکانیسم ممکن است هورمونال، متابولیک، عصبی، انزیماتیک یا مکانیکال باشد.

برای روشن شدن اثر محیط‌های روی طرح اسکلتال ارثی،

تهران که در دوره M.D هستند و یک کیس ریرت هم مربوط به یک زوج درمان شده ارتدنسی در مرحله P.D هستند. معیارهای تعیین زیگوستی در این بیماران ۱ - شباهت ظاهری مثل رنگ چشم، رنگ پوست و مو، شکل صورت و طرح گوش‌ها ۲ - گروه خونی بیماران ۳ - معیار وضعیت دوقلو در زمان تولد. با استفاده گفته مادران این دوقلوها. دوقلوی اول در مرحله D.D. دختر ۵ ساله که طبق معیارهای زیگوستی شامل شباهت ظاهری و گروه خونی و گفته مادر بچه‌ها، منوزیگوت بوده‌اند. با همه شباهتی که این دوقلوها با هم دارند از نظر اکلوژن، اختلافات گوناگونی مشهودی در آنها مشاهده می‌کنیم. رابطه مولرها و کائین‌ها در هر دو کلاس I است.


مطالعه مال اکلوژن در دوقلوهای منوزیگوتی بدليل رویداد نسبتاً کم منوزیگوتی یعنی نسبت ۴ در هزار تولد از یکطرف و یافتن موارد با ارزش علمی از نظر وجود مال اکلوژن در آنها از طرف دیگر کار را مشکل می‌نماید.

روش کار Method and Material

تحقیق حاضر در دوقلوهای منوزیگوت و در دوره‌های مقطعی تکامل دندانی شامل ۱ - Deciduous Dentition ، ۲ - Mixed Dentition ، ۳ Permanent Dentition انتخاب و انجام شد. یک گزارش مربوط به دوقلوی منوزیگوت در سن قبل از مدرسه و سپس چند زوج هم از دبستانهای پسرانه منقطعه یک آموزش و پرورش



دوقلوی (ب)



دوقلوی الف

شکل ۱

مشکلات زایمان در مورد ایشان که تقریباً بدون علائم حیاتی بدنیآمد ۸ روز پس از تولد در بیمارستان تحت مراقبت و بستره بود و دچار عوارض تنفسی و عفونت گردید و احتمال استفاده از تتراسیکلین، وجود هیپوپلازی مینا در دندانهای شیری سبب تغیر اثر بارز محیط بر دگرگون ساختن زمینه ارضی را عیناً می‌بینیم.

دوقلوی دوم: در مرحله M.D هستند دو پسر ۹ ساله که

در دوقلوی الف: کراس بایت طرف چپ، Displacement ماندیبول دیده می‌شود که نقش محیط را نشان می‌دهد که اگر این آسیمتری درمان نشود سبب آسیمتری Structual می‌شود که با افزایش سن و تغییرات رشد فک فتوتیپ دوقلوی یکسان با این ترتیب کاملاً تغییر می‌کند.

در دوقلوی ب: اوین بایت اتریور همراه با هیپوپلازی مینا دارد. عادت به مکیدن انگشت و تنفس دهانی دارد و بعلت

ساترالها بصورت MirrorImage بوده است.


معیارهای منوزیگوستی آنها صادق بود. شباهت ظاهری رابطه مولر و کانین‌ها کلاس I، اکلوزن بصورت کراس بایت



شکل ۲

(طبق گفته مادر بیمار اپن بایت در اکثر افراد خانواده دیده می‌شود) بطور خلاصه در این دوقلوی منوزیگوت، در فنوتیپ و یافته‌های اکلوزن و دنتال تفاوت‌های مشهودی وجود دارد که اولاً Arch Form در هر دو کاملاً با هم فرق دارد و نیز اکلوزن و رابطه دندانهای اثر یوروپوزیشن لبها کاملاً متفاوت است که خود مبین اثر محیط است.

دوقلوهای سوم: الف مرحله M.D، پسر ۱۲ ساله دوقلوی الف تغییرات دنتواکلوزن بعلت زود از دست دادن دندانهای شیری، تغییر میدلاین در اثر زود از دست دادن C و رابطه کلاس III در طرف راست پایین کراس مختصر ۱۱۱، تمایل به اوپن بایت. دوقلوی ب: رابطه دندانهای کلاس I و هیچ دندان شیری را زودتر از موعده از دست نداده است تانگتر است شدید، تمایل به اپن بایت



شکل ۳

که لذا با این معیارها از نظر اسکلتال کلاس I و High Angle و دندانهای انتریور بالا و پایین Precomtent بوده‌اند.
دوقولی ب:

$$SNA = 80^\circ$$

$$SNB = 78$$

$$FMA = 31^\circ$$

$$GoGn - SN = 36^\circ$$

$$I.M.P.A. = 95^\circ$$

و ارتفاع عمودی قدامی صورت:

$$\frac{\text{Upper Face Height}}{\text{Total Facial Height}} = \frac{52\text{mm}}{110\text{mm}}$$

$$\frac{\text{Lower Face Height}}{\text{Total Face Height}} = \frac{57\text{mm}}{110\text{mm}}$$

که این عضو هم اسکلتال کلاس I و High Angle و انتریورها Precomtent بوده و نکته مهم در مورد Facial Hight آنها، این است که ارتفاع N-ME در هردو دقیقاً مساوی و نیز Lower Facial Hight یکسان بوده است و Upper Facial Hight فقط یک میلیمتر اختلاف داشته که این نشان‌دهنده ارشی بودن صدرصد ارتفاع صورت است. و در Supper Imposing این دوقلو در این مرحله از نظر اسکلتال اختلاف چندانی دیده نمی‌شود.

درمان این دو بیمار Interceptive بوده است و پس از درمان اندازه‌های سفالومتریک بشرح زیر است.

دوقولی الف:

$$SNA = 82^\circ$$

$$SNB = 80$$

$$GoGn - SN = 33^\circ$$

$$FMA = 98^\circ$$

دوقولی چهارم: دختر ۸ ساله M.D تانک تراست و تمایل به انتریور اپن‌بایت (به علت ممانعت خانواده از گرفتن عکس معدور بودیم).

دوقولی الف: رابطه مولرهای کلاس دو خفیف و رابطه کائین‌ها کلاس I بدون اپن‌بایت

دوقولی ب: رابطه مولرهای طرف راست کلاس I و چپ کلاس II ضعیف و در ناحیه کائین و لاترال راست بالا کراس‌بایت و انحراف میدلاین در فک پایین به اندازه $2/5\text{mm}$ طرف راست بوده است و تنفس دهانی، کمبود فضا در طرف چپ $2/5\text{mm}$ است.

پس از درمان

دوقولی الف: رابطه مولرهای کائین‌ها کلاس I و اکلوزن نرمال بدون اپن‌بایت
دوقولی ب: رابطه مولرهای کائین کلاس I بدون اپن‌بایت و بدون انحراف میدلاین
اندازه سفالومتریک عضو الف:

$$SNA = 81/85^\circ$$

$$SNB = 79$$

$$FMA = 33^\circ$$

$$GoGn - SN = 38^\circ$$

$$\text{Facial Angle} = 83^\circ$$

$$I.M.P.A. = 96^\circ$$

در مورد ارتفاع عمودی قدامی صورت:

$$\frac{\text{Upper Face Height}}{\text{Total Facial Height}} = \frac{52\text{mm}}{110\text{mm}}$$

$$\frac{\text{Lower Face Height}}{\text{Total Face Height}} = \frac{57\text{mm}}{110\text{mm}}$$

نتیجه عمل ژنهای متعدد (مولتی یلزن) می‌باشد که در وضعیت‌های مختلف همه آنها کمایش در فتوتیپ متغیر موئزند. ناهنجاریهای کرایوفاشیال و مال اکلوزنها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ژنهای هم برای ایجاد یک ناهنجاری عمل می‌کنند و کاراکترهای اسکلتال و دنتال بصورت توارث پلی‌ژنتیک منتقل می‌شودکه برای تظاهر احتیاج به یک Threshold یا آستانه دارند از این مرحله نقش عوامل محیطی شروع می‌شود. با توجه به تئوری Moss و اثر ژنتیکی نسج نرم و اثر آن بر استخوانها و بررسی حاضر روی دوقلوهای منوزیگوت ایرانی نظریه مزبور تائید می‌گردد.

نتیجه

از بررسیهای مقالات و تحقیق حاضر، در دوقلوهای منوزیگوت که از نظر ژنتیک یکسان هستند، عوامل محیطی مثل زود از دست دادن دندانها شیری، تغییرات اکلوزن، تنفس دهانی، ترومما و عوامل شیمیایی مثل داروها، Stability Genetic را کم بیش تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و حتی در مواردی باعث ایجاد اختلاف در فتوتیپ بیمار می‌شوند. یعنی عوامل ژنتیک با همه اهمیتی که در تعیین فتوتیپ بعده دارند نقش تعیین‌کننده در مرغولوزی کرایوفاشیال ندارند بلکه این محیط است که تعیین‌کننده نهانی است. محیط حتی در مواردی می‌تواند نقش ژنتیک را پایمال کند.

خلاصه

می‌توان گفت توارث خصلت‌های پلی‌ژنتیک متکی بر عمل فزاینده و پیشرونده ژنهای متعدد بسیاری است که هر کدام از آنها سهم کوچکی در تأثیرگذاری کلی بعده دارند. نقش سهم

$$\frac{\text{Upper Face Height}}{\text{Total Facial Height}} = \frac{59\text{mm}}{120\text{mm}}$$

$$\frac{\text{Lower Face Height}}{\text{Total Face Height}} = \frac{62\text{mm}}{120\text{mm}}$$

$$I.M.P.A. = 92^\circ$$

دوقلوی ب: اندازه‌های سفالومتریک

$$SNA = 83^\circ$$

$$SNB = 81^\circ$$

$$GoGn - SN = 33^\circ$$

$$FMA = 27^\circ$$

$$\frac{\text{Upper Face Height}}{\text{Total Facial Height}} = \frac{N.A}{N-ME} = \frac{60\text{mm}}{120\text{mm}}$$

$$\frac{\text{Lower Face Height}}{\text{Total Face Height}} = \frac{N.A}{N-ME} = \frac{62\text{mm}}{120\text{mm}}$$

$$I.M.P.A. = 95^\circ$$

می‌بینیم ارتفاع عمودی صورت صدرصد ارثی است. شباهت اسکلتال تا حد زیادی حفظ شده است. اختلاف فاحش در ناحیه لبها و تمایل محوری دندانهای انتریور دیده می‌شود که بدوعلت می‌توان ذکر کرد یکی تنفس دهانی دوقلوی ب و دیگر عدم همکاری او در استفاده از اپلانسیس.

بطور خلاصه در مورد این دو بیمار می‌توان گفت که از نظر اسکلتال هر دو عضو دوقلوی منوزیگوت Identical بودند یعنی کلاس I و High Angle و دچار تانگتر است شدید (که در فایل هم تانگتر است بوده است) و Long Face بودند.

بحث

عوامل ارثی نقش تعیین‌کننده اولیه را بعده دارند و توارث،

Summary

Polygenic inheritance is the resultant of numerous different gene actions. Also environmental factors play an essential role in polygenic inheritance. In this article we have discussed the importance of both genetic and environmental factors on monozygotic twins. Unexpectedly, craniofacial anomalies do not comply with mendelian laws; dental and skeletal characters are inherited in a polygenic way with a threshold for expression. Here, we have looked upon the environmental factors from the viewpoint of genetic makeup. Finally, the role of environmental factors and related manifestations in monozygotic twins is discussed.

محیط هم مطرح گردیده و لذا برای دوقلوهای منوزیگوت از نظر سهم ارث و محیط بررسی گردید. ناهنجاریهای کرانیوفاسیال برخلاف تصور از قانون زنگیکی ساده مندل پیروی نمی‌کنند بلکه کاراکترهای دنتال و اسکلتال بصورت توارث پلی‌زنگیک منتقل می‌شود که برای تظاهر احتیاج به یک آستانه دارند و همینطور نقش عوامل محیطی بر روی زمینه زنگیک بررسی شد و بالاخره نقش عوامل محیطی و تغیرات حاصل در دوقلوهای منوزیگوت بررسی شد.

REFERENCES

1. Corruccini, R.S. (1980): Genetic Analysis of Occlusal Variation in twins. American Journal of Orthodontics 78: 140-154.
2. Gardner, E.J. (1983): Human Heredity. John Wiley Sons. Publications. 212-225.
3. Hayward, J.R. [et al.] (1974): Skeletal Differences in Identical Twins. Journal of Oral Surg. 32: 134-7.
4. Hunter, W.S. [et al.] (1970): The Heritability of Attained Growth in the Human Face. American Journal of Orthodontics Aug. 58: 128-34.
5. Neopola, S.R. (1969): The Intrinsic and Extrinsic Factors Influencing the Growth and Development of the Jaws Heredity and Bunctional Matrix. American Journal of Orthodontics May. 55: 499-505.
6. Pangrazio, Kulbersh, V. (1985): Facial Changes Resulting from Different Treatments in Identical Twins. Journal of Clinical Orthodontics May. 58:19(5) 356-61.
7. Sehmid, W. Mongini, F. (1990): Mondon Orthodontics Jan, Feb. 15(1) 91-104.
8. Shelley, R. Saunders. Oct. 78: 394-404.
9. Zilberman, Z. & Poulton, D.R. (1984): Identical Twins Bilateral and Unilateral Lefts. American Journal of Orthodontics June, 86(1) 14-24.