

دیابت و ضایعات کراتوتیک لیکن پلان

* دکتر فرزانه آفاحسینی

** دکتر نیما مقدم

چکیده

Grinspan و همکارانش در سال ۱۹۹۶ همواهی لیکن پلان با افزایش فشار خون اولیه و دیابت قندی را با عنوان Grinspan's Syndrome مطرح کردند^[۱] مطالعات متعددی از آن زمان تاکنون در این زمینه انجام شده است. پژوهشگران متوجه شدند که سلولهای اپیدرم مبتلا به لیکن پلان اختلال فعالیت آنزیم Defective Carbohydrate Expression را بروز می‌دهند بنابراین تصور کردند که شاید بین سلولها و هورمونهای لازم برای انجام اعمال متابولیک ارتباطی وجود داشته باشد^[۲] از طرف دیگر بعضی از محققین این فرضیه را مطرح کردند که اختلال عملکرد هورمونی در دیابت قندی با نقایص ایمنی ارتباط داشته^[۳] به ایجاد ضایعات لیکن پلان کمک می‌کند.

محققین مختلف با بررسیهایشان نشان دادند که افزایش فشار خون اولیه با لیکن پلان همواهی معنی‌دار ندارد و علت بروز لیکن پلان در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون واکنشهای شبیه لیکنی مخاط دهان (Lichenoid Reactions) به داروهای کاهنده فشار خون می‌باشد^[۴] از این رو اکثر مطالعات انجام شده به بررسی ارتباط دیابت با لیکن پلان اختصاص داشته به ارزیابی شیوع دیابت در مبتلایان به لیکن پلان با شیوع لیکن پلان در مبتلایان به دیابت می‌پردازد.

بررسی حاضر ۲۴۲ بیمار مبتلا به دیابت مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی تهران را از نظر شیوع لیکن پلان و مقایسه آن با گروه کنترل و نیز ارتباط بین ضایعات لیکن پلان در دهان و میزان قند و چربی خون و نیز اثر مصرف داروهای ضد فشارخون و داروهای کنترل کننده قند خون در بروز لیکن پلان را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه

گزارشهایی از همواهی لیکن پلان با اختلالات عمومی متعدد نظری کولیت اولسراتیو، Alopecia Areata، ویتیگو، میاستنی گراوز، هپاتیت مزمن فعال، سیروز اولیه مجاری صفراوی، تیمورا، سندروم شوگرن، پمفیگوس، درماتیت هرپتی فرم، لوپوس ارتمیتوز و پمفیگوئید در دست می‌باشد^[۵]. البته تمامی این گزارشات بحث‌انگیز باقی مانده‌است^[۶] در این زمینه ساله‌است که همواهی لیکن پلان

امروزه ارتباط ضایعات دهانی با بیماریهای عمومی از مسائل مورد توجه دندانپزشکان و صاحب‌نظران این رشته علمی است. تشخیص بیماریهای عمومی شناخته نشده مراجعه کنندگان به درمانگاههای دندانپزشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه با تشخیص بیماری عمومی چنین بیمارانی با یاری از شناسایی علائم دهانی آنان می‌توان به بهبودی و پیشگیری از عوارض بعدی کمک شایانی کرد.

* استادیار گروه تشخیص و بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
** دندانپزشک

پس از پایان دوره معاينه در مجموع ۲۶۵ پرسشنامه از بیماران مبتلا به دست آمد. سپس به مدت ۴ هفته و به منظور دقیق‌بیشتر پرسشنامه‌های تکمیل شده با پرونده‌های بیماران مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان تهران مقایسه شدند. در این مرحله اطلاعات تکمیلی از پرونده‌های مرکز تحقیقات به پرسشنامه‌های انتقال داده شده در صورت نیاز اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها با اطلاعات موجود در پرونده‌های مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی تهران درمانگاه دیابت را در تیرماه ۱۳۷۵ راه‌اندازی کرد. هدف از تاسیس این درمانگاه ارائه خدمات درمانی بیشتر به بیماران دیابتی و انجام کارهای تحقیقاتی در این زمینه می‌باشد. معاينه بیماران و انجام خدمات درمانی در این درمانگاه فقط در روزهای پنج‌شنبه (صبحها) انجام می‌شود.

با دیابت قندی و افزایش فشارخون اولیه در محافل دندانپزشکی جهان مطرح بوده است.^[۸]

بر این اساس با حضور ۷ ماهه در مرکز درمانگاه بیمارستان شریعتی به معاينه‌دهانی بیماران دیابتی مراجعه کننده به آن مرکز، به بررسی رابطه دیابت با لیکن پلان پرداختیم.

مواد و روشها

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی تهران درمانگاه دیابت را در تیرماه ۱۳۷۵ راه‌اندازی کرد. هدف از تاسیس این درمانگاه ارائه خدمات درمانی بیشتر به بیماران دیابتی و انجام کارهای تحقیقاتی در این زمینه می‌باشد. معاينه بیماران و انجام خدمات درمانی در این درمانگاه فقط در روزهای پنج‌شنبه (صبحها) انجام می‌شود.

به منظور بررسی شیوع لیکن پلان در افراد مبتلا به دیابت همراه با سایر پزشکان درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی از شهریور ماه ۱۳۷۵ بیماران دیابتی مراجعه کننده به آن درمانگاه معاينه شدند. همکاری با درمانگاه مرکز تحقیقات غدد تا انتهای خرداد سال ۱۳۷۶ بطول انجامید. در این فاصله زمانی برای معاينه دهانی بیماران دیابتی ۷ ماه وقت صرف شد. قبل از معاينه دهانی بیماران، پرسشنامه‌هایی تکمیل می‌شد.

سپس معاينه بالینی بیماران با Artificial Light و Wooden Blade Tongue تشخيص ضایعات سفید کراتوتیک (Keratotic White) (Lesions) در کل دهان استوار است. از آنجاییکه شکل رتیکولر لیکن پلان در طبقه ضایعات سفید کراتوتیک قرار دارد بنابراین ارزیابی حاضر تشخیص کل رتیکولر لیکن پلان با یا بدون اشکال دیگر نظری آتروفیک - اروزیو وغیره همراه آن را در بر می‌گیرد. بیماران مبتلا به دیابت و واجد ضایعات سفید دهانی به بخش تشخیص بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارجاع می‌شوند.


نتایج

در مجموع ۲۴۲ بیمار در این بررسی از نظر دهانی مورد معاينه قرار گرفتند که در کل ۶ بیمار مبتلا به لیکن پلان شناسایی شدند. بیماران مبتلا به دیابت در محدوده سنی ۶-۸۲ سال با میانگین ۵۰/۹ سال قرار داشتند. بیماران مبتلا به دیابت و لیکن پلان در محدوده سنی ۳۵-۶۳ سال با میانگین سنی ۵۰/۸ قرار می‌گیرند. (نمودار ۱)


از مجموع ۲۴۲ بیمار ۹۹ نفر مرد و ۱۴۳ نفر زن و از مجموع ۶ بیمار مبتلا به لیکن پلان ۴ نفر مرد و ۲ نفر زن بودند.

مدت زمان ابتلا به دیابت در محدوده زمانی یک ماه تا ۳۴ سال با میانگین ۸/۱ سال می‌باشد مدت زمان ابتلا به دیابت در ۶ بیمار مبتلا به لیکن پلان در محدوده زمانی ۷ ماه تا ۱۵ سال با میانگین ۱/۶ سال می‌باشد. (نمودار ۲)


۲۱۹ نفر به NIDDM و ۲۳ نفر به IDDM مبتلا بودند (نمودار ۳). هر ۶ بیمار مبتلا به لیکن پلان به NIDDM مبتلا بودند. (نمودار ۴)



نمودار ۱- توزیع فراوانی متعلق تعداد بیماران مورد مطالعه دیابتی بر حسب سن



نمودار ۲- توزیع فراوانی مطلق تعداد مبتلایان به دیابت بر حسب مدت زمان ابتلاء



نمودار ۳- نوع دیابت

از عوامل کاهنده قندخون) مشخص گردید که ۱۸۰ بیمار دارای تاریخچه دارویی مشخص و قطعی می باشند. جدول (۳) تعدادی از داروهای مورد مصرف بیماران دیابتی را نشان می دهد. جدول (۵) تقسیم‌بندی بیماران براساس مصرف یا عدم مصرف دارو را نشان می دهد.

از مجموع ۲۴۲ بیمار ۸۰ نفر با انسولین، ۱۴۲ نفر با OH.A و ۲۰ نفر با رژیم غذایی قندخون خود را کنترل می کردند (جدول ۲) شایان ذکر است که بعضی از بیماران هم‌زمان از دو دارو برای کنترل قندخون استفاده می کردند. با بررسی تاریخچه دارویی داروهای دیگر (منظور ترکیباتی غیر جدول ۱- مصرف داروهای کنترل کننده قندخون در بیماران دیابتی

تعداد کل ۲۴۲ نفر			
داروهای کاهنده قند خون خواراکی	انسولین	رژیم غذایی	نوع رژیم
۱۴۲	۸۰	۲۰	تعداد
۵۸	۳۳	۶/۶	درصد کل

جدول ۲- تقسیم داروهای کنترل کننده قندخون در بیماران دیابتی

داروهای کاهنده قند خون خواراکی			
تعداد کل ۲۴۲ نفر			
کلرپروپامید	مت فورمین	غلی بن کلامید	تعداد به نفر
۱۰	۱۵	۱۳۹	تعداد

جدول ۳- مصرف داروهای متفرقه بیماران دیابتی

تعداد کل ۱۸۰ نفر				
نوع دارو	انالاپریل کاپتوپریل	NSAIDs	متیل دوپا	دیگوکسین
تعداد	۱۹	۱۸	۸	۱۴
درصد	۱۰	۱۰	۴/۴	۷/۷

تعداد کل ۱۸۰ نفر

تعداد کل ۱۸۰ نفر				
نوع دارو	آلوبورینول	آتنولول پروپرانولول	فروسماید تیازیدها	آدالات دیلتیازم وراپامیل
تعداد	۲	۳۴	۱۲	۱۶
درصد	۱/۱	۱۸/۸	۶/۶	۸/۸

جدول ۴- داروهای کنترل کننده قندخون در بیماران مبتلا به لیکن پلان

تعداد کل ۶ نفر				
نوع رژیم	رژیم غذائی	انسولین	OHA	
تعداد	۱	۱	۴	
درصد	۱۶	۱۶	۶۶	

حس سوزش مخاط دهان شکایت داشتند. سه بیمار نیز به شکل بدون علامت (Asymptomatic) لیکن پلان مبتلا بودند. هر ۶ نفر به شکل رتیکول همراه با نوع آتروفیک - ازوژیو مبتلا بودند. انتشار لیکن پلان در هر ۶ نفر دو طرفه بود. در این مطالعه ۲/۴٪ بیماران دیابتی مورد معاینه به لیکن پلان دهانی مبتلا بودند (۶ نفر از ۲۴۲ نفر) شیوع لیکن پلان در بیماران مبتلا به دیابت در این بررسی با شیوع لیکن پلان از آمار بیمارستان رازی مقایسه گردید. در آمار بیمارستان رازی

میانگین مقدار TG (Triglyceride) FBS (Cholesterol) در مورد هر ۶ بیمار مبتلا به لیکن پلان محاسبه گردید، مجدداً میانگین و واریانس میانگین مقدار TG ، CHL ، FBS در کل ۶ بیمار ثبت شده و با استفاده از آزمون T دو دامنه با $P < 0.01$ مشخص گردید که بین میانگین مقدار TG و CHL بیماران مبتلا به لیکن پلان در این مطالعه با بروز ضایعات لیکن پلان در دهان ارتباطی وجود ندارد.

سه بیمار، به لیکن پلان Symptomatic مبتلا بوده و از

انجام نشده و نمونه‌ای با نسبت مساوی اقوام تشکیل دهنده جامعه تهران انتخاب نشده است. بنابراین در بررسی حاضر نمی‌توان اظهار نظر کرد که شیوع لیکن پلان در جمعیت دیابتی این نمونه آیا می‌تواند بازتاب کننده شیوع لیکن پلان در افراد دیابتی جامعه تهران باشد یا خیر؟

انتخاب گروه شاهد به منظور مقایسه شیوع لیکن پلان در دو جمعیت دیابتی و شاهد از نظر آماری الزامی است. در مطالعه Alberecht و همکارانش (۱۹۹۲) ذکر شده است که گروه شاهد از افراد سالم انتخاب شده‌اند.^{۱۱}

Borghelli و همکارانش (۱۹۹۳) نیز گروه شاهد را از افراد سالم انتخاب کرده‌اند^{۱۲} و Van Dis و همکارانش (۱۹۹۵) شرایط خاصی برای گروه شاهد قائل شده‌اند. آنها اعتقاد دارند که افراد شاهد باید به اختلالات عمومی مبتلا باشند که در مقالات همراهی آنها با لیکن پلان مطرح شده است.

آنها افرادی را که عدم ابتلایشان به دیابت، Alopecia Areata ، Vitiligo ، Colitis فعال، سیروز اولیه صفوایی، مولتیپل اسکروز، فیبروز اولیه ریوی با نظر گروه مشاور یزشکی اثبات شده بود را در گروه شاهد قرار می‌دادند.^{۱۳}

چنین امکانات پزشکی برای انتخاب گروه شاهد در این مطالعه در دسترس نبود لذا از آمار شیوع لیکن پلان در بیمارستان رازی تهران به عنوان آمار شاهد برای مقایسه دو نسبت استفاده شد. نمونه گرفته شده در پایان نامه مذکور^{۱۴} به طور تصادفی از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه صبح بیمارستان رازی تهران گرفته شده است. با توجه به اینکه وضعیت نمونه گیری بررسی حاضر با وضعیت نمونه گیری بیمارستان رازی تهران مشابه است دارد بنابراین نسبت شیوع

تهران شیوع لیکن پلان ۴۸٪ (۱/۹ نفر از ۲۵۴۸ نفر مراجعه کننده) ذکر شده است. با توجه به اعداد فوق از آزمون Z دو دامنه برای مقایسه نسبت ابتلای گروه با <P استفاده شد که نشان داد بین نسبت لیکن پلان در جمعیت عادی با نسبت لیکن پلان در افراد دیابتی اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد. در ضمن بین وجود ضایعات لیکن پلان در دهان و مدت زمان ابتلا به دیابت همراهی وجود ندارد.

بحث

مقایسه نسبت شیوع لیکن پلان در بیماران دیابتی با نسبت شیوع لیکن پلان در جمعیت عامه زمانی امکان پذیر است که شیوع لیکن پلان در هر دو جمعیت به نحوی تعیین شود که نمونه گرفته شده به کل جامعه قابل تعیین باشد. به عنوان مثال VanDis و همکارانش (۱۹۹۵) ۲۷۳ نفر بیمار دیابتی و شاهد سالم را برای مقایسه شیوع لیکن پلان انتخاب کردند ۳۲٪ (۸۴ نفر) از حجم نمونه آنها در هر دو گروه از افراد African - American بود در حالیکه افراد American فقط ۱۲٪ جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل این محققین در مقاله خویش اظهار می‌دارند که نمونه بیماران آنها تصادفی نبوده و تنها نمایشگر افراد مراجعه کننده به کلینیک دیابت است و نتیجه گرفتنده شیوع لیکن پلان در بیماران دیابتی و غیر دیابتی در مطالعه آنان قابل تعیین به کل جامعه نمی‌باشد.^{۱۵} در تحقیق و بررسی حاضر افراد دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی تهران بطور تصادفی انتخاب شدند اما با توجه به اینکه درصد اقوام مختلف تشکیل دهنده جامعه تهران مشخص نمی‌باشد در بررسی حاضر نیز تفکیک قومی بیماران

شایان ذکر است که از ۴ بررسی فوق Van Dis و همکارانش شیوع لیکن پلان در افراد دیابتی را با آنکه بیش از سایر محققین بدست آورده‌اند اما فقط مطالعه Alberecht و همکارانش و Banoczy و همکارانش^{۱۷} این همراهی را معنی‌دار اعلام نموده‌اند و سه بررسی دیگر بر عکس به نتیجه مشابهی رسیده همراهی لیکن پلان با دیابت را معنی‌دار نمی‌دانند.

Alberecht و همکارانش بین مدت زمان ابتلاء به دیابت وجود ضایعات لیکن پلان دردهان ارتباط معنی‌دار پیدا کرده، خاطرنشان می‌کنند که بروز لیکن پلان دهانی بطور معنی‌دار در سال دوم ابتلاء به دیابت از شیوع بیشتری برخوردار است.^{۱۸} Van Dis و همکارانش بین وجود ضایعات لیکن پلان در دهان و مدت زمان ابتلاء به دیابت همراهی معنی‌دار گزارش نکردند.^{۱۹} در بررسی حاضر نیز بین مدت زمان ابتلاء به دیابت وجود ضایعات لیکن پلان دردهان ارتباطی یافت نشد که از این نظر با نتیجه مطالعه Van Dis و همکارانش^{۲۰} مشابهت دارد.

معیارهای تشخیص لیکن پلان در مطالعه Borghelli و همکارانش^{۲۱} و Alberecht و همکارانش^{۱۹} ذکر نشده است.^{۲۲} Borghelli و همکارانش برای تشخیص لیکن پلان از Unspecified Clinical Criteria استفاده کردند.^{۲۳}

Van Dis و همکارانش در مورد مطالعه Alberecht و همکارانش عقیده دارند که دلیل گزارش شیوع بیشتر لکوپلاکیا نسبت به گروه شاهد (۶/۶٪ در بیماران دیابتی در مقابل ۲/۲٪ در گروه شاهد) می‌تواند ناشی از خطای نمونه‌گیری با تشخیص ناصحیح ضایعات سفید و آتروفیک به عنوان لیکن پلان

لیکن پلان در بیماران دیابتی بیمارستان شریعتی تهران با نسبت شیوع لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران با هم آزمون شدند.

Alberecht و همکارانش در مجارتستان شیوع لیکن پلان در جمعیت دیابتی را ۱٪ (۱۷ نفر از ۱۶۰۰ بیمار مبتلا به دیابت) در مقابل ۰٪ در گروه شاهد (۰ نفر از ۶۲۱ نفر شاهد سالم) ذکر کردند. آنها پس از مقایسه این دو نسبت نتیجه گرفتند که دیابت با لیکن پلان همراهی معنی‌دار دارد.^{۱۱} Borghelli و همکارانش در آرژانتین شیوع لیکن پلان در افراد دیابتی را ۵۵٪ (۵ نفر از ۷۲۹ نفر بیمار دیابتی) در مقابل ۷۴٪ در گروه شاهد (۶ نفر از ۷۲۹ نفر شاهد سالم) اعلام کردند. با مقایسه این دونسبت به این نتیجه رسیدند که دیابت با لیکن پلان همراهی معنی‌دار ندارد.^{۲۴} Van Dis و همکارانش در آمریکا شیوع لیکن پلان در افراد دیابتی را ۴٪ (۱۱ نفر از ۲۷۳ بیمار دیابتی) در مقابل ۳٪ در گروه شاهد (۸ نفر از ۲۷۳ نفر در گروه شاهد) گزارش کردند و با مقایسه این دو نسبت اعلام کردند که همراهی دیابت و لیکن پلان معنی‌دار نمی‌باشد.

در مطالعه حاضر شیوع لیکن پلان در افراد مبتلا به دیابت ۴٪ (۶ نفر از ۲۴۲ بیمار دیابتی) در مقابل ۱/۹٪ (۴۸ نفر از ۲۵۴۸ نفر در گروه شاهد)^{۲۵} می‌باشد. با استفاده از آزمون دو دامنه آماری مشخص گردید که همراهی دیابت و لیکن پلان از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. این آزمون دو دامنه است و فقط اختلاف را نشان می‌دهد و تاثیر عوامل دیگر در آن قابل بحث نیست. در صورتی که نتیجه بررسی حاضر را با نتایج محققین مذکور مقایسه کنیم مشاهده می‌گردد که نتیجه ارزیابی حاضر معنی‌دار نبوده از این نظر با نتایج مطالعات Borghelli و همکارانش و Van Dis و همکارانش مشابهت دارد.^{۲۶}

که Grinspan's Syndrome پدیدهای ناشی از دارو Potts^{۸۱} و (Drug Induced Phenomenon) می‌باشد.^{۸۲} و همکارانش (۱۹۹۲) Robertson^{۸۳} و همکارانش (۱۹۸۷)^{۸۴} و Lichenoid Drug Eruptions^{۸۵} ناشی از مصرف NSAIDS با بروز Erosion در دهان همراهی معنی‌دار پیدا کردند.^{۸۶} و Mطالعه Lamey^{۸۷} و همکارانش (۱۹۹۵)^{۸۸} همراهی معنی‌دار بین بروز Erosion و مصرف دارو را مردود می‌دانند و Basal Cell خاطرنشان می‌نمایند که بین واکنش Cytoplasmic Autoantibody Positive (BCCA⁺) و انتشار یک طرفه ضایعات در دهان ارتباط معنی‌دار وجود دارد. Lamey^{۸۹} و همکارانش به این نتیجه رسیدند که انتشار ضایعات Idiopathic Lichen Planus دوطرفه می‌باشد اما Lichenoid Drug Eruption انتشار ضایعات دهانی یکطرفه است^{۹۰} هر ۱۹ بیمار مبتلا به لیکن‌پلان در مطالعه Van Dis^{۹۱} و همکارانش (۱۱ نفر در گروه دیابتی و ۸ نفر در گروه شاهد) از ابتلاء به لیکن‌پلان در مخاط خویش، آگاه نبودند و همه آنها به شکل فقط رتیکولر لیکن‌پلان (بدون همراهی با نواحی آتروفیک - اروزیو وغیره) مبتلا بوده از حس سوزش یا درد در مخاط دهان خویش شکایت نداشتند^{۹۲} ۵ بیمار از ۶ بیمار بررسی حاضر دارو مصرف می‌کردند (جدول ۶) ۳ بیمار از حس سوزش مخاط دهان شکایت داشتند. هر شش بیمار مبتلا به لیکن‌پلان در این مطالعه به شکل رتیکولر همراه نواحی آتروفیک - اروزیو مبتلا بودند. انتشار لیکن‌پلان در هر شش نفر دوطرفه بود.

دهانی باشد در حالیکه شاید این ضایعات لیکن‌پلان نبودند. معیار بکار رفته در مطالعه Van Dis^{۹۳} و همکارانش بر مبنای معیارهای بالینی بدون تایید هیستولوژی می‌باشد. آنها اعتقاد دارند که این معیار ضریب دقیق معادل ۹۷٪ دارد اما احتمال خطای تشخیصی را نباید از نظر دور انگاشت.^{۹۴}

معیار تشخیص بالینی لیکن‌پلان در بررسی حاضر بر مبنای مشاهده خطوط سفید مشخص ویکهام (Wickham's Striae) در طرح‌های آنولر و رتیکولر با یا بدون نواحی قرمز همراه آن مشاهده اشکال (Erosive, Atrophic , Bullous) Plaquelike همراه با خطوط سفید ویکهام در حواشی ضایعه می‌باشد. بنابراین معیارهای تشخیص لیکن‌پلان در بررسی حاضر با معیارهای مطالعه Van Dis^{۹۵} و همکارانش مشابه است. دلیل ضریب دقیق بالای این معیار این است که شناخت شکل رتیکولر قسمت مهمی از ارزیابی بالینی بیمار مبتلا به لیکن‌پلان را تشکیل داده و چنانچه برگه جواب بیوپسی بیمار پاسخ غیراختصاصی مثل آماس حاد یا مزمون را گزارش کرده باشد باز هم مشاهده شکل رتیکولر تشخیص بالینی لیکن‌پلان را قطعی می‌نماید.^{۹۶}

همراهی لیکن‌پلان با مصرف دارو مدت‌های مددی است که ذهن محققین را به خود مشغول داشته و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است تصور می‌شود که شاید مصرف داروهای کاهنده قندخون باعث ایجاد ضایعات لیکن‌پلان دهانی گردد.^{۹۷} از طرفی به نظر می‌رسد که برای بیمار دیابتی به دلیل ابتلاء به افزایش فشار خون داروهای کنترل کننده فشارهای خون تجویز گردد و شاید لیکن‌پلان دهانی در این بیماران عارضه جانبی مصرف داروهای ضدفسار خون باشد. به همین دلیل Lamey^{۹۸} و همکارانش (۱۹۹۰)^{۹۹} پیشنهاد کردند

جدول ۵- تقسیم‌بندی بیماران براساس مصرف یا عدم مصرف دارو

تعداد کل ۲۴۲ نفر		
	مصرف هر نوع دارو	بدون مصرف هیچ‌گونه دارو
نفر	۲۲۶	۱۶
درصد	۹۳/۳	۶/۶

جدول ۶- تقسیم‌بندی بیماران مبتلا به لیکن پلان براساس مصرف یا عدم مصرف دارو

تعداد کل ۶ نفر		
	مصرف هر نوع دارو	بدون مصرف هیچ‌گونه دارو
نفر	۵	۱
درصد	۸۳/۳	۱۶/۶

Potts و همکارانش بین بروز لیکن پلان دهانی با مصرف داروهای ضدفسار خون، کاهنده قندخون خوراکی و داروهای Psychotropic ارتباطی پیدا نکردند.^{۱۱۷} Robertson و همکارانش بین بروز لیکن پلان در دهان با مصرف داروهای ضدفسار خون ارتباطی نیافتند.^{۱۱۸} Firth و همکارانش ۲۰ مورد LDE ناشی از مصرف آنالاپریل و کاپتوبریل را گزارش کردند و پیشنهاد کردند که LDE مخاط دهان می‌تواند همراه درمان با این ۲ دارو ظاهر گردد.^{۱۱۹}

Lamey و همکارانش (۱۹۹۰) ۳ بیمار مبتلا به دیابت و افزایش فشار خون و لیکن پلان دهانی را معرفی کردند و نتیجه گرفتند که بند روپلوازید - کلوبروپامید، اسپیرونولاکتون و فروسماید می‌توانند عامل بروز LDE در مخاط دهان باشند.^{۱۲۰} Van Dis و همکارانش همراهی معنی دار بین بروز لیکن پلان با مصرف آنالاپریل و کاپتوبریل را گزارش کردند

Potts و همکارانش^{۱۱۷} و Robertson و همکارانش^{۱۱۸} گزارش کردند که به ترتیب ۱۷٪ و ۱۲٪ از بیماران مبتلا به لیکن پلان در نمونه آنها NSAIDS مصرف می‌کنند. Potts و همکارانش به این نتیجه رسیدند که بین مصرف NSAIDS و بروز لیکن پلان در دهان همراهی معنی دار وجود دارد.^{۱۱۷} Robertson و همکارانش بر عکس مطالعه فوق به این نتیجه رسیدند که بروز لیکن پلان دردهان با مصرف NSAIDS ارتباطی ندارد.^{۱۱۸} مطالعه Van Dis و همکارانش نشان داد که ۱۰٪ از بیماران لیکن پلانی در نمونه وی NSAIDS مصرف می‌کنند (۱ نفر از ۱۱ نفر در گروه دیابتی و ۱ نفر از ۸ نفر در گروه شاهد و به این نتیجه رسیدند که مصرف NSAIDS با بروز ضایعات لیکن پلان دردهان ارتباط معنی دار دارد.^{۱۲۱} در بررسی حاضر هیچ کدام از بیماران مبتلا به لیکن پلان NSAIDS مصرف نمی‌کردند.

Summary

Diabetes mellitus is a common endocrine disease characterized by chronic hyperglycemia and abnormalities of carbohydrate and lipid metabolism. Lichen planus is a fairly distinctive mucocutaneous disease, of uncertain aetiology but of somewhat unique histopathological features.

Grinspan's syndrome, as originally described, is a triad of conditions, namely essential vascular hypertension, diabetes mellitus, and lichen planus of the oral mucosa however, numerous reports assume an association between diabetes mellitus and oral lichen planus the purpose of this study was to determine the prevalence of oral lichen planus in population of patients with diabetes mellitus. Therefore we study two hundreds forty two patients who were under management in shariati hospital.

(۳ نفر از ۱۱ نفر در گروه بیماران دیابتی و ۱ نفر از ۸ نفر در گروه شاهد) [۱۱] Alberecht و همکارانش به این نتیجه رسیدند که لیکن پلان در افرادی که از انسولین برای کنترل قندخون استفاده می‌کنند از شیوع بیشتری برخوردار است. [۱۲] با مراجعه به جدول مصرف دارویی مشاهده می‌گردد که در بررسی حاضر ۱ نفر از بیماران مبتلا به لیکن پلان اناناپریل و ۲ نفر متیل دوپا مصرف می‌کردند. هیچ کدام از بیماران مبتلا به لیکن پلان در بررسی ما آدالات، دیلتیازم، و راپامیل، آتنولول، پروپرانولول، فروسماید و تیازید مصرف نمی‌کردند. ۱ بیمار با Oral Hypoglycemic Agents انسولین و ۴ بیمار با

قندخون خود را کنترل می‌کردند. (جداول ۴ و ۵)

REFERENCES

1. Alberecht, M.; Banoczy, J.; Tamas, G. (1992): Occurrence of Oral Leukoplakia and Lichen Planus in Diabetes Mellitus. *J oral Pathol med.* 21: 364-6.
2. Bagan. JVS. [et al.] (1992): A Clinical Study of 205 Patients with Oral Lichen Planus. *J Oral Maxillofacial Surg.* 50: 116-18.
3. Borghelli, R.F. [et al.] (1993): Oral Lichen Planus in Patients with Diabetes: An Epidemiologic Study. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 75: 498-500.
4. Firth, N.A. Reade PC (1989): Angiotencin - Converting Enzyme Inhibitors Implicated in Oral Mucosul Lichenoid Reactions, *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 67: 4-44.
5. Grinspan, D. Diaz, J. Villapol Lo (1966): Lichen Ruber Planus Dela Muqueuse Buccale Son Association a Undiabete. *Bull. Soc. France. Derm. Syph.* 73: 898-902.
6. Isselbacher, K.J. [et al.] (1994): Harrison's Principles of Internal Medicine. Vol.2, 13th ed. 1979-98.
7. Kovesi, G. Banoczy J. (1973): Follow up Studies in Oral Lichen Planus. *Int. J Oral Surg.* 2: 13-19.
8. Lamey, P.Y.; [et al.] (1990): Grinspan's Syndrome: A Drug Induced Phenomenon? *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 70: 184-85.
9. Lamey, P.Y.; [et al] (1995): Basal Cell Cytoplasmic Autoantibodies in Oral Lichenoid Reactions. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 79: 44-49.
10. Lundstrom, IMC (1983): Incidence of Diabetes Mellitus in Patients with Oral Lichen Planus. *Int. J. Oral Surg.* 12: 147-152.
11. Lynch, M.A; [et al.] (1994): Burkett's Oral Medicine. Diagnosis and Treatment. 9th ed. Philadelphia, J. B. Lippincottco. 99-111 and 607-13.
12. Potts, AJC. Hamburger, J.; Scully, C. (1987): The Medication of Patients with Oral Lichen Planus and the Association of Nonsteroidal Anti - Inflammatory Drugs with Erosive Lesions. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol;* 64: 541-3.
13. Scully, C; El- Kom, M. (1985): Lichen Planus : Review and update on Pathogenesis. *J. Oral Pathol.* 14: 431-58.
14. Van Dis, ML; Parks, ET. (1995): Prevalence of Oral Lichen Planus in Patients with Diabetes Mellitus. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 79: 690-700.
15. قریشی، سید محمد رضا. (۱۳۷۳). بررسی اپیدمیولوژی بیش از ۲۵۰۰ مورد مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران به راهنمایی دکتر شمس. پایان نامه دوره دکتری. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.